E-9

Division of Birds

(E-(

on. Berezovski i V. Bianki

Ptitzy Hansuyskago i ... ti-
shestvia G. N. Potapina, 1884-7

St. Peters.

Ptitsy Gansujskago

i

y

ptieshestvia G. N. Potanina

M. Berezovskago

V. Biank

5-2656
QL 691 C6B49 1891 Birds

ПТИЦЫ

Ptitsy

ГАНЬСУЙСКАГО ПУТЕШЕСТВІЯ Г. Н. ПОТАНИНА

gan'suĭskago puteshestviia G. N. Potanina

1884—1887.

МАТЕРІАЛЫ ПО ОРНИТОЛОГІИ КИТАЯ, ГЛАВНЫМЪ ОБРАЗОМЪ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРОВИНЦІИ ГАНЬ-СУ.

Berezovskiĭ, Mikhail Mikhaĭlovich

М. Березовскаго,

ЧЛЕНА СОТРУДНИКА ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

и

V. Bianki

В. Біанки,

УЧЕНАГО ХРАНИТЕЛЯ ЗООЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ И АССИСТЕНТА ИМПЕРАТОРСКОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМІИ.

Aves expeditionis Potanini per provinciam Gan-su et confinia 1884—1887

Auctoribus **M. Berezowski & V. Bianchi.**

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 лин., № 12.

1891.

SMITHSONIAN JAN 03 1992 LIBRARIES

Напечатано по распоряженію Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Chas. W. Richmond
Dec. 1904.

Предлагаемая работа есть результатъ обработки орнитологическаго матеріала ганьсуйской экспедиціи Г. Н. Потанина 1884 — 1887 г.г., собраннаго преимущественно членомъ-сотрудникомъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества М. М. Березовскимъ. Коллекція принадлежитъ Музею Восточно-Сибирскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества и заключаетъ около 1400 экземпляровъ, относящихся къ 267 видамъ или формамъ птицъ, большая часть которыхъ (205 видовъ) добыта въ области системы Голубой рѣки и преимущественно въ южной части провинціи Гань-су.

Весною 1888 года М. М. Березовскій предложилъ мнѣ помочь ему обработать привезенную имъ коллекцію. Я тѣмъ съ бо́льшимъ удовольствіемъ согласился на это, что оригинальная орнитологическая фауна гористыхъ окраинъ западнаго Китая меня сильно интересовала и мнѣ представился случай ознакомиться съ представителями китайско-гималайскихъ родовъ птицъ.

Указать, что̀ въ настоящемъ трудѣ принадлежитъ каждому изъ участниковъ, нѣтъ никакой возможности. Если, съ одной стороны, у перваго изъ насъ былъ запасъ біологическихъ наблюденій, а у втораго — знаніе литературы и систематики, то, съ другой стороны, въ совмѣстной работѣ, какъ біологическая, такъ и систематическая ея части явились результатомъ полной солидарности взглядовъ послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣній.

Главнѣйшій интересъ изслѣдованій М. М. Березовскаго въ общемъ зоогеографическомъ отношеніи заключается въ томъ, что они производились въ мѣстности, не посѣщенной еще ни однимъ путешественникомъ-зоологомъ и лежащей между палеарктической и китайско-гималайской (Сѣверцовъ) областями.

Покойный Н. М. Пржевальскій прорѣзалъ своимъ маршрутомъ лишь сѣверо-западный уголъ провинціи Гань-су и изслѣдовалъ восточный конецъ Нань-шаня и сѣверную часть Амдосскаго нагорья. Другой знаменитый изслѣдователь Китая, миссіонеръ Арманъ Давидъ, только приближался къ Гань-су съ востока (Шень-си) и едва переступилъ ея границу съ юга (изъ Сы-чуани). Такимъ образомъ оставалась неизслѣ-

Smithsonian Institution, 182096 RICHMOND COLLECTION. National Museum.
Smithsonian Institution National Museum

дованною сравнительно обширная мѣстность между районами этихъ двухъ путешественниковъ. Фаунистическія отношенія ея были, слѣдовательно, вовсе неизвѣстны, а между тѣмъ это обстоятельство было тѣмъ болѣе чувствительно, что между фауной сѣверной Гань-су, какъ она обрисовывалась сборами Пржевальскаго, и фауной Шень-си и сѣверной Сы-чуани, по изслѣдованіямъ Давида, было очень мало общаго. Первая несетъ чисто палеарктическій оттѣнокъ, вторая — типичный китайско-гималайскій характеръ.

Коллекція, привезенная М. М. Березовскимъ, дала возможность не только фактически подтвердить вѣроятное a priori соприкосновеніе двухъ этихъ главныхъ фаунъ въ центральной Гань-су, но и помогла провести довольно рѣзкую между ними границу по водораздѣлу Желтой и Голубой рѣкъ: не недостаточности изслѣдованія экспедиціею мѣстностей, лежащихъ къ сѣверу отъ этого водораздѣла, нужно приписать отсутствіе тутъ большинства представителей *Timeliidae*, *Phasianidae*, *Carpodacus* и другихъ характерныхъ гималайскихъ формъ (какъ то могло бы показаться по даннымъ нашей таблицы распредѣленія матеріала по пути экспедиціи) а именно прохожденію тутъ границы. Кромѣ того оказалось, что и фауна бассейна Голубой рѣки, т. е. южная Гань-су, довольно рѣзко распадается на двѣ второстепенныя области: восточную, сходную съ фауной Шень-си, или, правильнѣе, средняго Китая и западную, — относящуюся къ фаунѣ восточной лѣсистой китайской окраины Тибета, почти тождественной съ фауной Мупина и с.-з. части Сы-чуани. Мы говоримъ почти тождественной потому, что въ ю.-з. Гань-су начинаютъ уже появляться болѣе сѣверныя формы, какъ напр. *Tetrastes Sewertzowi* Пржевальскаго.

Обращаясь къ зоогеографическимъ частностямъ, не стану вдаваться въ указанія пополненія пробѣловъ нашихъ знаній о распространеніи отдѣльныхъ видовъ, что достаточно выясняется систематической частью работы, а укажу только на прибавленіе къ списку птицъ Китайской имперіи, какъ цѣлому.

Тутъ на первомъ планѣ стоятъ, по всей вѣроятности свойственные исключительно Китаю, наши новые виды: *Trochalopteron Sukatschewi*, *Suthora Przewalskii*, *Larvivora obscura*, *Poecile hypermelaena*, *Poecile Davidi* и *Sitta Przewalskii*. Далѣе М. М. Березовскій прибавилъ къ фаунѣ Китая слѣдующіе гималайскіе виды: *Bubo bengalensis*, *Archibuteo hemiptilopus*, *Digenea cerviniventris*, *Tasiger rufilatus*, *Phylloscopus reguloides*, *Phylloscopus Mandellii*, *Periparus aemodius*, *Certhia familiaris nipalensis*, *Procarduelis rubescens* и *Pyrrhospiza punicea Humei*. Изъ широко-распространенныхъ палеарктическихъ видовъ впервые въ предѣлахъ Китая были найдены *Nisaetus pennatus* и *Saxicola vittata*. Остальныя нѣсколько формъ, неупоминаемыя David и Oustalet, были уже раньше доказаны для Китая различными авторами.

Въ систематическомъ отношеніи результаты, данные коллекціею, не менѣе цѣнны.

Для облегченія читателя скомбинирую систематическіе результаты, нами полученные, слѣдующимъ образомъ.

Въ дополненіе къ шести китайскимъ новымъ видамъ, благодаря матеріаламъ

экспедиціи, мы могли установить седьмой новый видъ — *Cryptolopha birmanica* изъ Бирмы.

Новые возрастные и половые наряды описаны у слѣдующихъ видовъ: *Ithaginis sinensis* (juv.), *Lophophorus Lhuysii* (♂ juv.), *Poliomyas Hodgsoni* (♀ adlt.; juv. 1° vest.), *Digenea cerviniventris* (♂ juv.), *Hodgsonius phoenicuroides* (♂ semiad.; pull.), *Larvivora brunnea* (♂ juv.), *Pericrocotus brevirostris* (pull.), *Parus venustulus* (juv. ?), *Corpodacus trifasciatus* (♀ adlt.), *Pycnorhamphus carneipes* (pull.).

Новыя данныя приводятся или подтверждаются старыя относительно различія слѣдующихъ формъ: *Perdix sifanica* и *P. Hodgsoni; Archibuteo strophiatus* и *A. hemiptilopus*; *Pomatorhinus gravivox* и *P. Macclellandi*, *Hemichelidon fuliginosa* и *H. sibirica*; *Cettia davidiana* и *C. fortipes*; *Lophophanes dichroides* и *L. dichrous; Picus Luciani* и *P. Cabanisi*. Точно также и *Xanthopygia cyanomelaena*, по всей вѣроятности, должна распасться на двѣ формы. *Turtur douraca* довольно рѣзко раздѣляется на три рассы.

На оборотъ, по нашимъ даннымъ есть полное основаніе предполагать, что *Ibis sinensis*—сезонный нарядъ *Nipponia nippon*, а *Trochalopteron Przewalskii*—обношенное зимнее оперепіе *T. Ellioti*. Кромѣ того, упоминается о таксономическомъ значеніи признаковъ у слѣдующихъ видовъ: *Aegialitis placidus*, *Pucrasia xanthospila ruficollis*, *Trochalopteron cinereiceps*, *Tasiger rufilatus* и *T. cyanurus*, *Phylloscopus Newtoni*, *Poecile affinis* и *P. songara*, *Zosterops erythropleura*, *Pyrrhospiza punicea Humei* и близкихъ формъ, *Carpodacus dubius* и *C. thura*.

Наконецъ болѣе или менѣе важныя систематическія замѣтки касаются слѣдующихъ видовъ: *Tetraogallus tibetanus*, *Ithaginis sinensis*, *Phasianus Strauchi*, *Ph. torquatus*, *Alsocomus Hodgsoni*, *Hodgsonius phoenicuroides*, *Merula ruficollis* и *M. fuscata*, *Ruticilla schisticeps*, *R. frontalis*, *Grandala coelicolor*, *Otomela speculigera*, *Garrulus bispecularis*, *Parus monticolus*, *Procarduelis rubescens*, *Carpodacus Edwardsi* и *C. vinaceus C. Stoliczkae*, *Pyrrhula erithacus* и *Pycnorhamphus carneipes*.

Мы сомнѣваемся въ правильности нашего опредѣленія *Caccabis saxatilis chukar*, *Astur palumbarius*, *Anthus japonicus* и *Cinclus sordidus*, но за отсутствіемъ матеріала для сравненія, мы не могли достигнуть большей точности въ этомъ направленіи.

Относительно обработки скажу слѣдующее.

Отряды и семейства расположены по системѣ Steineger'a, предложенной и проведенной имъ въ орнитологической части «Standart Natural History» Kingsley'я, въ 1885 г. Мнѣ казалось, что изъ понынѣ опубликованныхъ это не только самая лучшая, но и наиболѣе мотивированная система. Впрочемъ, считаю не лишнимъ оговориться, что мы уже почти закончили печатаніе, когда появилась работа Seebohm'a «Classification of Birds», а также и поправки къ системѣ Steineger'a, сдѣланныя нѣкоторыми авторами (Shufeldt и Oates).

Въ цитатахъ мы ограничились самымъ необходимымъ. При каждомъ видѣ мы считали нужнымъ привести ссылки на David и Oustalet «Oiseaux de la Chine», какъ един-

ственную пока сводку по орнитологіи Китая. Затѣмъ мы цитировали всегда тѣхъ авторовъ, съ формулировкой которыхъ видовъ и формъ мы вполнѣ согласны. Только въ отдѣльныхъ, трудныхъ и запутанныхъ, случаяхъ мы приводимъ полную литературу.

Во избѣжаніе длинныхъ столбцовъ измѣреній, въ случаѣ большаго количества экземпляровъ, мы нашли возможнымъ дать только предѣльныя величины. Само собою разумѣется, что сокращеніе подобнаго рода никогда не дѣлалось въ ущербъ точности данныхъ и размѣры приводились всегда отдѣльно для различныхъ половъ и возрастовъ, а иногда, если это имѣло значеніе, отдѣльно для птицъ изъ различныхъ мѣстъ и временъ года.

То же самое нужно сказать о данныхъ мѣстонахожденія и времени: соединялось только то, что не имѣло значенія въ разъединеніи.

Помимо необходимыхъ систематическихъ замѣтокъ, благодаря наблюденіямъ М. М. Березовскаго, удалось привести массу біологическихъ данныхъ, которыми такъ скудны наши свѣдѣнія для большинства китайскихъ видовъ. Къ сожалѣнію, данныя о гнѣздованіи почти отсутствуютъ.

Размѣры брались слѣдующимъ образомъ.

Дл. = Длина — отъ конца клюва до конца хвоста; при этомъ не снятая еще птица держалась въ висячемъ положеніи за клювъ.

Разм. = Размахъ или ширина — отъ концовъ маховъ праваго до таковыхъ лѣваго крыла; крылья, у не снятой еще птицы, растягивались до maximum'a либо на столѣ (крупныя), либо на вѣсу (мелкія).

Оба эти измѣренія производились тесьмой на мѣстѣ, по окончаніи трупнаго окоченѣнія. Остальныя измѣренія сняты со шкурокъ при обработкѣ въ С.-Петербургѣ.

Кл. = Клювъ измѣрялся циркулемъ, по хордѣ, ото лба до конца клюва; если размѣръ взятъ отъ границы оперенія, то это всегда оговорено.

Пл. = Плюсна, тоже циркулемъ, отъ задняго края верхняго конца пятки, по діагонали, до прикрѣпленія средняго пальца съ тыльной стороны.

Хв. = Хвостъ, также циркулемъ, отъ gl. uropygialis до конца самыхъ длинныхъ маховъ.

Кр. = Крыло, также, отъ сгиба до самаго длиннаго маха, по хордѣ.

Всѣ числа по новому стилю.

Со своей стороны мнѣ остается выразить благодарность адъюнкту Академіи Ѳ. Д. Плеске за любезное предоставленіе въ наше распоряженіе многихъ экземпляровъ птицъ, безъ которыхъ нѣкоторые вопросы остались бы вовсе не выясненными; доктору Oustalet въ Парижѣ за позволеніе сравнить нѣкоторые виды съ типами David'a и профессору М. А. Мензбиру въ Москвѣ за присылку для сравненія *Poecile songara* изъ коллекціи Сѣверцова.

В. Біанки.

1-го марта 1891 г.

Въ 1883 году Императорское Русское Географическое Общество снарядило экспедицію для изслѣдованія Китая, преимущественно его западной, тибетской, окраины, подъ руководствомъ члена-сотрудника Общества, Григорія Николаевича Потанина. Включеніе въ составъ экспедиціи двухъ лицъ: топографа Августа Ивановича Скасси и меня, — коллектора-орнитолога, могло осуществиться только благодаря просвѣщенному содѣйствію Владиміра Платоновича Сукачева, члена-соревнователя Общества, предоставившаго въ распоряженіе послѣдняго, на сей предметъ, 15,000 р. Имъ же, по истеченіи 3-хъ лѣтъ — срока экспедиціи — даны мнѣ средства (3500 р.) для продолженія пребыванія моего въ провинціи Гань-су еще на годъ и для обработки орнитологическаго матеріала. Такимъ образомъ, орнитологическими результатами экспедиція всецѣло обязана В. П. Сукачеву. Коллекціи птицъ и млекопитающихъ, собранныя экспедиціею, поступили въ Музей Восточно-Сибирскаго Отдѣла Географическаго Общества въ г. Иркутскѣ[1]).

Обработка коллекціи произведена въ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ. За дозволеніе пользоваться его богатыми коллекціями и библіотекой приношу мою сердечную благодарность директору Музея Александру Александровичу Штрауху, и адъюнкту Академіи Ѳеодору Дмитріевичу Плеске.

Коллекція птицъ, результатомъ обработки которой является настоящая книга, состоитъ изъ попутнаго сбора во всѣхъ, посѣщенныхъ экспедиціею, мѣстностяхъ и изъ сбора въ южной части провинціи Гань-су, сдѣланнаго, живя по долгу на одномъ мѣстѣ. Такъ какъ весь путь экспедиціи подробно описанъ Г. Н. Потанинымъ, то для попутнаго сбора прилагаю (въ объясненіи къ помѣщенной ниже таблицѣ) только краткія

---

[1]) Небольшую коллекцію млекопитающихъ любезно взялся обработать ученый хранитель Музея Императорской Академіи Наукъ, Евгеній Александровичъ Бихнеръ; его работа напечатана въ Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. Nouvelle série, II (XXXIV) p. 97—118 (1891).

характеристики, пройденныхъ экспедиціею, геофизическихъ областей; о южной же Гань-су, гдѣ я прожилъ около 2-хъ лѣтъ, скажу болѣе подробно. Прежде однако, въ поясненіе къ приложенному ниже маршруту, изложу мотивы, обусловливавшіе мои передвиженія и выборъ мѣстъ.

Экспедиція выступила изъ Пекина 26 мая 1884 года и, пройдя черезъ городъ Бао-динъ-фу, монастырь У-тай, города Шо-нинъ-фу и Гуй-хуа-чэнъ и пересѣкши Ордосъ съ сѣвера на югъ, прибыла 3 ноября въ городъ Лань-чжоу, столицу провинціи Гань-су, гдѣ предполагалось зимовать. Этотъ путь, пролегавшій по мѣстностямъ частію съ густымъ населеніемъ, гдѣ приходилось двигаться по большимъ дорогамъ, частію же, хотя и по мало населеннымъ, но бѣднымъ въ отношеніи фауны, далъ очень скудный и мало интересный орнитологическій сборъ; предстоявшую зиму желательно было употребить по возможности производительнѣе. Въ Лань-чжоу А. И. Скасси и я пользовались гостепріимствомъ католической миссіи, завѣдующій которою, нашъ любезный хозяинъ миссіонеръ бельгіецъ г. Фанъ Ретъ (van Reeth), до назначенія въ Лань-чжоу, прожилъ нѣсколько времени на югѣ провинціи, въ городѣ Хой-сянъ. Онъ очень хвалилъ эту страну, ея мягкій климатъ, мирный характеръ населенія, богатство растительной и животной жизни, и совѣтовалъ мнѣ ѣхать зимовать туда. Такъ какъ южная Гань-су еще не была посѣщена путешественниками-коллекторами, то я рѣшился послѣдовать совѣту, тѣмъ болѣе, что въ Хой-сянѣ жили два миссіонера, со стороны которыхъ можно было надѣяться встрѣтить такой же радушный пріемъ, какой экспедиція встрѣчала у миссіонеровъ по всему пути отъ Пекина до Лань-чжоу. Въ Хой-сянѣ, куда я пріѣхалъ 31 ноября, миссіонеры гг. Фанъ Дамме (van Damme) и де Пётеръ (de Peuter) простерли свою любезность до того, что предложили мнѣ поселиться у нихъ. Я пробылъ въ этой странѣ болѣе 5 мѣсяцевъ, живя частью въ помѣщеніи миссіи въ восточномъ предмѣстьи г. Хой-сяна и дѣлая экскурсіи въ окрестностяхъ, частью — въ 50 верстахъ къ востоку отъ города, на границѣ провинціи Шень-си, въ урочищѣ Кванъ-дзя-хо, гдѣ у миссіи есть клочекъ земли и маленькій домикъ. По письму Г. Н. Потанина, извѣщавшаго, что около 15 мая 1885 года экспедиція расчитываетъ быть въ городѣ Минъ-чжоу, я выѣхалъ изъ Хой-сяна 8 мая и, проживши въ ожиданіи экспедиціи въ Минъ-чжоу, присоединился къ ней 4 іюня въ монастырѣ Джони-бомбо, лежащемъ на рѣкѣ Тао-хэ, выше послѣдняго города въ 60 верстахъ. Изъ Джони я прошелъ вмѣстѣ съ экспедиціей до города Си-гу и тутъ остался. Еще живя въ Минъ-чжоу, въ ожиданіи экспедиціи, изъ распросовъ мѣстныхъ жителей я составилъ представленіе о Сигученскомъ округѣ, какъ о мѣстности съ богатой фауной; мнѣ упоминали о многихъ видахъ птицъ и звѣрей, встрѣчающихся только тутъ. По пути отъ г. Минъ-чжоу въ г. Си-гу страна представлялась дѣйствительно крайне заманчивой для орнитолога, но вмѣстѣ съ тѣмъ рѣзко выступали неудобства коллектированія по пути съ караваномъ. Дорога проходила по дну глубокаго скалистаго ущелья, одѣтому только скудной растительностью, между тѣмъ какъ вдали по склонамъ горъ виднѣлись роскошные лѣса. Какова страна

впереди, было неизвѣстно, эта же представлялась настолько интересною, что, не желая рисковать, я рѣшился остаться здѣсь. Экспедиція выступила изъ Си-гу 2 іюля по направленію въ г. Сунъ-панъ, я же переселился въ горы и въ деревняхъ Лото-пинъ (по тангутски Ледеби) и Дзю-юань (первая на правой сторонѣ Сигученской рѣки, ниже города верстахъ въ 10; вторая же на лѣвой сторонѣ рѣки, выше города въ 20 верстахъ) прожилъ около полутора мѣсяца, до 19 августа. При отправленіи экспедиціи изъ Си-гу было условлено, что я присоединюсь къ ней на обратномъ ея пути изъ Сунъ-пана въ городѣ Ли-сянъ, время же, конечно, не могло быть опредѣлено съ точностью. Прожившіи въ Сигученскомъ округѣ полтора мѣсяца и разсчитавши, что моихъ денежныхъ средствъ можетъ хватить еще не болѣе, какъ на столько же, за полученіемъ же новыхъ все равно предстоитъ поѣздка въ г. Лань-чжоу, куда ожидалась присылка серебра, я рѣшился ѣхать за послѣднимъ, не ожидая экспедиціи. Цѣль моя была немедленно вернуться и посвятить изслѣдованію интересной фауны юго-западной Гань-су осень и зиму до весны, когда предполагалось двинуться въ обратный путь въ Россію. Расчетъ этотъ оказался ошибочнымъ. Въ Лань-чжоу серебро хотя и было получено, но китайскія власти не рѣшались мнѣ выдать изъ него хотя бы часть; приходилось дожидаться здѣсь возвращенія экспедиціи. По приходѣ послѣдней я вернулся въ Си-гу 12 ноября и въ деревняхъ Лото-пинъ, посѣщенной мною лѣтомъ, и Са́тани (Хедѐ), лежащей къ югу отъ города Си-гу, въ долинѣ одного изъ правыхъ притоковъ Сигученской рѣки, прожилъ 3 мѣсяца. Вернувшись же въ Си-гу 15 февраля, выѣхалъ въ монастырь Гумбумъ, гдѣ экспедиція зимовала и откуда предполагала идти обратно въ Россію.

За полгода или болѣе до этого времени, заинтересованный фауной Гань-су, я выражалъ желаніе остаться въ этой провинціи еще на годъ и просилъ Г. Н. Потанина написать въ Россію, не найдутся ли для этого средства. Передъ самымъ выступленіемъ экспедиціи въ обратный путь было получено черезъ ямынь Синиискаго амбаня серебро, но безъ всякихъ документовъ, объясняющихъ его назначеніе. Рѣшено было, что экспедиція выступитъ, я же останусь, дождусь почты и, смотря по тому, что она принесетъ, либо возвращусь съ экспедиціею въ Россію, либо останусь въ Гань-су еще на годъ. Въ ожиданіи почты, я переселился изъ Гумбума верстъ за 50 къ югу, въ деревню Чунъ-цзя, но едва прожилъ здѣсь 3 дня, какъ пріѣхалъ гонецъ отъ Г. Н. Потанина съ извѣстіемъ, что посланный Синиискаго амбаня догналъ экспедицію въ г. Танъ-гэръ и привезъ еще на 2000 р. серебра и что, на этотъ разъ, серебро несомнѣнно назначается для меня. Въ городѣ Танъ-гэръ, 17 апрѣля 1886 года, я распрощался съ сотоварищами по путешествію. Такъ какъ фауна юго-западной Гань-су представлялась мнѣ крайне интересною, то я рѣшилъ посвятить ея изслѣдованію и предстоявшій годъ. Первую значительную остановку я хотѣлъ сдѣлать около мѣстечка Танъ-чанъ, лежащаго на серединѣ пути между городами Минъ-чжоу и Си-гу (окрестности котораго заинтересовали меня еще тогда, когда я прошелъ этотъ путь вмѣстѣ съ экспедиціею) отсюда пройти на западъ и, если возможно, посѣтить

страну, занятую полудикимъ племенемъ Тебу, лежащую между городами Минъ-чжоу и Сунъ-паномъ. Хлопоты въ Сининѣ объ оставленіи части серебра въ тамошней лавкѣ, съ цѣлью гарантировать возвращеніе въ Россію отъ дорожныхъ случайностей; остановка въ урочищѣ Сань-чуань для моего слуги, уроженца этой мѣстности, желавшаго передъ отправленіемъ со мной еще на годъ провести нѣсколько дней въ семьѣ; наконецъ дорога до Танчана — все это взяло много времени и въ послѣднее мѣстечко я прибылъ лишь 19 мая 1886 г. Собравши здѣсь свѣдѣнія объ окрестныхъ мѣстностяхъ, я переселился въ дер. Ю-дзянъ-гу (Чадзово), лежащую въ 15 верстахъ отъ Танчана, на правомъ притокѣ Танчанской рѣки, и прожилъ здѣсь 3½ мѣсяца, до 1 августа.

Послѣдній теплый мѣсяцъ 1886 г., до 13 октября, проведенъ мною въ дер. Лотаче (Рота), въ 70 верстахъ выше г. Си-гу по теченію рѣки, и въ горахъ лѣваго берега послѣдней, около дер. Джоей-цзой, куда я сдѣлалъ изъ Лотаче продолжительную экскурсію. Дер. Лотаче, принадлежащая къ округу города Минъ-чжоу, находится почти на самой границѣ страны, обитаемой племенемъ Тебу, которую я имѣлъ намѣреніе посѣтить. Но по расспроснымъ свѣдѣніямъ, и сборъ около Лотаче не сулили тамъ ничего интереснаго, въ особенности зимой. Я рѣшился отказаться отъ намѣренія проникнуть далѣе на западъ и, вернувшись въ Си-гу, перебрался 16 октября въ дер. Сатани, гдѣ зимовалъ въ прошломъ году. Цѣлью вторичнаго посѣщенія этой деревни было изслѣдованіе южнаго горнаго хребта, отдѣляющаго здѣсь Гань-су отъ Сы-чуани, единственнаго мѣста во всей Гань-су, гдѣ водится *Lophophorus L'huysi*, самки котораго еще не было въ моей коллекціи. По ущелью отъ дер. Та-хей-гоу, лежащей въ 5 верстахъ къ югу отъ Сатани, я сдѣлалъ двѣ экскурсіи въ эти горы, продолжавшіяся въ сложности 40 дней, причемъ подымался на перевалъ и переходилъ на сычуаньскіе склоны. Вернувшись въ Сатани, я переѣхалъ 16 декабря за 25 верстъ ниже по той же рѣкѣ въ дер. Чагани (Чаго), гдѣ прожилъ еще двѣ недѣли, и 31 декабря вернулся въ г. Си-гу. Срокъ моего пребыванія въ Китаѣ уже истекалъ и пора было думать о возвращеніи въ Россію. Зимняя фауна юго-западной Гань-су хотя, конечно, не была исчерпана, но новые для меня виды встрѣчались уже чрезвычайно рѣдко; жить здѣсь еще 1½ — 2 мѣсяца, на которые по расчету у меня хватило бы средствъ, — кромѣ необходимыхъ на обратный путь въ Россію, — не имѣло значенія. Я рѣшился еще разъ побывать въ Хой-сянѣ, съ цѣлью посѣтить страну къ югу отъ города и Шеньсійскія горы, еще мало обслѣдованныя мною. Переѣхавши въ Хой-сянъ 13 января 1887 года, я болѣе мѣсяца употребилъ на экскурсію въ предѣлы провинціи Шень-си, пройдя отъ Хой-сяна верстъ 50 къ юго-востоку до дер. Лянъ-дянь-коу (Шень-си) и вернувшись обратно съ востока, черезъ уроч. Кванъ-дянь-хо, гдѣ жилъ въ 1885 году. Съ отъѣзда изъ Хой-сяна (31 марта) мною совершенно прекращено всякое коллектированіе. Такъ какъ весь обратный путь я сдѣлалъ на наемныхъ животныхъ и одинъ, безъ слуги, то сборъ въ пути былъ почти и невозможенъ. Пришлось сначала завернуть въ г. Сининъ для полученія оставленнаго здѣсь въ прошломъ году

серебра, а затѣмъ я направлялся въ г. Лянь-чжоу, имѣя въ виду либо выйдти прямымъ путемъ черезъ Алашань на Ургу, либо черезъ г. Нинь-ся на Калганъ. Въ Лянь-чжоу я имѣлъ удовольствіе познакомиться къ католическимъ епископомъ Гань-су Монсеньеромъ Гаммеромъ (Hammer), живущимъ въ Китаѣ уже болѣе 20 лѣтъ и прекрасно знающимъ страну; онъ рѣшительно не совѣтовалъ идти на Алашань. По его словамъ, въ это время года здѣсь очень трудно найти верблюдовъ, а если они и найдутся, то придется заплатить очень дорого; путь же на Нинь-ся хотя и болѣе длинный, но вѣрный и дешевый. Несмотря на 10-ти-дневные поиски, въ Лянь-чжоу оказалось не возможнымъ найти телѣги, которая доставила бы меня и мой багажъ прямымъ путемъ до Нинь-ся; ѣхать же на вьюкахъ и самому на вьючномъ сѣдлѣ, какъ предлагали, я не рѣшился. Пришлось направиться въ г. Лань-чжоу, откуда телѣжное сообщеніе съ Нинь-ся совершается болѣе правильно. Въ этомъ городѣ мнѣ предстояла совершенно неожиданная встрѣча: — сюда пришелъ русскій торговый караванъ Саввы Морозова и К°, руководителемъ котораго былъ мой старый знакомый А. Д. Васеневъ. Эта встрѣча задержала меня здѣсь на 10 дней. Въ Лань-чжоу я легко нашелъ телѣгу до Нинь-ся, но въ послѣднемъ городѣ опять пришлось задержаться. Большинство лодокъ, идущихъ отсюда внизъ по Желтой рѣкѣ до г. Боу-ту съ шерстью и другимъ грузомъ, на которыя я расчитывалъ, въ это время (конецъ іюля) уже ушли; только благодаря любезной помощи протестантскаго миссіонера г. Меки (McKee) удалось отыскать одну, отправлявшуюся съ грузомъ риса, которую пришлось дожидаться. Изъ Боу-ту я нанялъ телѣгу до г. Гуй-хуа-чинъ, гдѣ пользовался гостепріимствомъ протестантскаго миссіонера Г. Бейнонъ (Beynon), а отсюда до Калгана, куда прибылъ во второй половинѣ іюля. Здѣсь я остановился уже у русскихъ, въ торговомъ домѣ гг. Коковина и Басова, извѣстномъ у китайцевъ подъ именемъ Хо-синъ-дянь. Любезный представитель этой фирмы В. И. Матренинскій помогъ мнѣ найти верблюдовъ до Троицкосавска, куда я и пріѣхалъ въ концѣ августа, остановившись по дорогѣ отдохнуть на 2 дня въ Ургѣ у нашего многоуважаемаго консула Я. П. Шишмарева.

Теперь постараюсь дать нѣкоторое понятіе о странѣ, гдѣ преимущественно составлена орнитологическая коллекція, т. е. о южной Гань-су.

Подъ именемъ южной Гань-су я разумѣю часть этой провинціи, расположенную въ системѣ Голубой рѣки, по теченію и притокамъ двухъ главныхъ рѣкъ Чу-ню-цзянъ и Хей-шуй-цзянъ [1]), и граничащую на востокѣ и на югѣ съ провинціями Шень-си и Сы-чуань. Самая южная часть этой области — та, гдѣ находится городъ Вень-сянь,

[1]) [illegible] ніи она названа Янъ-чу-хе; въ среднемъ — Цанъ-цзянъ; въ нижнемъ — Хей-шуй-цзянъ. Употребляю, для удобства, одно послѣднее. Въ Китаѣ, въ народѣ, книжныя названія рѣки часто совершенно неизвѣстны. Рѣку Хей-шуй-цзянъ, около города Си-гу, мнѣ называли либо Та-хе, т. е. большая рѣка, либо Си-гу-де-хе, т. е. рѣка города Си-гу.

мною не посѣщена и все, что я скажу ниже, относится преимущественно къ странѣ, лежащей къ сѣверу отъ параллели города Кье-чжоу или Цзѣ-чжоу (32° 23′ 46″ с. ш. по опредѣленію г. Скасси). По характеру рельефа эта страна дѣлится на двѣ части — восточную и западную, — за примѣрную границу между которыми можно принять меридіанъ, проходящій черезъ городъ Ли-сянъ (105° 01′ 43″5 в. д. отъ Гр.). Къ востоку лежитъ средней высоты плоскогорье, ограниченное болѣе высокими горами, къ западу — горная страна, представляющая расчлененный размываніемъ уступъ или склонъ Тибетскаго, точнѣе Амдосскаго нагорья. Скажу о каждой изъ этихъ частей отдѣльно.

Восточное плоскогорье состоитъ изъ ряда небольшихъ, мягкихъ очертаній и покрытыхъ лёссомъ возвышенностей, не превосходящихъ, вѣроятно, 4000 фут. абсолютной высоты. Здѣсь расположены города Лянъ-данъ, Хой-сянъ и Ченъ-сянъ. Низшія точки находятся около двухъ послѣднихъ: Хой-сянъ лежитъ на высотѣ 3000 фут., Ченъ-сянъ — немного ниже. Съ сѣвера плоскогорье ограничено горами, сопровождающими съ правой стороны теченіе рѣки Ю-хо или Вей-хо, крупнаго притока Желтой рѣки, имѣющаго направленіе почти съ запада на востокъ. Горы эти не превосходятъ 8000 ф. На восточной окраинѣ плоскогорья, на границѣ провинціи Шень-си, проходятъ горы, составляющія, вѣроятно, отроги хребта Цзунъ-линъ или Цинъ-линъ. Въ предѣлахъ Гань-су онѣ не достигаютъ болѣе 7 — 7500 фут. абс. высоты. Западной и южной окраиной плоскогорья служатъ возвышенности, тянущіяся вдоль лѣваго берега р. Чу-ню-цзянъ. Эти возвышенности, находящіяся въ связи съ горами, отдѣляющими плоскогорье отъ долины р. Вей-хо, идутъ сначала почти съ сѣвера на югъ, причемъ имѣютъ мягкія очертанія и покрыты лёссомъ; затѣмъ, около города Ченъ-сяна, поворачиваютъ на востокъ и, въ видѣ каменистой грядки, проходятъ до г. Хой-сянъ, гдѣ переходятъ въ болѣе массивныя, тоже каменистыя, возвышенности, соединяющіяся съ Шеньсійскими горами. Эти возвышенности въ восточной ихъ части не превышаютъ 5000 фут. [1]). Рѣки, орошающія плоскогорье, текутъ въ общемъ направленіи съ сѣвера на югъ, прорѣзываютъ южныя окраинныя возвышенности и впадаютъ въ Чу-ню-цзянъ. Болѣе крупныхъ изъ нихъ четыре: двѣ между городами Ченъ-сянъ и Хой-сянъ и двѣ восточнѣе послѣдняго. Первыя текутъ въ широкихъ и пологихъ долинахъ съ невысокими мягкими увалами, соединяясь, образуютъ рѣку, которая недалеко отъ города Ченъ-сянъ прорѣзываетъ южныя окраинныя возвышенности плоскогорья и входитъ здѣсь въ узкое скалистое ущелье. Вторыя —

---

[1]) Такимъ образомъ это плоскогорье представляется какъ бы котловиной, окруженной со всѣхъ сторонъ горами. Я склоненъ однако думать, что на сѣверо-востокѣ оно не отдѣлено отъ долины р. Вей-хо никакими значительными горами. Около г. Хой-сянъ, съ возвышенныхъ точекъ южныхъ окраинныхъ горъ плоскогорья, вся страна къ сѣверу представляется въ видѣ лабиринта мелкихъ возвышенностей, надъ которыми вдали (верстъ 50) подымается гряда горъ:—это горы, отдѣляющія въ этомъ направленіи долину р. Вей-хо. На востокѣ тоже видны горы, выступающія отдѣльными скалистыми вершинами: — это горы на границѣ Шень-си. Горизонтъ между обѣими системами горъ чистъ и уходитъ вдаль.

глубоко врѣзаны, текутъ въ узкихъ долинахъ съ покрытыми галечными розсыпями днами и крутыми, мѣстами скалистыми, боками; соединяясь верстахъ въ 15 къ востоку отъ г. Хой-сянъ, онѣ образуютъ ту рѣку, недалеко отъ впаденія которой въ Чу-цю-цзянъ стоитъ городъ Ло-янъ въ Шень-си.

Городъ Хой-сянъ лежитъ въ юго-восточномъ углу плоскогорья, у самой южной окраины послѣдняго, въ томъ мѣстѣ, гдѣ грядка, идущая отъ города Чень-сянъ переходитъ въ болѣе массивныя возвышенности, соединяющіяся съ Шеньсійскими горами. Онъ расположенъ въ долинѣ и по лѣвому увалу рѣчки, текущей съ с.-з. на ю.-в., имѣющей не болѣе саженн ширины, но долина которой расширяется около города до полу-версты или даже больше. Верстахъ въ двухъ ниже долина сразу съуживается, рѣчка входитъ въ узкое скалистое ущелье и течетъ въ немъ верстъ 15 до впаденія въ большую рѣку — ту, что идетъ къ городу Ло-янъ въ Шень-си. Городъ лежитъ на высотѣ 3000 фут. [1]), а окрайныя возвышенности плоскогорья, проходящія къ югу верстахъ въ трехъ — четырехъ, возвышаются надъ нимъ, вѣроятно, не болѣе 1500 фут. Въ верхней части онѣ имѣютъ довольно крутые и жесткіе склоны, ниже же переходятъ въ лёссовые холмы. Увалы долины, также какъ и все плоскогорье къ сѣверу и западу отъ Хой-сяна, представляютъ невысокія, мягкихъ очертаній, возвышенности, прорѣзанныя многочисленными логами. Страна покрыта лёссомъ, густо заселена и сильно распахана, но въ то же время довольно богата древесной и, въ особенности, кустарной растительностью. Низменная часть долины около Хой-сяна занята рисовыми полями, а по бокамъ ея, подлѣ предмѣстій и пригородныхъ деревень, довольно обширные фруктовые сады. Увалы распаханы террасами, склоны которыхъ и фамильныя кладбища среди пашенъ одѣты кустарными зарослями. На всѣхъ выдающихся точкахъ надъ городомъ возвышаются кумирни, окруженныя группами деревьевъ, а мѣстами и большими рощами. Мѣста не удобныя для земледѣлія,—либо по крутизнѣ, либо оттого, что тутъ выходятъ каменныя породы и смытъ лѣсъ,—также покрыты кустарными зарослями и, мѣстами, небольшими перелѣсками. Все это придаетъ Хойсянской долинѣ очень привлекательный видъ мирнаго культурнаго уголка. Не менѣе красивы и окрестности Хой-сяна въ сторону отъ долины. Большія деревни встрѣчаются сравнительно рѣдко, сельское населеніе живетъ большею частью отдѣльными хуторами, которые всегда окружены древесной растительностью и расположены на красивыхъ пунктахъ, конечно не изъ эстетическихъ соображеній, а чтобы не занимать подъ усадьбы удобной подъ культуру земли. Кустарныя заросли и перелѣски встрѣчаются повсюду.

---

[1]) Въ Хой-сянѣ я дѣлалъ, хотя не постоянно, наблюденія съ анероидомъ Гольдшмидта. Среднее показаніе за февраль 1885 г. (почти ежедневныя наблюденія) 697,5 милл., при средней температурѣ воздуха +1,7°C. (Наблюдалось 3 раза въ день: въ 6 ч. утра, 1 часъ дня и 9 часовъ вечера). Передъ отъѣздомъ изъ Лань-чжоу, поправка анероида по сравненію съ ртутнымъ барометромъ была — 13, а по присоединеніи моемъ къ экспедиціи въ г. Манъ-чжоу — 16. Принимая даже послѣднюю поправку, высота Хой-сяна не можетъ быть оцѣнена болѣе 3000 фут.

Около Хой-сяна и въ окрестностяхъ воздѣлываются: пшеница, гаолеанъ (родъ сорго), просо, Setaria italica, гречиха, макъ (для опіума), табакъ, рисъ, много сортовъ бобовыхъ и другія растенія[1]). Изъ хлѣбовъ преобладаетъ пшеница, а рисъ хотя и культивируется въ довольно большомъ количествѣ, но только въ долинахъ двухъ рѣкъ—хой-сянской и другой верстахъ въ 20 къ западу отъ города. Въ садахъ растутъ: персики, абрикосы, сы-шу *(Diospyros Kaki)*, грецкій орѣхъ, груши, яблоки, тутовое[2]) и др. фруктовыя деревья. Виноградъ хотя и есть, но въ незначительномъ количествѣ; говорятъ, что, благодаря сырому лѣту, онъ здѣсь плохо вызрѣваетъ, водянистъ и киселъ. Относительно дикой кустарной и древесной растительности, не будучи свѣдущимъ въ ботаникѣ, замѣчу, что между кустарниками много вѣчно-зеленыхъ, съ неопадающей листвой, а изъ древесныхъ породъ обращу вниманіе на дерево пей-шу (туйя?), какъ на очень характерное для всего плоскогорья. Это дерево встрѣчается повсюду около кумиренъ и на кладбищахъ, какъ отдѣльными столѣтними деревьями, такъ и довольно обширными высокоствольными рощами, но обыкновенно также и въ дикомъ состояніи, въ видѣ мелкихъ перелѣсковъ въ мѣстахъ не занятыхъ подъ культуру. Въ юго-западной Гань-су, въ Сигученскомъ и Минчжоускомъ округахъ, пей-шу попадается очень рѣдко, только около кумирень. Изъ домашнихъ животныхъ здѣсь держатъ главнымъ образомъ свиней, муловъ и коровъ. Лошадей почти нѣтъ, коровъ же употребляютъ исключительно какъ рабочій скотъ, такъ какъ китайцы молока не пьютъ. Для характеристики окрестностей Хой-сяна со стороны фауны, упомяну, что по рисовымъ полямъ и болотистымъ лугамъ здѣсь обыкновенны ибисъ и кряковая утка *(Nipponia nippon* и *Anas boschas)*, послѣдняя только зимой; въ садахъ чрезвычайно обильны два вида горлинокъ *(Turtur douraca* и *Turtur sinensis)*; въ самомъ городѣ и въ деревняхъ масса коршуновъ *(Milvus melanotis)*; на пашняхъ повсюду фазаны *(Phasianus Strauchi)*; по живымъ изгородямъ и въ зарослях колючихъ кустарниковъ держится горихвостка *(Ruticilla aurorea)* и копошатся *Dryonastes sannio*, вѣроятно самый многочисленный изъ всѣхъ видовъ птицъ около Хой-сяна. Кромѣ того здѣсь попадается въ небольшомъ количествѣ, по одиночно стоящимъ деревьямъ, сорокопутъ *(Lanius sphenocercus)* и однажды наблюдался воронъ съ ошейникомъ *(Corvus torquatus)*—два вида, сами по себѣ характеризующіе фауну этой части плоскогорья и отношеніе ея къ фаунамъ окружающихъ странъ. Изъ млекопитающихъ назову лишь косулю *(Capreola capraea)*, которая, въ небольшомъ количествѣ, встрѣчается около самаго города Хой-сяна.

По мѣрѣ удаленія отъ Хой-сяна на востокъ, мѣстность представляется болѣе гористою. Это зависитъ, повидимому, лишь отъ того, что ложа двухъ, текущихъ здѣсь довольно большихъ рѣкъ (образующихъ рѣку, идущую къ г. Ло-янъ) врѣзаны глубоко,

---

[1]) Хой-сянъ славится табакомъ и водкой; послѣдняя гонится изъ сорго.

[2]) Населеніе занимается и шелководствомъ, но въ незначительныхъ размѣрахъ, въ видѣ подспорья къ земледѣлію; здѣшній шелкъ не высокаго качества.

а потому глубже долины и второстепенныхъ рѣчекъ и ручьевъ и чаще встрѣчаются обнаженія каменныхъ породъ (известняковъ), образующихъ мѣстами скалистыя возвышенности.

Восточнѣе восточной изъ двухъ, только что упомянутыхъ, рѣкъ начинаются уже предгорья Шеньсійскихъ горъ, но и они, ни по абсолютной высотѣ, ни по характеру, почти не отличаются отъ мѣстности, прилегающей къ нимъ съ запада, и всю страну отъ Хой-сяна до границы Шень-си (50 верстъ) можно принять за часть того же плоскогорья, только болѣе размытую. Эта страна также покрыта лёссомъ, но, благодаря ея перерѣзанному характеру, удобныхъ для земледѣлія мѣстъ меньше, населеніе рѣже, а кустарная и древесная растительность богаче. Склоны овраговъ и бока долинъ рѣкъ сплошь покрыты кустарниками, а значительные перелѣски попадаются повсюду, хотя настоящихъ лѣсовъ нѣтъ. Между деревьями преобладаютъ лиственныя породы, но довольно и хвойныхъ, преимущественно ели. Изъ культурныхъ растеній здѣсь встрѣчаются почти тѣ же, что около Хой-сяна, за исключеніемъ риса и съ прибавкой кукурузы (поуку), которая воздѣлывается главнымъ образомъ, какъ говорятъ, потому, что она можетъ расти на такихъ крутыхъ склонахъ, гдѣ всѣ другіе хлѣба будутъ смыты дождями. Изъ фруктовыхъ деревьевъ преобладаютъ грецкій орѣхъ и сы-шу *(Diospyros Kaki)*. Упомяну еще, что изъ полукультурныхъ растеній здѣсь растетъ лаковое дерево и два сорта бамбука. Изъ послѣднихъ одинъ, называемый му-чжудза, достигаетъ до 2—3 сажень высоты при діаметрѣ въ $1^1/_2$—2 дюйма и имѣетъ длинныя, круглыя, толстостѣнныя колѣнца; другой, названіе котораго я позабылъ, не болѣе сажени высотой и въ палецъ толщиной, обладаетъ короткими, тонкостѣнными колѣнцами, которыя сплющены съ одной стороны и желтаго цвѣта даже въ свѣжемъ видѣ. Оба сорта растутъ въ долинахъ и первый изъ нихъ хотя и встрѣчается въ юго-западной Гань-су, около города Си-гу, но въ незначительномъ количествѣ, второй же тамъ совершенно не извѣстенъ. Изъ птицъ, характеризующихъ эту часть плоскогорья и предгорья Шеньсійскихъ горъ, упомяну о слѣдующихъ. Въ долинахъ рѣкъ здѣсь встрѣчается, хотя и въ небольшомъ количествѣ, *Ceryle lugubris* и *Ibidorhinchus Struthersii;* по ключамъ—*Henicurus sinensis, Himarrhornis leucocephala*, *Rhyacornis fuliginosa* и *Cinclus Pallasi;* по кустарнымъ зарослямъ и перелѣскамъ — *Vivia chinensis, Gecinus Guerini, Picus Cabanisi, Aegithaliscus concinnus* и зимуетъ три вида дроздовъ: *Merula fuscata, Merula Naumanni* и *Merula ruficollis,* изъ которыхъ послѣдній въ большомъ количествѣ; по кустарнымъ и древеснымъ зарослямъ около скалъ держатся *Yuhina diademata, Ixus xanthorrhous* и *Spizixus semitorques*, послѣдніе два вида очень обыкновенны; по близости горъ, на открытыхъ поляхъ, попадается *Uragus lepidus*, а въ оврагахъ, поросшихъ бамбукомъ, — золотой Фазанъ. Обыкновенный Фазанъ *(Phasianus Strauchi)* повсюду обыкновененъ. Изъ млекопитающихъ наиболѣе обыкновенны: пао-лу—косуля *(Capreolus capraea)* и паодза — леопардъ *(Felis pardus)*, по близости же горъ ѣ-чжу — кабанъ *(Sus vittatus)* и сянъ-цза—кабарга *(Moschus moschiferus)*.

Предгорья Шеньсійскихъ горъ начинаются, какъ уже сказано, восточнѣе восточной изъ двухъ рѣкъ, которыя приходится переѣзжать по пути отъ Хой-сяна на востокъ до границы Шень-си. Рѣчки, текущія съ Шеньсійской стороны, имѣютъ сходный характеръ, образчикомъ котораго можетъ служить рѣчка Кванъ-дзя-хо, гдѣ у хой-сянской католической миссіи есть земля и домикъ. Отъ устья Кванъ-дзя-хо до домика миссіи верстъ 10, а отсюда до перевала въ вершинѣ рѣчки—примѣрно столько же, такъ что все теченіе послѣдней не превосходитъ 20—25 верстъ. Только въ самой вершинѣ, на протяженіи около версты, рѣчка течетъ по почти совершенно пологой, довольно широкой долинкѣ, ниже же входитъ въ глубокое, скалистое, мѣстами корридорообразное ущелье. Дно ущелья почти совершенно не обитаемо, а все населеніе ютится на скатахъ междолинныхъ хребтиковъ — отдѣляющихъ Кванъ-дзя-хо отъ сосѣднихъ рѣчекъ, — которые имѣютъ мягкія очертанія и покрыты лёссомъ. Домикъ миссіи, расположенный въ подобной мѣстности, стоитъ на абсолютной высотѣ, примѣрно, около 3500 фут., а перевалъ въ вершинѣ рѣчки имѣетъ около 5000 ф.

Перевалъ, служащій здѣсь границей между провинціями Гань-су и Шень-си, имѣетъ видъ совершенно плоской долинки, по бокамъ которой возвышаются горы, достигающія, повидимому, 7—8000 ф. абсолютной высоты. Горы эти представляютъ отдѣльные массивы, вершины которыхъ почти плоски и состоятъ изъ холмовъ, чередующихся съ чашеобразными, безъ стока воды, котловинами, — склоны же чрезвычайно круты и скалисты[1]). Вершины горъ и уступы скалъ одѣты древесной и кустарной растительностью и дикимъ бамбукомъ. Послѣдній, повидимому, тотъ же, что и въ юго-западной Гань-су, но здѣсь онъ не образуетъ такихъ обширныхъ зарослей и не достигаетъ такой величины, какъ тамъ. Изъ хвойныхъ преобладаетъ ель. Боль-

---

[1]) Тропинки ведущія на верхъ — самыя головоломныя тропинки, какія мнѣ только приходилось встрѣчать. Онѣ проложены мѣстами по карнизамъ скалъ и, тамъ, гдѣ карнизы обрываются или слишкомъ съуживаются, проходятъ по подвѣшеннымъ бамбуковымъ плетенкамъ, буквально вися надъ пропастями. Никакихъ перилъ въ опасныхъ мѣстахъ, конечно, нѣтъ, а тропинки такъ узки, что едва можетъ пройдти человѣкъ. Здѣсь я въ первый разъ познакомился съ подковами, употребляющимися при ходьбѣ въ горахъ, въ особенности зимой, во всѣхъ гористыхъ частяхъ Китая. Подкова имѣетъ видъ овальнаго желѣзнаго кольца съ загнутыми перпендикулярно къ его плоскости, противоположными по длинной оси, краями и съ выступающими съ другой стороны по ободу четырьмя острыми шипами. Подкова помѣщается подъ серединой ступни и за выступающія по бокамъ послѣдней загнутые края укрѣпляется такъ, чтобы не могла сдвинуться ни къ носку, ни къ пяткѣ. При первыхъ опытахъ ходьбы на подковахъ кажется, что невозможно пройдти и полу-версты, но навыкъ пріобрѣтается быстро. При подъемахъ и спускахъ по обледенѣлымъ горнымъ тропинкамъ подковы чрезвычайно полезны и я постоянно ихъ употреблялъ. Кстати упомяну объ обуви, извѣстной во всемъ юго-западномъ Китаѣ подъ именемъ ма-хай (пеньковые башмаки) и незамѣнимой при ходьбѣ въ горахъ. Подошва, въ полъ-вершка толщины, имѣетъ видъ какъ бы свернутой изъ сплетеннаго въ видѣ косы пенькового жгута. Спереди и сзади къ подошвѣ приплетены два крѣпкихъ пеньковыхъ устоя; бока башмака между ними состоятъ изъ приплетенныхъ къ подошвѣ веревочекъ, кончающихся петлей. Въ эти петли и въ отверстія въ устояхъ продернутъ шнуръ, которымъ можно стянуть башмакъ до желаемой величины и укрѣпить его на подъемѣ и около лодышки такъ, что на самыхъ крутыхъ спускахъ пальцы ноги не упираются въ носокъ башмака. При чрезвычайной легкости, эта обувь обладаетъ еще мягкой подошвой, которая не скользитъ при ходьбѣ. Единственный недостатокъ, что бока ноги не защищены отъ сучьевъ и колючекъ, я устранялъ, употребляя замшевые чулки.

шихъ лѣсовъ однако нигдѣ нѣтъ, такъ какъ всѣ деревья покрупнѣе вырублены и постоянно вырубаются. Эта мѣстность (вершины горъ) почти совершенно не обитаема и здѣсь попадаются только лачуги самыхъ ужасныхъ бѣдняковъ, питающихся исключительно картофелемъ, да шалаши дровосѣковъ и углежоговъ. У мѣстныхъ жителей она носитъ названіе «Лоу-ланъ», т. е. старый лѣсъ, названіе которое припурочивается, кажется, ко всѣмъ подобнымъ необитаемымъ мѣстностямъ, гдѣ сохранились остатки прежнихъ мощныхъ лѣсовъ. Я дѣлалъ нѣсколько экскурсій въ горы, но въ это время года (зимою) мнѣ удалось добыть здѣсь только *Fulvetta cinereiceps*, услыхать раза два крикъ орѣховки *(Nucifraga hemispila)* и стрекотанье *Trochalopteron Ellioti*, да констатировать, по разбросаннымъ перьямъ, присутствіе *Ceriornis Temminckі*. Изъ млекопитающихъ въ горахъ обиленъ кабанъ (*Sus vittatus*), не рѣдокъ *Risomys sinensis*, попадается *Nemorhedus Edwardsi* и много другихъ видовъ, опредѣлить которые изъ распросовъ я не могъ. Несомнѣнно только, что здѣсь водится какой-то видъ дикобраза.

Слѣдовало бы еще сказать о странѣ къ ю.-в. отъ г. Хой-сяна, т. е. о прилежащей сюда части провонціи Шень-си (дер. Ланъ-дзя-коу), куда я дѣлалъ экскурсію въ концѣ февраля и началѣ марта 1887 г., передъ выѣздомъ въ Россію. Но эта страна представляетъ такой лабиринтъ долинъ, ущелій, каменистыхъ хребтиковъ и настоящихъ горныхъ хребтовъ, что я положительно не могъ, пройдя разъ, обобщить виденнаго и составить общее представленіе о топографическомъ характерѣ мѣстности. Страна, въ особенности Шеньсійскія горы, одѣта лѣсомъ, преимущественно елью, мѣстами же встрѣчаются цѣлыя долины, сплошь поросшія кустарникомъ. Населеніе, въ горахъ, довольно рѣдкое и питается почти исключительно кукурузой. Экскурсія въ Шень-си прибавила къ моей коллекціи только 3 вида *(Poecile hypermelaena, Spaelornis Halsueti* и *Paradoxornis gattaticollis)* и констатировала присутствіе здѣсь нѣкоторыхъ видовъ, которые раньше были у меня только изъ юго-западной Гань-су *(Janthocincla lunulata* и *Trochalopteron cinereiceps)*.

Населеніе юго-восточной Гань-су почти исключительно китайское, лишь съ небольшой примѣсью магометанъ, которые впрочемъ по языку отъ китайцевъ не отличаются. Среди китайцевъ есть небольшое количество христіанскихъ семей, сохранившихъ религію со временъ первыхъ іезуитскихъ миссіонеровъ, т. е. около 200 лѣтъ. Занятіе населенія состоитъ преимущественно въ земледѣліи и, такъ какъ страна лежитъ въ сторонѣ отъ торговыхъ путей, въ здѣшнихъ городахъ нѣтъ бродячаго элемента, какъ въ другихъ болѣе промышленныхъ и торговыхъ центрахъ. Этимъ вѣроятно объясняется то, что здѣсь не чувствуется того недружелюбнаго отношенія къ европейцамъ, которое бродячее населеніе городовъ разноситъ изъ портовъ Китая по всему государству. За нѣсколько мѣсяцевъ жизни въ Хойсянскомъ округѣ я не только не имѣлъ никакихъ непріятныхъ столкновеній, а наоборотъ, когда приходилось проходить мимо деревень и хуторовъ, весьма часто получалъ приглашеніе зайти отдохнуть, покурить и выпить чашку чаю [1]).

[1]) Люди опытные, миссіонеры, предупреждали меня не принимать подобныхъ приглашеній слиш-

На плоскогорьи, гдѣ большая часть мѣстности занята подъ культуру, охотниковъ совершенно нѣтъ; въ горахъ же на Шеньсійской границѣ—наоборотъ, довольно много. Горные жители представляютъ относительно долинныхъ болѣе красивый, физически-сильный и энергическій типъ, не смотря на то, что между ними очень распространенъ зобъ и различныя очень тяжкія накожныя болѣзни. Охотятся преимущественно съ ружьемъ, охота же силками мало распространена. Ружья мѣстнаго издѣлія, фитильныя съ короткой ложей и длиннымъ стволомъ, который откованъ вмѣстѣ съ казенной частью. Порохъ, или скорѣе пороховая мякоть, собственнаго приготовленія. Передъ отправленіемъ на охоту его каждый разъ просушиваютъ въ мѣдномъ ковшѣ на огнѣ. Вмѣсто дроби употребляютъ чугунную картечь, имѣющую видъ неправильныхъ и неодинаковой величины капель. Пулями служатъ куски желѣза. Пыжей не употребляютъ, а сверхъ заряда всовываютъ шомполомъ, еле-держащійся въ стволѣ, клочекъ волосъ, преимущественно человѣческихъ, которые для этой цѣли тщательно собираютъ при чесаніи косы и хранятъ. Ружья никогда не моются. Необходимая принадлежность охотника—висящая на поясѣ баночка изъ колѣнъ бамбука, служащая для храненія палочекъ изъ бумажной массы, употребляемыхъ какъ фитиль. Палочки эти не горятъ, а тлѣютъ, и весьма медленно, такъ что можно имѣть огонь всегда на готовѣ. Такія ружья и съ такими зарядами бьютъ, конечно, не далѣе 30 — 40 шаговъ, но недостатокъ оружія уравновѣшивается качествами охотниковъ—чрезвычайной выносливостью въ ходьбѣ и способностью вѣрнымъ шагомъ пробираться по такимъ мѣстамъ, гдѣ, кажется, и горная антилопа рисковала бы сломать шею. Главные предметы охоты — кабаны для мяса и кабарга для мускуса.

Сдѣлаю еще нѣсколько замѣчаній о климатѣ юго-восточной Гань-су. Когда я въ первый разъ отправился въ г. Хой-сянъ, то въ г. Лань-чжоу, откуда я выѣхалъ въ серединѣ ноября, стояла прекрасная ясная погода, но было уже довольно холодно. Ночью и днемъ постоянно морозило и земля оттаивала только на пригрѣвахъ солнца, въ серединѣ дня. Въ пути между г. Лань-чжоу и долиной р. Вей-хо, пролегающемъ по горной странѣ, достигающей мѣстами 10.000 ф. абсолютной высоты, меня захватили настоящіе зимніе морозы, которые установились здѣсь вѣроятно уже порядочное время. Снѣгу почти не было, но горные ручьи мѣстами промерзли уже чуть не до дна, такъ что ихъ приходилось переходить по бугристымъ наледямъ. Въ болѣе низкой, но почти лишенной древесной растительности, долинѣ р. Вей-хо, стояла прекрасная погода, но все-таки было не теплѣе, чѣмъ около Лань-чжоу. На южныхъ лѣсистыхъ склонахъ горъ, отдѣляющихъ долину этой рѣки отъ системы Чу-ню-цзяна сразу почуствовалась рѣзкая перемѣна. Стало такъ тепло, что, къ моему удивленію, изрѣдка встрѣчались еще бабочки. Въ г. Хой-сянѣ, куда я прибылъ 30 ноября, слабые ночные заморозки начались, какъ говорили, всего дня за три до моего пріѣзда. Заморозки постепенно

комъ буквально и цѣнить въ нихъ лишь одну любезность. Сельское населеніе Хойсянскаго округа очень бѣдно и приглашающій выпить чаю былъ бы поставленъ въ неловкое положеніе, если бы предложеніе было принято. Въ его убогомъ домѣ навѣрное не нашлось бы и чайнаго листика.

усиливались и переходъ къ зимѣ совершался незамѣтно. Большею частью стояла ясная погода, изрѣдка перепадалъ снѣгъ, но не покрывалъ земли болѣе, чѣмъ на вершокъ и въ рѣдкихъ случаяхъ удерживался 1—2 дня, большею же частью таялъ по мѣрѣ паденія [1]). Въ продолженіи всей зимы, при ясной погодѣ, въ серединѣ дня температура достигала до +5, +6° С. и иногда даже болѣе; морозило же только ночью, рано утромъ и поздно вечеромъ, причемъ морозы въ рѣдкихъ только случаяхъ достигали 15—18° С. Въ пасмурные дни температура держалась болѣе ровная, съ слабыми ночными морозами и слабыми дневными оттепелями. Рѣчка около города Хой-сяна, даже болотистые луга и затопленныя водой рисовыя поля не замерзали въ продолженіи всей зимы; послѣднія покрывались иногда тонкой ледяной коркой, которая черезъ нѣсколько дней стаивала. Обыкновенно было тихо или дули лишь слабые вѣтры. Сѣверо-восточные приносили хорошую погоду и высокое стояніе барометра, южный—пасмурную и низкое давленіе. Перемѣна къ веснѣ стала чувствоваться съ конца февраля. Ей предшествовало ненастье со снѣгомъ, продолжавшееся съ перерывами около двухъ недѣль [2]). Къ концу мѣсяца погода прояснилась и утренніе и вечерніе заморозки прекратились. 6-го марта выпалъ первый, очень незначительный, дождь. Затѣмъ весь мартъ и апрѣль стояла великолѣпная ясная погода и температура днемъ держалась не ниже +15° С. Первый настоящій лѣтній дождь, почти ливень, прошелъ 7-го мая, на канунѣ моего отъѣзда изъ Хой-сяна. Наступленіе весны въ животной жизни стало замѣтнымъ тоже съ конца февраля. 25-го числа мною первый разъ замѣчено, что фазаны стали табуниться. Около 1-го марта лягушки и жабы начали класть яйца; 2-го марта наблюдалась первая летучая мышь и слышались крики пролетающихъ журавлей; 4-го марта появилась первая ласточка, а, при рытьѣ земли, майскіе жуки выкапывались совершенно готовыми къ вылету. Лѣто въ юго-восточной Гань-су отличается, говорятъ, обильными дождями.

Перейду къ западной части южной Гань-су.

Къ западу отъ меридіана города Ли-сянъ лежитъ, какъ я сказалъ въ началѣ, горная страна, представляющая расчлененный размываніемъ уступъ или склонъ Амдосскаго нагорья. Граница нагорья около г. Ли-сянъ выражена довольно рѣзко. Рѣка Чу-шю-цзянъ течетъ здѣсь въ общемъ направленіи съ сѣвера на югъ и вдоль ея праваго берега тянутся почти сплошной грядой горы, представляющія окраину мощнаго горнаго массива, лежащаго между городами Ли-сянъ и Минъ-чжоу. Вершины этого массива возвышаются выше 10.000 футъ, а рѣчки, текущія съ него, незначительны и долины ихъ врѣзаны, сравнительно, не глубоко [3]). Къ югу отъ г. Ли-сянъ граница

[1]) Въ горахъ на границѣ Шень-си снѣгъ шелъ одновременно какъ и въ Хой-сянѣ, но не таялъ или же таялъ болѣе медленно. Горы были покрыты довольно толстымъ снѣжнымъ покровомъ, дѣлавшимъ экскурсіи здѣсь очень затруднительными.

[2]) Въ 1887 г., когда я вторично посѣтилъ Хой-сянъ, этотъ періодъ ненастья, предшествующаго веснѣ, наступилъ раньше и былъ продолжительнѣе: съ середины января снѣгъ шелъ почти ежедневно въ продолженіи болѣе трехъ недѣль.

[3]) Мнѣ пришлось пересѣчь этотъ массивъ въ двухъ направленіяхъ: по пути изъ города Ли-сянъ

нагорья идетъ съ с.-в. на ю.-з., перпендикулярно теченію главныхъ рѣкъ, и выражена не рѣзко. Нагорье представляется здѣсь расчлененнымъ, выступающимъ на ю.-в. отдѣльными участками, точно растопыренными пальцами руки. Участки эти образованы восточными окончаніями горныхъ хребтовъ, проходящихъ по нагорью, промежутки между ними — глубоко врѣзанными долинами рѣкъ.

Сигученскій округъ и юго-восточная часть Минчжоускаго — районъ моего орнитологическаго сбора въ юго-западной Гань-су — расположены по верхнему теченію рѣки Хей-шуй-цзянъ и по двумъ его болѣе крупнымъ притокамъ: Танчанской рѣкѣ, — на которой стоитъ мѣстечко Танъ-чанъ, и Са́танпиской рѣкѣ, — на которой лежитъ деревня Са́тани. Въ долинѣ Хей-шуй-цзяна расположенъ городъ Си-гу-ченъ, а выше его въ 80 верстахъ — дер. Лота́ни, — крайній пунктъ на западѣ, до котораго я доходилъ. Танчанская рѣка впадаетъ въ Хей-шуй-цзянъ слѣва, — ниже города Си-гу въ 15 верстахъ, а Са́танпиская рѣка — справа, ниже Си-гу верстахъ въ 70 и верстахъ въ 15 выше города Кье-чжоу или Цзѣ-чжоу. Въ районѣ посѣщенныхъ мною мѣстъ, Хей-шуй-цзянъ и Са́танпиская рѣка текутъ въ общемъ направленіи съ сѣверо-запада на юго-востокъ. Первый представляетъ значительную рѣку, имѣющую около г. Си-гу сажень 20 ширины, а у деревни Лота́ни съуживающуюся болѣе чѣмъ въ половину; вторая не шире 3-хъ, 4-хъ саженъ. Танчанская рѣка, — берущая начало съ горнаго массива между городами Ли-сянъ и Минъ-чжоу, о которомъ я упоминалъ выше, — течетъ сначала почти съ сѣвера на югъ, затѣмъ поворачиваетъ къ востоку (немного выше Танъ-чана) и идетъ параллельно Хей-шуй-цзяну; въ нижней части своего теченія она имѣетъ до 15 саженъ ширины. По странѣ проходятъ значительные горные хребты. Самый мощный изъ нихъ тянется вдоль праваго берега Са́танпиской рѣки и служитъ здѣсь границей между провинціями Гань-су и Сы-чуань. Перевалъ черезъ него, по дорогѣ изъ г. Си-гу въ г. Сунъ-панъ, противъ деревни Чаго имѣетъ 11.500 ф. абсолютной высоты, а отдѣльныя скалистыя вершины, возвышающіяся противъ деревни Са́тани, достигаютъ 17.000 ф. [1]). Отрогъ этого хребта отдѣляетъ долины Са́танпиской рѣки и Хей-шуй-цзяна и перевалъ черезъ него, по вышеупомянутой дорогѣ, противъ дер. Мо-ръ-пинъ, имѣетъ 9000 ф. Вдоль лѣваго берега Хей-шуй-цзяна

въ г. Минъ-чжоу и по пути изъ послѣдняго въ городъ Ди-дао-чжоу. Склоны массива къ Ли-сяну круты и лѣсисты, поднявшись же, попадаешь въ мѣстность почти безлѣсную и сравнительно спокойнаго характера. Хотя по пути до г. Минъ-чжоу (болѣе 300 китайскихъ ли) пять переваловъ, имѣющихъ 9—10 и до 11.000 фут. абсолютной высоты, но высота ихъ надъ окружающей мѣстностью не велика. Горы имѣютъ мягкія очертанія, долины рѣчекъ широки и пологи, такъ что мѣстами даже образуютъ луговыя и болотистыя площади въ 1—2 версты шириной. Вся страна покрыта лёссомъ. Здѣсь сѣютъ почти исключительно только голый ячмень и держатъ въ довольно большомъ количествѣ домашнихъ яковъ. Спускъ къ Минъ-чжоу опять крутъ и лѣсистъ. Послѣдній городъ лежитъ на высотѣ 7600 ф. Г. Минъ-чжоу и г. Ди-дао-чжоу оба расположены въ долинѣ р. Тао-хе, но сообщенія по долинѣ нѣтъ, а дорога идетъ горами праваго берега рѣки. Страна по пути имѣетъ характеръ подобный только что описанному.

[1]) По пути экспедиціи изъ г. Си-гу въ г. Сунъ-панъ эти вершины были видны съ дороги. Разстояніе до нихъ получено А. И. Скасси засѣчками, а высота вычислена по угловому превышенію надъ горизонтомъ. Высота мѣстъ, откуда сдѣланы засѣчки, опредѣлена барометрически.

тянется другой хребетъ, отдѣляющій долину послѣдней рѣки отъ Танчанской. Вершины этого хребта подымаются около дер. Лота́ин выше предѣла древесной растительности, т. е. выше 11.000 ф., а къ г. Сп-гу горы хотя и понижаются, но и здѣсь достигаютъ, вѣроятно, 10.000 ф. Чтобы дать понятіе о глубинѣ врѣза долинъ и, такъ сказать, о маасштабѣ этой горной страны, приведу, пользуясь съемкой г. Скасси, слѣдующія данныя. Городъ Сп-гу лежитъ на абсолютной высотѣ 4500 ф. Если провести черезъ него на картѣ линію, перпендикулярную теченію рѣкъ, т. е. съ сѣверо-востока на юго-западъ, то на сѣверо-востокѣ она пересѣчетъ въ 10 верстахъ отъ города высоты около 10.000 ф., а въ 25 верстахъ — Танчанскую рѣку, текущую здѣсь на высотѣ менѣе 5000 ф. Въ другую сторону отъ Сп-гу, т. е. на юго-западъ, эта линія въ 10 верстахъ отъ города пересѣчетъ горы, перевалъ черезъ которыя (на востокъ отъ линіи) имѣетъ 9000 ф.; въ 25 верстахъ — Са́тапинскую рѣку, текущую здѣсь на высотѣ менѣе 7000 ф.; а въ 40 верстахъ—горный хребетъ, перевалъ черезъ который (на востокъ отъ линіи) имѣетъ 11.500 ф., а отдѣльныя вершины (на западъ отъ линіи) достигаютъ 17.000 ф.

Долины Хей-шуй-цзяна около г. Сп-гу и Танчанской рѣки внизъ отъ мѣстечка Танъ-чанъ имѣютъ сходный характеръ. Рѣки текутъ въ глубокихъ ущельяхъ, на днѣ которыхъ отъ ложа рѣки остаются только узкія забоки, гдѣ и ютится населеніе. Дикой древесной растительности здѣсь почти нѣтъ: всё занято пашнями, огородами и фруктовыми садами. Бока ущелій круты, мѣстами одѣты дерномъ и кустарниками, мѣстами же представляютъ осыпи и голыя скалы. Горы, проходящія между этими долинами, имѣютъ болѣе короткіе и скалистые склоны къ Хей-шуй-цзяну и болѣе длинные и лѣсистые—къ Танчанской рѣкѣ. Въ послѣднюю текутъ съ этой стороны нѣсколько порядочныхъ рѣчекъ, на одной изъ которыхъ, впадающей въ 5 верстахъ ниже мѣстечка Танъ-чанъ, лежитъ деревня Іо-дзамъ-пу (Чодзоно́), гдѣ я жилъ лѣтомъ 1886 года. Рѣчка беретъ начало съ гольцовъ и ущелье ея на всемъ протяженіи, т. е. около 25 верстъ по долинѣ, почти сплошь одѣто лѣсомъ. Ущелье Танчанской рѣки около Танъ-чана (лежащаго на высотѣ 5000 ф.) хотя глубоко и узко, но тѣснинъ не образуетъ. Ниже-же, въ особенности съ того мѣста, гдѣ рѣка начинаетъ заворачивать къ Хей-шуй-цзяну, ущелье стѣснено громадными скалами и въ иныхъ мѣстахъ имѣетъ видъ каменнаго корридора съ отвѣсными боками. Проходящая здѣсь, дорога изъ г. Мипъ-чжоу въ г. Сп-гу часто идетъ, на протяженіи сотенъ шаговъ, по мостикамъ или настилкамъ, подвѣшеннымъ къ скаламъ въ видѣ балконовъ на высотѣ иногда десятковъ сажень надъ водой. Изъ ущелья видны только его скалистые бока да высоко вверху — верхушки лѣсовъ. Скалистые обрывы продолжаются и вверхъ по Хей-шуй-дзяну до города Сп-гу. Ущелье послѣдняго имѣетъ тутъ мѣстами менѣе полуверсты ширины и лѣвый бокъ его, отъ впаденія Танчанской рѣки, на протяженіи болѣе 15 верстъ, представляетъ почти сплошную стѣну скалъ. У подножья этихъ скалъ на лѣвомъ берегу Хей-шуй-цзяна лежитъ г. Сп-гу, окруженный гигантскими каменными пиками и закутанный въ зелени фруктовыхъ садовъ. Поверхъ этихъ каменныхъ стѣнъ и пиковъ,

тянется вдоль рѣки и на громадной высотѣ надъ ней, узкая терраса, примкнутая къ горамъ, проходящимъ между долинами Танчанской рѣки и Хей-шуй-цзяна. На этой террасѣ расположенъ рядъ деревень. Мѣстность здѣсь хотя и гористая, но спокойнаго характера. Рѣчки или ключики, текущіе съ горъ, имѣютъ очень широкія и пологія долинки, безъ галечныхъ розсыпей, а мѣстами и съ болотистыми луговинами. Подходя къ Хей-шуй-цзяну, они входятъ въ глубокіе овраги, а затѣмъ свергаются въ узкихъ ущельяхъ, настолько крутыхъ, что по нимъ нѣтъ даже тропинокъ. О высотѣ этой террасы можно судить потому, что дер. Дзю-юань, гдѣ я жилъ въ 1885 г., расположенная въ подобной мѣстности у подножья скалистыхъ горъ, уступы и склоны которыхъ одѣты хвойнымъ лѣсомъ и бамбуковыми зарослями, лежитъ на абсолютной высотѣ около 8000 футъ. Эта деревня находится верстахъ въ 15—18 отъ г. Си-гу вверхъ по Хей-шуй-цзяну, а отъ послѣдняго не далѣе какъ въ двухъ верстахъ. Такъ какъ Си-гу лежитъ на абсолютной высотѣ 4500 Ф., то дер. Дзю-юань возвышается надъ долиной Хей-шуй-цзяна, вѣроятно, не менѣе какъ на $^3/_4$ версты. Правый бокъ ущелья Хей-шуй-цзяна противъ г. Си-гу также очень крутъ, но безъ скалистыхъ обрывовъ. Онъ покрытъ внизу дерномъ и кустарниками, вверху — лѣсомъ и прорѣзанъ глубокими и узкими логами. Въ вершинахъ роговъ и на хребтикахъ между ними повсюду расположены деревни. Дер. Ло-то-пинъ, въ которой я жилъ въ іюлѣ 1885 г., лежитъ въ вершинѣ лога или оврага, открывающагося въ ущелье небольшой рѣчки, впадающей въ Хей-шуй-цзянъ въ семи верстахъ ниже Си-гу, по которому идетъ дорога въ г. Сумъ-панъ. Деревня стоитъ на совершенно плоской площадкѣ въ $^1/_4$ версты шириной и болѣе версты длиной, окруженной почти со всѣхъ сторонъ крутыми, покрытыми лѣсомъ горами. Небольшой ключикъ, текущій по этой площадкѣ, ниже деревни сразу входитъ въ чрезвычайно крутой и глубокій оврагъ, надъ которымъ деревня стоитъ какъ на балконѣ.

Ущелье Хей-шуй-цзяна вверхъ по теченію рѣки до дер. Лотáни, на протяженіи около 70 верстъ отъ г. Си-гу, не представляетъ такихъ тѣснинъ, какъ около этого города. Мѣстами оно даже расширяется и на плоскихъ забокахъ здѣсь расположено нѣсколько деревень. Бока ущелья однако повсюду круты и каменисты, и одѣты большею частью только скуднымъ дерномъ и кустарникомъ, а не рѣдко съ осыпями, на которыхъ не можетъ укрѣпиться растительность. Вообще ущелье имѣетъ довольно пустынный видъ и лѣса виднѣются только высоко въ горахъ. По мѣрѣ удаленія отъ Си-гу рѣка постепенно становится уже, около дер. Лотáни она не шире 20 шаговъ и течетъ въ коридорообразномъ, каменистомъ, съ совершенно отвѣсными боками руслѣ, врѣзанномъ на 10 саженъ ниже дна ущелья, имѣющаго здѣсь около $^3/_4$ версты ширины. Дер. Лотáни (Рота) расположена на лѣвомъ берегу рѣки, на плоской въ $^1/_2$ версты шириной и до двухъ верстъ длиной, забокѣ, орошенной канавками изъ ближайшихъ горныхъ ключиковъ и сплошь распаханной. Здѣсь сѣютъ пшеницу и растутъ даже груши, грецкій орѣхъ и абрикосы, но въ самомъ незначительномъ количествѣ. Горы лѣваго берега Хей-шуй-цзяна противъ дер. Лотáни подымаются выше предѣла дре-

весной растительности и склоны ихъ богато одѣты лиственными и хвойными лѣсами. Съ ближайшихъ къ деревнѣ горъ открывается видъ на нѣсколько верстъ вверхъ по Хей-шуй-цзяну и на горы праваго берега рѣки. Видно, что рѣка постепенно заворачиваетъ къ югу и что лѣвый бокъ ущелья становится скалистымъ, правый же сравнительно пологій. Горы праваго берега представляются въ видѣ лабиринта одинаковой высоты, сплошь одѣтыхъ хвойнымъ лѣсомъ хребтиковъ, надъ которыми вдали возвышается правильная, тоже одѣтая лѣсомъ, гряда горъ, составляющая вѣроятно продолженіе горнаго хребта, идущаго вдоль праваго берега Са́танинской рѣки. Эта лѣсистая страна населена тангутскимъ племенемъ Тебу.

Са́танинская рѣка, въ посѣщенной мною части ея теченія, лежащей къ югу отъ г. Си-гу, имѣетъ не болѣе 2—3 саженъ ширины и течетъ въ узкомъ, не глубокомъ оврагѣ. Вдоль праваго берега рѣки тянется мощный горный хребетъ, склоны котораго очень круты, и всѣ рѣки, впадающія съ этой стороны въ Са́танинскую рѣку, выходятъ изъ чрезвычайно узкихъ ущелій, по которымъ нѣтъ населенія. Склоны горъ лѣваго берега рѣки наоборотъ длинны и пологи, рѣчки, текущія съ этой стороны, имѣютъ довольно широкія долинки и вся мѣстность, на протяженіи болѣе 20 верстъ по Са́танинской рѣкѣ, представляетъ къ послѣдней общее пониженіе, образующее какъ бы котловину. Въ этой котловинѣ, по увалamъ Са́танинской рѣки и по ея притокамъ, расположено болѣе 20 деревень. Въ нижней части котловины, на правомъ увалѣ Са́танинской рѣки, стоитъ дер. Чахапи (Чаго), а въ верхней — на лѣвомъ увалѣ рѣки, дер. Са́тапи; разстояніе между ними около 25 верстъ. Около дер. Чаго котловина съуживается. Са́танинская рѣка течетъ здѣсь уже въ глубокомъ оврагѣ, ниже-же входитъ въ тѣснину, въ которой и идетъ, кажется, вплоть до впаденія въ Хей-шуй-цзянъ близъ города Кье-чжоу. Эта часть теченія мною не посѣщена. Выше дер. Са́тапи рѣка также течетъ въ довольно узкомъ ущельѣ, по которому выше этой деревни въ трехъ верстахъ лежатъ только двѣ маленькихъ деревушки, выше-же населенія нѣтъ [1]). Вся эта мѣстность чрезвычайно богата древесной растительностью. Внизу повсюду встрѣчаются лиственные лѣса, склоны же и вершины горъ покрыты хвойными лѣсами, березой и бамбуковыми зарослями. Горный хребетъ, идущій вдоль праваго берега Са́танинской рѣки, достигаетъ наибольшей высоты противъ дер. Са́тапи. Здѣсь возвышаются громадные массивы, плоскія вершины которыхъ лишены древесной растительности, склоны же представляютъ почти сплошной скалистый обрывъ, только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поросшій рѣдкими лѣсами древовиднаго можжевельника. Эти массивы однако

[1]) По словамъ мѣстныхъ жителей, тангутовъ, если вывершить Са́танинскую рѣку и перевалить, то первое населенное мѣсто будетъ дер. Янъ-пу, находящаяся въ 50 верстахъ отъ Са́тани и лежащая уже на притокѣ (верховьѣ?) Хей-шуй-цзяна. Эта дер. населена тангутами племени Тебу. Между Са́тани и Янъ-пу, на серединѣ разстоянія, есть только одинъ китайскій поселокъ Та-цюу-па, состоящій всего изъ двухъ селеній. По словамъ тѣхъ же разскащиковъ, горы, питающія верховья Хей-шуй-цзяна и Са́танинской рѣки, даютъ также начало рѣкѣ Хей-хо, крупному притоку Хей-шуй-цзяна, на которомъ лежатъ города Нань-пинъ и Вень-сянъ.

не главныя вершины хребта. Послѣднія находятся не менѣе какъ въ 15—20 верстахъ къ югу отъ Са́тани и изъ этой деревни не видны.

Немного ниже дер. Са́тани въ Са́танинскую рѣку впадаетъ справа небольшая рѣчка, у выхода которой изъ ущелья, у подножья упомянутыхъ массивовъ, стоитъ маленькая китайская деревушка Та-хей-гоу. Отъ деревни по ущелью рѣчки идетъ дорожка черезъ хребетъ въ долину р. Хей-хо. Эта дорожка доступна только пѣшеходамъ. Ущелье, по которому она идетъ, имѣетъ чрезвычайно дикій видъ. Дно его загромождено обломками скалъ, крутые же бока либо сплошь заросли хвойнымъ лѣсомъ, либо представляютъ осыпи и скалистые обрывы. Въ верхней части ущелье раздѣляется на нѣсколько вѣтвей, по большинству изъ которыхъ подъемъ невозможенъ, такъ какъ онѣ замкнуты вверху отвѣсными скалами. Та вѣтвь, по которой идетъ дорожка, также крута и изъ ущелья вылѣзаешь точно по лѣстницѣ. Поднявшись, выходишь на почти совершенно голую волнистую мѣстность, по которой текутъ ручейки въ болотистыхъ плоскихъ берегахъ, а увалы ихъ представляютъ альпійскіе луга, въ перемежку съ зарослями рододендровъ и другихъ альпійскихъ кустарниковъ. По подобной мѣстности выходятъ черезъ двѣ—три версты къ невысокому пологому перевалу, вокругъ котораго опять возвышаются сплошныя стѣны скалъ. Спускъ въ долину Хей-хо, повидимому, болѣе пологъ, чѣмъ къ Са́танинской рѣкѣ. Вся страна въ сторону къ Хей-хо представляется въ видѣ пологихъ горъ, закругленныя вершины которыхъ одѣты альпійскими лугами, склоны же — хвойными лѣсами.

По различію въ характерѣ растительной и животной жизни, въ зависимости отъ абсолютной высоты мѣстностей, эта страна можетъ быть раздѣлена на слѣдующіе пояса:

Поясъ нѣжныхъ фруктовыхъ деревьевъ, каковы: Сы-шу *(Dyospiros Kaki)*, гранатъ, фиговое дерево *(Ficus carica)*. За предѣлъ вертикальнаго распространенія этихъ деревьевъ можно принять 5000 Ф. абсолютной высоты.

Поясъ лиственныхъ лѣсовъ.

Поясъ хвойныхъ лѣсовъ — до предѣла древесной растительности, лежащаго здѣсь между 11 и 12.000 Ф. абсолютной высоты.

Альпійскій поясъ.

Въ поясъ нѣжныхъ фруктовыхъ деревьевъ входятъ только долины рѣкъ: Хей-шуй-цзяна, около и ниже отъ города Си-гу, и Танчанской рѣки, ниже отъ мѣстечка Танъ-чанъ. Садоводство и огородничество составляютъ здѣсь существенную отрасль сельскаго хозяйства. Въ садахъ растутъ груши, персики, грецкій орѣхъ, сы-шу, гранатъ, *Govenia*, фиговое и другія фруктовыя деревья, но преобладающее значеніе имѣютъ только груши, персики и сы-шу,—гранатъ же и фиговое дерево разводятся болѣе для украшенія. Виноградной лозы, какъ и въ Хойсянскомъ округѣ, почти нѣтъ. Въ огородахъ разводятъ всевозможные сорта овощей, между прочимъ баклажаны и въ громадномъ количествѣ стручковый перецъ, который расходится отсюда по всей странѣ. На пашняхъ сѣютъ тѣ же хлѣба, что и около г. Хой-сяна; есть и рисъ, но

за недостаткомъ удобныхъ мѣстъ, въ самомъ незначительномъ количествѣ. Изъ птицъ упомяну, что по скаламъ около г. Си-гу встрѣчается куропатка *(Cacabis chukar)* и синій каменный дроздъ *(Monticola cyanea)*, а въ садахъ осѣдлы два вида горлинокъ *(Turtur douraca* и *T. sinensis)* и черный дроздъ *(Merula mandarina)* и гнѣздится иволга *(Oriolus diffusus)*.

Разграничить по высотѣ пояса лиственныхъ и хвойныхъ лѣсовъ довольно трудно. Характеръ растительности мѣняется постепенно и зависитъ притомъ не только отъ высоты, но и отъ положенія мѣстностей относительно странъ свѣта. На сѣверныхъ склонахъ хвойные лѣса спускаются ниже, на южныхъ наоборотъ лиственные лѣса подымаются выше. Въ среднемъ можно принять, что наибольшаго развитія лиственные лѣса достигаютъ на высотѣ 6—7000 футъ. Древесныя породы весьма разнообразны. Здѣсь растутъ нѣсколько видовъ дубовъ *(Quercus sp.)*, вязы *(Ulmus Bungeana)*, липы *(Tilia argentatae* affinis и *Tilia cordatae* affinis), клены *(Acer uropyllum, A. multiserratum, A. truncatum)* и другія деревья, образующія мѣстами густые высокоствольные лѣса. Красная китайская береза *(Betula Bhojpatra)* вкраплена повсюду среди другихъ породъ и рѣдко встрѣчается сплошными насажденіями. По крутикамъ и скаламъ повсюду растетъ Самшитъ *(Buxus sp.)*, а около деревень Лото-пинъ и Іо-дзамъпу я встрѣчалъ дикій грецкій орѣхъ [1]). Поясъ лиственныхъ лѣсовъ цѣликомъ входитъ въ культурную, населенную полосу горъ, которая простирается примѣрно до 8000 ф. абсолютной высоты. Въ нижнихъ горизонтахъ здѣсь воздѣлываютъ почти тѣ же хлѣба, что и въ долинахъ, въ верхнихъ же преобладаетъ греча и голый ячмень. Садоводства и огородничества нигдѣ нѣтъ. Изъ птицъ наиболѣе характерныхъ для лиственныхъ лѣсовъ назову: два вида Фазіанидовъ, *Thaumalea picta* и *Ceriornis Temminckі*, пѣночекъ: *Phylloscopus magnirostris* и др.; мухоловокъ: *Xanthopygia cyanomelaena, Hemichelidon fuliginosa, Hemichelidon ferruginea;* кукушекъ: *Cuculus polyocephalus* и *C. striatus; Larvivora brunnea, Pericrocotus brevirostris, Zosterops erythropleura.* Звѣрей здѣсь почти не встрѣчается, кромѣ какъ случайно, за исключеніемъ дикаго кабана, который въ періодъ поспѣванія хлѣбовъ регулярно посѣщаетъ пашни.

Хвойныя деревья попадаются повсюду среди лиственныхъ лѣсовъ, даже въ самыхъ низкихъ горизонтахъ, но либо по одиночкѣ, либо небольшими группами. По мѣрѣ подъема въ горы количество хвойныхъ деревьевъ увеличивается и появляется береза *(Betula alba?)* [2]). На вершинахъ междудолинныхъ хребтиковъ и по склонамъ ихъ

---

[1]) Дикій грецкій орѣхъ до сихъ поръ, кажется, былъ найденъ только въ Манчжуріи, откуда и описано покойнымъ академикомъ Максимовичемъ нѣсколько видовъ. Къ сожалѣнію собранные мною плоды при перевозкѣ затерялись и тождественъ-ли ганьсуйскій видъ съ однимъ изъ Манчжурскихъ остается неизвѣстнымъ. Въ Сигученскомъ округѣ дикій грецкій орѣхъ встрѣченъ мною только по близости деревень. Это небольшое дерево не толще какъ въ руку, вышиною сажени 1—2. Плоды по формѣ схожи съ обыкновеннымъ грецкимъ орѣхомъ, но расположены по 5—6 штукъ вокругъ одной ножки въ четверть и болѣе длиной.

[2]) Тутъ же гнѣздятся *Carpodacus trifasciatus, Procarduelis rubescens* и *Trochalopteron Sukatschewi.*

она не рѣдко образуетъ сплошныя насажденія, на днѣ же долинъ обыкновенно перемѣшана съ другими породами, между прочимъ съ древовиднымъ рододендромъ *(Rhododendron sp.)*, стволъ котораго достигаетъ толщины обхвата. Выше идутъ уже почти сплошные хвойные лѣса, состоящіе главнымъ образомъ изъ ели и пихты *(Abies sp., Picea sp.)*, сначала поросшіе бамбукомъ, а затѣмъ болѣе чистые. Бамбукъ *(Phyllostachys nigra?)*, подобно хвойнымъ деревьямъ, встрѣчается очень низко въ долинахъ, но лишь одиночными кустами или островками, не образуя большихъ зарослей и не достигая полнаго роста. Сплошныя и мощныя заросли появляются примѣрно на высотѣ отъ 9000 футъ. Иногда онѣ довольно чистыя, большею же частью въ видѣ густаго подсѣда въ рѣдкомъ хвойномъ лѣсу. Растенія достигаютъ высоты $1^1/_2$—2-хъ саженъ, при толщинѣ ствола въ палецъ, и образуютъ почти непроходимыя чащи. Выше, приближаясь къ предѣлу древесной растительности, заросли постепенно теряютъ мощность и растенія уменьшаются въ высотѣ. Верхнюю окраину лѣсовъ почти повсюду образуютъ главнымъ образомъ двѣ породы: древовидный рододендръ *(Rhododendron Przewalskii)* и древовидный можжевельникъ *(Juniperus pseudosabina?)*. Обѣ породы встрѣчаются и ниже, но лишь отдѣльными деревьями, близъ же предѣльной линіи древесной растительности образуютъ часто сплошныя насажденія безъ всякаго подлѣска. Рододендровые лѣса растутъ преимущественно на мягкихъ склонахъ, можжевеловые же наоборотъ по самымъ дикимъ каменнымъ розсыпямъ, почти совершенно лишеннымъ земляного покрова, такъ что деревья коренятся въ разщелинахъ скалъ. Выше этихъ двухъ породъ начинаются уже альпійскіе луга и заросли альпійскихъ кустарниковъ преимущественно рододендровъ, образующія нерѣдко сплошныя поля. Хотя растенія обыкновенно едва достигаютъ высоты аршина, но стволы ихъ представляютъ такую сплошную ткань, что заросли эти совершенно почти непроходимы. Пояса хвойныхъ лѣсовъ и альпійскій представляютъ наибольшій интересъ въ фаунистическомъ отношеніи. Здѣсь сосредоточено большинство наиболѣе рѣдкихъ и характерныхъ для нашей мѣстности видовъ. Изъ птицъ наиболѣе характерныхъ для сплошныхъ хвойныхъ лѣсовъ прежде всего упомяну *Crossoptilon auritum*, *Tetraophasis obscurus*, *Ithaginis sinensis* и *Lophophorus Lhuisi;* послѣдній видъ свойственъ почти исключительно лѣсамъ древовиднаго можжевельника, но встрѣчается, впрочемъ, только въ одномъ мѣстѣ—въ хребтѣ, отдѣляющемъ провинцію Гань-су отъ Сы-чуани. Тутъже гнѣздятся *Carpodacus trifasciatus*, *Procarduelis rubescens* и *Trochalopteron Sukatschewi*. Изъ звѣрей обитаютъ *Nemorhedus Edwardsi*, *Semnopithecus Roxellanae*, *Ailuropus melanoleucus* (только въ хребтѣ, отдѣляющемъ Гань-су отъ Сы-чуани), различные виды *Ursus* и *Moschus sp.?* Бамбуковыя заросли имѣютъ почти только имъ однимъ свойственные виды, каковы *Conostoma aemodium*, *Cholornis paradoxa* и *Larvivora obscura*, а изъ млекопитающихъ *Rhizomys sinensis*. Альпійскій поясъ характеризуется вьюрками *(Leucosticte Brandti, Fringillauda nemoricola)*, видами *Accentor—erythropygius*, *ruboculoides*, *Grandala coelicolor*, *Pyrrhospiza Humei* и наконецъ *Megaloperdix tibetanus*, единственное существо изъ позвоночныхъ, оживляющее высокія, лишенныя даже

травы, голыя скалы. Изъ млекопитающихъ тутъ держится *Ovis Nahor*, *Moschus sifanica* (?), изрѣдка встрѣчаются маралъ и *Budorcas taxicola*.

Населеніе Сигученскаго и юго-восточной части Минчжоускаго округовъ состоитъ главнымъ образомъ изъ китайцевъ и тангутовъ, примѣрно по ровну тѣхъ и другихъ [1]). Китайцы занимаютъ по преимуществу долины главныхъ рѣкъ, тангуты — горы. Это разграниченіе, впрочемъ, далеко не строгое. Въ долинѣ Хей-шуй-цзяна, выше г. Си-гу, много тангутскихъ деревень; въ горахъ же, въ свою очередь, — китайскихъ. Китайцы кромѣ того являются повсюду піонерами въ дикихъ лѣсистыхъ мѣстностяхъ въ горахъ, селясь здѣсь небольшими поселками и отдѣльными хуторами. Всѣ подобныя поселенія образуются выходцами изъ различныхъ частей Китая, преимущественно бѣдняками, бѣгущими отъ малоземелья. Тангуты, которыхъ китайцы называютъ «Си-фань» или «Фань-цза» и сами себя зовущіе «Пю», частью находятся вмѣстѣ съ остальнымъ населеніемъ въ вѣдѣніи китайскихъ чиновниковъ, частью же подвѣдомственны собственному князю, называемому Тту-сы, по фамиліи Ма (Ма-ттусы) [2]). Резиденція его находится въ мѣстечкѣ Танъ-чанъ и ему подчинены тангуты по Танчанской рѣкѣ, а частью и по Сатанпинской. Власть этого князя не велика, меньше власти русскихъ помѣщиковъ дореформеннаго времени. Подданные обязаны въ отношеніи князя только нѣкоторыми натуральными повинностями, подати же платятъ наравнѣ съ остальнымъ населеніемъ. Въ физическомъ отношеніи тангуты въ большинствѣ случаевъ довольно высокіе, сухощавые, хорошо сложенные люди. Нерѣдко попадаются особи съ совершенно правильнымъ прорѣзомъ глазъ, мало выдающимися скулами, овальнымъ лицомъ и хорошими зубами, — болѣе похожіе на арійцевъ, чѣмъ на представителей монгольскаго племени. Впрочемъ, типъ лица очень разнообразенъ и иногда сильно разнится въ двухъ смежныхъ деревняхъ. Повидимому здѣшнее тангутское населеніе образовалось изъ нѣсколькихъ, въ разное время осѣвшихъ племенъ или народностей. Мущины носятъ обыкновенное платье китайскихъ крестьянъ, женщины же повсюду имѣютъ своеобразную одежду и головной уборъ, различные въ разныхъ

---

[1]) Кромѣ того, по Танчанской рѣкѣ есть нѣсколько деревень, населенныхъ народомъ, который китайцы называютъ «Тту-жень». Люди эти по языку не отличаются отъ сосѣднихъ тангутовъ, но ихъ женщины носятъ платье въ родѣ китайскаго и бинтуютъ ножки. Въ этомъ отношеніи они сходны съ туженями Хе-джоускаго и Синиинскаго округовъ (Далда Пржевальскаго), но эти говорятъ языкомъ монгольскаго корня.

[2]) Подобныхъ «Тту-сы» въ югозападной Гань-су очень много. Самый крупный изъ нихъ «Янъ-ттусы», резиденція которая находится въ монастырѣ Джани-бомбо, выше г. Минъ-чжоу вверхъ по р. Тао-хе. Онъ имѣетъ даже небольшое войско и ему, между прочимъ, подчинено племя Тебу, хотя власть его здѣсь почти номинальна. Второй по значенію князь Ма-тту-сы. Кромѣ этихъ двухъ князей между тангутами и ттуженями есть много мелкихъ тту-сы, у иныхъ изъ которыхъ всѣхъ подданныхъ наберется не болѣе десятка. Тангуты, находящіеся въ настоящее время въ непосредственномъ вѣдѣніи китайскихъ чиновниковъ, нѣкогда также были подчинены тту-сы. Жители дер. Лотáни говорили мнѣ, что у нихъ нѣкогда, давно, былъ свой тту-сы, по фамиліи, кажется, Хуáнъ, человѣкъ жестокій и корыстолюбивый. Выведенное изъ терпѣнія населеніе жаловалось высшимъ китайскимъ властямъ. Тту-сы судили и казнили, весь его родъ услали куда-то въ изгнаніе, а подданныхъ подчинили китайскимъ чиновникамъ. Этой перемѣной населеніе осталось, повидимому, довольно.

деревняхъ. Обѣ народности, китайцы и тангуты, уживаются довольно хорошо и враждебности между ними почти не замѣтно. Тангуты впрочемъ вообще не любятъ китайцевъ и смѣшанные браки рѣдки. Прежде, какъ говорятъ, они бывали чаще. Во всякомъ случаѣ смѣшеніе происходило и происходитъ, что въ иныхъ мѣстахъ рѣзко замѣтно и въ типѣ. По отношенію къ европейцамъ въ югозападной Гань-су, какъ и въ Хой-сянскомъ округѣ, я не встрѣтилъ ни малѣйшаго недружелюбія ни со стороны китайскаго, ни тангутскаго населенія. По сравненіи съ сообщительными, любопытными, болтливыми китайцами тангуты на первыхъ порахъ производятъ впечатлѣніе людей недовѣрчивыхъ и угрюмыхъ, но по ближайшемъ знакомствѣ я вынесъ о нихъ самыя теплыя воспоминанія. Съ тангутами трудно только сойтись и пріобрѣсти довѣріе, но разъ это удалось они оказываются искренними, простыми и сердечными людьми, на которыхъ вполнѣ можно положиться, чего о разсчетливыхъ и разсудочныхъ китайцахъ сказать отнюдь нельзя [1]).

Занятіе населенія главнымъ образомъ земледѣліе, въ которомъ тангуты отнюдь не уступаютъ китайцамъ. Скотоводства нигдѣ нѣтъ. Тангуты, какъ и китайцы, употребляютъ рогатый скотъ исключительно для работы и не доятъ [2]). Держатъ обыкновенныхъ коровъ, но встрѣчаются въ небольшомъ числѣ и яки, помѣсь которыхъ съ коровой очень цѣнится какъ рабочій скотъ [3]). Лошадей, какъ и въ Хойсянскомъ округѣ, почти совершенно нѣтъ. Какъ подспорье къ земледѣлію занимаются мѣстами лѣснымъ промысломъ [4]), сборомъ лѣкарственныхъ кореньевъ, какъ ревень (тей-хуанъ),

---

[1]) Я жилъ большею частью въ тангутскихъ деревняхъ и устраивался такъ. Въ Си-гу я познакомился съ мѣстнымъ мандариномъ по фамиліи Ту (Ту-та́-лое, какъ его зоветъ населеніе), оказавшимся весьма любезнымъ и предупредительнымъ человѣкомъ, и получилъ отъ него открытый листъ по его округу. Являясь въ первый разъ въ деревню, я отыскивалъ старосту (сянъ-ѣ), предъявлялъ листъ и требовалъ отвода квартиры, заявляя, что за все будетъ заплачено. Къ послѣднему заявленію относились обыкновенно скептически, принимали неохотно и, на первыхъ порахъ, оказывалось, что въ домѣ ничего нѣтъ, ни провизіи для меня, ни корму для моихъ муловъ. Но когда мой слуга вытаскивалъ деньги и предлагалъ купить на наличныя, понемногу все находилось и кончалось всегда тѣмъ, что уѣзжая я разставался со своими хозяевами въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, со всевозможными пожеланіями хорошаго пути и съ приглашеніемъ заѣзжать еще. Въ деревнѣ Са́тани, гдѣ я жилъ два раза, оба раза я останавливался у старосты по имени Чеде. При окончательномъ отъѣздѣ меня вышла провожать вся семья и нѣсколько другихъ лицъ деревни, съ которыми я вступалъ въ сношенія. Братъ Чеде, добродушный 50-лѣтній лама Ко-джа-ба, даже пролилъ на разставаньи нѣсколько слезинокъ.

[2]) Коровье масло однако можно найдти почти во всѣхъ тангутскихъ деревняхъ, но въ небольшомъ количествѣ и по дорогой цѣнѣ. Все масло идетъ изъ Тебу и употребляется главнымъ образомъ для похоронной церемоніи, при сжиганіи труповъ.

[3]) Насколько я могъ разъяснить себѣ, при скрещиваніи яка съ обыкновеннымъ рогатымъ скотомъ изъ ублюдковъ безплодны только самцы, самки же плодовиты. Это въ первомъ поколѣніи. Какъ обстоитъ дѣло въ слѣдующихъ поколѣніяхъ, выяснить не удалось. У китайцевъ и тангутовъ существуетъ нѣсколько названій для обозначенія степеней родства. Повидимому потомки постепенно возвращаются къ типу того вида, кровь котораго преобладаетъ. Цѣнится въ особенности первая помѣсь, называемая китайцами «пьянь-ню». Чистый якъ необузданъ, невыносливъ въ работѣ и не долговѣченъ. Помѣсь же обладаетъ противоположными качествами и въ высшей степени, чѣмъ обыкновенный рогатый скотъ.

[4]) Лѣсной промыселъ распространенъ главнымъ образомъ по Танчанской рѣкѣ, гдѣ населеніе очень бѣдно. Пилятъ доски и дерутъ гонтъ для мѣстнаго употребленія. Кромѣ того приготовляютъ

такъ-сынъ, такъ-гуй и др., и охотой за кабаргой. Охотниковъ, въ особенности между тангутами, очень много. Охотятся съ ружьемъ и собаками, но еще болѣе распространена охота силками. Ружья, порохъ, снаряды почти тѣ же, что въ юго-восточной Гань-су, за исключеніемъ развѣ того, что здѣсь встрѣчаются ружья съ витыми стволами. Всѣ они идутъ изъ Тебу, гдѣ дѣлаются мѣстными кузнецами изъ привознаго китайскаго желѣза. Собаки, употребляемыя для охоты, простыя дворняшки, различной величины и мастей, большею частью со стоячими ушами и съ пушистымъ, загнутымъ крючкомъ хвостомъ. На охоту отправляются обыкновенно на недѣлю, компаніями въ 5—6 человѣкъ. Этотъ срокъ обусловливается тѣмъ, что на это время человѣкъ можетъ захватить провизіи, не слишкомъ обременяя себя ношей. Иногда устраиваютъ и большія облавы, въ которыхъ принимаютъ участіе десятки людей и сотни собакъ. Время такихъ облавъ—поздняя осень по окончаніи полевыхъ работъ; онѣ предпринимаются исключительно для развлеченія. Гоняютъ преимущественно кабановъ. Особенные любители до такихъ грандіозныхъ облавъ жители южной части Сатанинской рѣки, извѣстные у другихъ тангутовъ подъ названіемъ «мамано». Ружья у нихъ, говорятъ, появились сравнительно недавно, не болѣе 20 лѣтъ, и до сихъ поръ еще въ ходу старинный способъ охоты съ однимъ ножемъ. Этотъ ножъ въ $^{3}_{4}$ аршина длины и очень толстый; ловкіе охотники умѣютъ метать на 20—30 шаговъ и даже болѣе, притомъ въ бѣгущаго звѣря.

Силками ловятъ фазіанидовъ, какъ *Crossoptilon auritum, Ceriornis Temmincki, Tetraophasis obscurus* и др., преимущественно же кабаргу. Силки дѣлаютъ изъ пеньковыхъ веревочекъ въ гусиное перо толщиной для кабарги и тоньше для птицъ. На кабаргу силки разставляютъ на землѣ, на тропинкахъ и переходахъ, посѣщаемыхъ животнымъ, и настораживаютъ къ деревцу или къ нарочно воткнутой эластической палкѣ, такъ чтобы животное попало ногой и было приподнято.

Каждый охотникъ ставитъ двѣ или три сотни силковъ и осматриваетъ ихъ два раза въ недѣлю. Если прошелъ снѣгъ, силки должны быть вновь переставлены: пеньковая веревочка намыкаетъ днемъ отъ пригрѣва солнца, замерзаетъ ночью и силокъ бездѣйствуетъ. Иногда ставятъ и другаго сорта силки,—висячіе. Небольшія петли, такого размѣра, чтобы прошла только голова животнаго, развѣшиваются на узкой лѣсистой тропинкѣ, по бокамъ ущелья, затѣмъ гонятъ животныхъ, пуская собакъ снизу. Охотниковъ силками можно встрѣтить въ каждой деревнѣ по нѣсколько. Эта охота даетъ хорошій заработокъ. Счастливый охотникъ можетъ въ годъ заработать на продажѣ мускуса болѣе 100 р.

Сдѣлаю еще нѣсколько замѣчаній о климатѣ юго-западной Гань-су.

Въ концѣ апрѣля и первой половинѣ мая 1886 г., проведенныхъ мною въ пути по Амдосскому нагорью, отъ города Синина до мѣстечка Танъ-чанъ, стояла ясная и

толстыя плахи изъ древовиднаго можжевельника, которыя идутъ на гробы, очень цѣнятся и вывозятся отсюда преимущественно въ г. Лань-чжоу.

довольно теплая погода; дождь шелъ за все время только раза три — четыре, притомъ лишь однажды (16 — 17 мая) значительный. Около г. Синина, откуда я выѣхалъ 24 апрѣля, весна только что началась: пашни уже зеленѣли, въ садахъ цвѣли абрикосы, но зелень хлѣбовъ была не болѣе $1\frac{1}{2}$ вершковъ, увалы долины казались желтыми отъ прошлогодней травы, а кустарники и деревья едва лишь начинали распускаться. Черезъ три недѣли, около г. Минъ-чжоу, лежащаго болѣе двухъ градусовъ южнѣе Синина и почти на той же абсолютной высотѣ (7500 ф.), хлѣба на пашняхъ были не выше четверти, а кустарники и деревья еще не въ полной листвѣ. Такой же видъ, т. е. весенній, имѣла страна верстъ 30—40 къ юго-востоку отъ Минъ-чжоу, до дер. Ке-та-пу, лежащей уже въ системѣ Голубой рѣки, на высотѣ 7300 ф. Въ мѣстечкѣ Танъ-чанъ, всего въ 30 верстахъ отъ Ке-та-пу, но на 2300 ф. ниже, 19 мая я засталъ уже настоящее лѣто: деревья въ полной листвѣ, хлѣба на пашняхъ выше $\frac{1}{2}$ аршина. Три съ половиной лѣтнихъ мѣсяца, проведенные мною здѣсь (въ дер. Іо-дзамъ-пу), были чрезвычайно обильны дождями и грозами. Обыкновенно ясные дни чередовались съ пасмурными и дождливыми, либо дождь шелъ ежедневно, но ежедневно же и разъяснивало. Хорошая погода рѣдко стояла болѣе двухъ дней подъ рядъ, но зато ненастье частенько затягивалось на довольно продолжительное время. Въ послѣднемъ случаѣ вся мѣстность закутывалась густой туманной мглой и дождь моросилъ непрерывно. Къ концу ненастья температура рѣзко понижалась и когда, вслѣдъ за тѣмъ, небо прояснивалось, — высокія горы, всякій разъ, оказывались покрытыми снѣгомъ. Такъ снѣгъ въ горахъ наблюдался 21 мая, 3 и 20 іюня и 6 іюля[1]). Грозы въ началѣ лѣта хотя и бывали, но не особенно часто и не сильныя, съ конца же іюня наступилъ періодъ почти ежедневныхъ сильныхъ грозъ, продолжавшійся, съ небольшими перерывами, около двухъ недѣль. Съ утра стоитъ прекрасная погода, а къ полудню набѣжитъ грозовая туча съ ливнемъ, иногда двѣ — три подъ рядъ, къ вечеру же снова выяснитъ. Послѣ трехъ ненастныхъ дней 4-го, 5-го и 6-го іюля—когда какъ я уже отмѣтилъ, въ горахъ выпалъ снѣгъ — 7-го и 8-го числа стояла ясная погода днемъ, но каждую ночь гремѣлъ громъ и шелъ дождь, а 9-го вечеромъ разразилась чрезвычайно сильная гроза съ градомъ, пришедшая съ юго-востока. 10-го іюля было пасмурно, а 11-го снова разразились двѣ послѣдовательныхъ грозы съ градомъ, пришедшія, на этотъ разъ, съ сѣвера[2]). Послѣ этого времени, грозы хотя и бывали, но

---

[1]) Снѣгъ лѣтомъ въ горахъ послѣ ненастья я наблюдалъ и въ 1885 г. около деревни Дзю-юань (въ 15—20 верстахъ на с.-з. отъ города Си-гу). Съ вечера 5-го августа, въ продолженіи всей ночи, до 6-го шелъ сильный дождь, причемъ температура понизилась до +10° С. Послѣ полудня 6-го, когда небо прояснилось, въ особенности на западѣ, и выглянуло даже раза два солнце, высокія горы около деревни оказались покрытыми снѣгомъ. На небѣ можно было различить два слоя облаковъ, двигавшихся въ перпендикулярныхъ другъ къ другу направленіяхъ. Верхній, высокій слой состоялъ изъ хлопчатыхъ бѣлыхъ барашковъ и надвигался съ запада; нижній же былъ образованъ дымчатыми и съ не рѣзкими, рваными контурами тучами, которыя нависли надъ страной почти касаясь земли и ползли, волнуясь, съ сѣвера на югъ.

[2]) Градомъ 9-го и 11-го іюля уничтожило всѣ посѣвы какъ въ ущельи рѣчки Іо-дзамъ-пу, такъ и въ сосѣднихъ, а частью и около Танъ-чана. Жители дер. Іо-дзамъ-пу торопились убрать кое-гдѣ уцѣ-

не такія сильныя и все рѣже и рѣже. Въ сентябрѣ, который я провелъ около дер. Лотани, стояла порядочно дождливая, но теплая лѣтняя погода, съ начала же октября стало холодѣть и пошли дожди, затягивавшіеся на три—четыре дня подъ рядъ. Большинство гнѣздовавшихъ птицъ, въ это время улетѣло, такъ что въ дер. Са́тани, куда я перебрался 16-го октября, я не встрѣтилъ изъ нихъ уже ни одной. Отправившись изъ Са́тани 25-го октября на экскурсію въ высокія горы къ югу отъ деревни, я былъ захваченъ здѣсь ненастьемъ, продолжавшимся около трехъ недѣль. Сначала шелъ ежедневный дождь, съ 1-го ноября — дождь, чередующійся со снѣгомъ, а затѣмъ одинъ снѣгъ. Холода однако были еще незначительны. Въ ущельяхъ снѣгъ лежалъ мокрый и подмерзало только по ночамъ. Безлѣсные покати горъ и скалы, одѣтые рѣдкими лѣсами древовиднаго можжевельника, покрылись крѣпкимъ, совершенно прозрачнымъ, слоемъ льда, который дѣлалъ здѣсь ходьбу почти невозможной. Ледъ слегка таялъ днемъ и постепенно исчезъ, продержавшись нѣсколько дней. Ненастный періодъ закончился около середины ноября и затѣмъ установилась хорошая погода. Изрѣдка шелъ снѣгъ, но ненастье не затягивалось болѣе двухъ дней. Такая погода стояла до самаго моего отъѣзда въ Хойсянскій округъ, т. е. до начала января 1887 г.[1]). Зимніе холода около Са́тани не превышали, вѣроятно, —15, —20° С., но были довольно постоянны. Рѣчка у деревни была покрыта льдомъ, хотя не толстымъ. Морозило, впрочемъ, главнымъ образомъ по ночамъ, днемъ же было сравнительно тепло, но не таяло. Снѣжный покровъ, какъ въ долинѣ Са́танинской рѣки, такъ и въ горахъ, не превышалъ $^1/_2$ аршина и лежалъ только на тѣневыхъ склонахъ. На покатяхъ, обращенныхъ къ солнцу, выпавшій снѣгъ держался лишь нѣсколько дней и постепенно незамѣтно исчезалъ. Въ лѣсахъ снѣгъ былъ рыхлый, въ высокихъ же открытыхъ горахъ — покрытъ настомъ, державшимъ человѣка. Зима въ долинѣ Хей-шуй-цзяна такая же безснѣжная, какъ и около г. Хой-сяна, показалась мнѣ не менѣе, если не болѣе теплою. Хотя г. Си-гу лежитъ подъ той же широтой, какъ и Хой-сянъ, но значительно выше,—садовая растительность здѣсь отнюдь не уступаетъ хойсянской, скорѣе на оборотъ. Вѣроятно это объясняется тѣмъ, что Хой-сянъ расположенъ въ мѣстности открытой, Си-гу же въ глубокомъ ущельи, обращенные къ югу скалистые бока котораго сильно нагрѣваются солнцемъ.

М. Березовскій.

лѣвшій хлѣбъ, пахали и сѣяли гречу. Первый посѣвъ состоялъ почти исключительно изъ голаго ячменя, который жнутъ около середины мѣсяца. Когда 12-го іюля я пошелъ въ горы, тамъ представлялась картина разрушенія: луга были выбиты, точно прогнали гуртъ скота, а въ лѣсу лежалъ въ четверть толщиной слой листьевъ и мелкихъ древесныхъ вѣтвей, подъ нимъ же градъ. На покатяхъ, гдѣ градъ скатывался и чѣмъ нибудь задерживался, онъ образовывалъ толщи въ $^1/_2$ аршина, которыя, будучи прикрыты листьями, не таяли дня два—три. Средняя величина градинъ была въ лещинный орѣхъ, но попадались градины и въ два—три раза крупнѣе.

[1]) Въ январѣ 1885 г., проведенномъ мною также въ дер. Са́тани, стояла великолѣпная теплая погода. Во второй половинѣ мѣсяца, на пригрѣвахъ солнца около деревни, даже разцвѣли подснѣжники, но затѣмъ пошелъ снѣгъ, покрывшій страну болѣе чѣмъ на четверть. 8-го февраля, когда я выѣхалъ изъ Са́тани въ Гумбумъ, погода еще не установилась.

МАРШРУТЪ.

1884	Май	25	Г. Пекинъ.
		29—30	Въ г. Бао-динъ-фу.
	Іюнь	1	Г. Танъ-сянъ.
		4	Г. Фоу-пинъ.
		8—13	Въ монаст. У-тай.
		16	Г. Тай-чжоу.
	Іюль	2	Г. Шо-пинъ-фу.
		6—30	Въ г. Гуй-хуа-ченъ.
	Авг.	3	Мѣстечко Хе-коу; 4 августа переправились черезъ Желтую рѣку и вступили въ Ордосъ.
		11—16	Въ ставкѣ князя Чжунгаръ.
		21—23	На р. Уланъ-муренъ.
		25—29	На оз. Чаганъ-норъ, близъ ставки Вана.
	Сент.	14—21	Въ Боро-балгасунъ, католическомъ миссіонерскомъ станѣ.
		27	Г. Хуа-ма-ченъ, на границѣ Ордоса и Гань-су.
	Октяб.	2— 5	Въ г. Линь-чжоу.
		7	Г. Цзинь-цзи-пу.
		13	Г. Вей-чжоу.
		21	Г. Хай-ченъ.
		27—28	Въ г. Цзинь-юань; здѣсь перешли на лѣвую сторону Желтой рѣки.
	Ноябр.	3—17	Въ г. Лань-чжоу, столицѣ Гань-су; передъ самымъ городомъ опять перешли на правую сторону Желтой рѣки. Здѣсь я отдѣлился отъ экспедиціи.
		18—30	Въ пути до г. Хой-сянъ (черезъ г.г. Гунъ-чанъ-фу и Цинъ-чжоу).
	Декаб.	1—	
1885	Янв.		
	Февр.		Въ округѣ г. Хой-сянъ.
	Март.		
	Апр.		
	Май	— 7	
		8—16	Въ пути до г. Минъ-чжоу (черезъ гг. Ченъ-сянъ, Си-хо и Ли-сянъ).
		17—	
	Іюнь	— 3	Въ г. Минъ-чжоу.
		4— 9	Въ монаст. Джонй-бомбѳ, на р. Тао-хе выше г. Минъ-чжоу. Здѣсь я присоединился къ экспедиціи.
		10—23	Въ пути съ экспедиціей до г. Си-гу (черезъ г. Минъ-чжоу).
		24—	
	Іюль	— 3	Въ г. Си-гу. Здѣсь я снова отдѣлился отъ экспедиціи, которая направилась въ г. Сунъ-панъ.
		4—22	Въ дер. Лото-пинъ (Ледеби).
		23—26	Въ г. Си-гу.
		27—	
	Авг.	—15	Въ дер. Дзю-юань.
		16—20	Въ г. Си-гу.
	Авг.	21—	
	Сент.	— 1	Въ пути до г. Лань-чжоу (черезъ гг. Минъ-чжоу и Ди-дао-чжоу).
		2—	
	Окт.	30	Въ г. Лань-чжоу.
		31—	
	Нояб.	11	Въ пути до г. Си-гу (черезъ гг. Ди-дао-чжоу и Минъ-чжоу).
		12—16	Въ г. Си-гу.
		17—23	Въ дер. Лото-пинъ (Ледеби).
	Декаб.	24—	
1886	Янв.		Въ дер. Сатани (Хедэ).
	Февр.		
		— 7	
		8—15	Въ г. Си-гу.
		16—	
	Март.	— 6	Въ пути до монаст. Гумбумъ (черезъ гг. Минъ-чжоу, Ди-дао-чжоу, Лань-чжоу и Си-нинъ). Здѣсь я присоединился къ экспедиціи.
		7—	
	Апр.	12	Въ монаст. Гумбумъ. Экспедиція выступила отсюда въ г. Дань-гэръ 10 апрѣля.
		13—16	Въ дер. Чунъ-дзя, въ 40 верстахъ къ югу отъ Гумбума.
		17	Г. Дань-гэръ. Здѣсь я окончательно отдѣлился отъ экспедиціи, которая черезъ Куку-норъ и Нань-шань направилась въ Россію.
		18—19	Въ монаст. Гумбумъ.
		20—24	Въ г. Си-нинъ.
		25—29	Въ пути до уроч. Сань-чуань на Желтой рѣкѣ.
		30—	
	Май	— 5	Въ уроч. Сань-чуань.
		6— 7	Въ пути до г. Хе-чжоу.
		8—11	Въ г. Хе-чжоу.
		12—19	Въ пути до мѣстечка Танъ-чанъ (черезъ гг. Ди-дао-чжоу и Минъ-чжоу).
		20—22	Въ мѣстечкѣ Танъ-чанъ.
		23—	
	Іюнь		
	Іюль		Въ дер. Іо-дзамъ-пу (Чодзонѳ).
	Авг.	—30	
		31—	
	Сент.	— 3	Въ мѣстечкѣ Танъ-чанъ.
		4— 5	Въ пути до г. Си-гу.
		6— 9	Въ г. Си-гу.
		10—11	Въ пути до дер. Лотани.
		12—	
	Октяб.	—12	Въ дер. Лотани (Ротѳ).
		13—14	Въ пути до г. Си-гу.
		15—16	Въ г. Си-гу.
		17—	
	Ноябр.		Въ дер. Сатани (Хедэ).
	Декаб.	—15	
		16—30	Въ дер. Чагани (Чагѳ).
		31—	
1887	Янв.	— 5	Въ г. Си-гу.

Авг.	6—13	Въ пути до г. Хой-сянъ (черезъ гг. Кье-чжоу и Ченъ-сянъ).
Февр. Март.	14— —30	Въ округѣ г. Хой-сянъ и въ пограничныхъ частяхъ провинціи Шень-си (дер. Ланъ-дзя-коу).
Апр.	31— —20	Въ пути до г. Си-нинъ (черезъ гг. Си-хо, Ли-сянъ, Нинь-юань, Гунъ-чанъ-фу, Ди-дао-чжоу и Хе-чжоу).
Май.	21— — 1	Въ г. Си-нинъ.
	2— 9	Въ пути до г. Лянъ-чжоу.
Май.	10—19	Въ г. Лянъ-чжоу.
	20—27	Въ пути до г. Лань-чжоу.
Іюнь	28— — 6	Въ г. Лань-чжоу.
	7—20	Въ пути до г. Нинъ-ся.
	21—29	Въ г. Нинъ-ся.
Іюль	30— — 8	Въ пути (на лодкѣ) до г. Бауту.
	9—12	Въ пути до г. Гуй-хуа-ченъ.
	13—15	Въ г. Гуй-хуа-ченъ.
	16—22	Въ пути до г. Джанъ-дзя-коу (Калганъ).
	23—27	Въ Калганѣ.
Авг.	28	Въ пути отъ Калгана до Троицкосавска.

Такъ какъ въ составъ коллекціи вошелъ весь сборъ экспедиціи по всему ея пути, считаемъ нужнымъ дать табличку распредѣленія видовъ по мѣстамъ сбора. По физико-географическимъ особенностямъ и географическому положенію мы раздѣлили все пройденное экспедиціею пространство на 14 областей. Области эти слѣдующія:

1. *Пекинская равнина:* По пути экспедиціи отъ г. Пекина, черезъ г. Бао-динъ-фу, до г. Танъ-сянъ; съ 25-го мая по 1-е іюня 1884 г. Сплошь культивированная, густо заселенная, равнина (Пекинъ 293, Бао-динъ-фу 57, Танъ-сянъ 264 фута надъ уровнемъ моря).
2. *Горная страна между пекинской равниной и горами У-тай-шань:* По пути отъ г. Танъ-сянъ, черезъ г. Фоу-пинъ, до монастыря У-тай; съ 1-го по 8-е іюня 1884 г. Всю эту страну можно разсматривать какъ восточныя предгорья горъ У-тай-шань. Мѣстность постепенно возвышается отъ 660 футъ (дер. Чу-дзя-юй, близъ г. Танъ-сянъ) до 1010 ф. (г. Фоу-пинъ) и до 5605 футъ у монастыря У-тай, расположеннаго у подошвы горъ. Общій характеръ страны пустынный, дикой древесной растительности нѣтъ. Населеніе довольно густо, но преимущественно только въ долинахъ; здѣсь встрѣчаются сады и аллеи деревьевъ вдоль дороги.
3. *Горы У-тай-шань:* Съ 8 по 14 іюня 1884 г. Окрестности монастыря, гора Пей-тай (10.270 ф.) и по пути въ г. Тай-чжоу до дер. Сы-дзы-пинъ (5400 ф.), гдѣ встрѣчаются еще остатки хвойныхъ лѣсовъ. Гора Пей-тай и ея вершины — безлѣсны.
4. *Горная страна, отдѣляющая горы У-тай-шань отъ Ордоса:* По пути отъ монастыря У-тай (собственно отъ дер. Сы-дзы-пинъ), черезъ г. Тай-чжоу, г. Шо-пинъ-фу, до г. Гуй-хуа-ченъ (собственно до дер. Си-коу-мынь, гдѣ начинается Кукухотинская равнина); съ 14 іюня по 5-е іюля 1884 г. Общій характеръ страны тотъ же, что и восточныхъ предгорій У-тая, но еще пустыннѣе и населеніе рѣже. Низшая точка по пути — г. Тай-чжоу — 3160 ф.; высшая — дер. Спинъ-джа-сань (близъ г. Шо-пинъ-фу) 4950 ф.

5. *Ордосъ:* По пути отъ г. Гуй-хуа-чена; мѣстечко Хе-коу (переправа черезъ Желтую рѣку, отсюда начинается Ордосъ), ставка князя Чжунгаръ, оз. Чаганъ-норъ (близъ ставки князя Ванъ), католическій миссіонерскій станъ Боро-балгасунъ, до города Хуа-ма-ченъ (Гань-су); съ 30 іюля по 27 сентября 1884 г. Мѣстность между Гуй-хуа-ченомъ и Хе-коу — болотистая культивированная равнина 3450 ф. средней высоты. Восточный Ордосъ — волнистая страна (низшая точка 3868 ф. — ставка Чжунгаръ; высшая уроч. Шаръ-бурдю, близъ оз. Баинъ-норъ — 4729 ф.), мало населенная, но не пустынная и въ общемъ богатая водой и растительностью. Характеръ мѣстности разнообразный. Встрѣчаются: сыпучіе пески и барханы; въ промежуткахъ между ними луговыя и даже болотистыя равнины; густыя заросли облепихи и другихъ кустарниковъ; плоскія песчаныя долины рѣкъ, увалы которыхъ густо одѣты кустарникомъ и даже мелколѣсьемъ (р. Уланъ-муренъ); окрѣпшіе барханы сплошь одѣтые густой и непроходимой зарослью стелющагося можжевельника; озера прѣсной и соленой воды; солончаки и степныя заросли дерисуна. Мѣстность къ западу отъ Боро-балгасуна болѣе пустыннаго характера.

6. *Сѣверо-восточная Гань-су:* По пути отъ г. Хуа-ма-чена, черезъ гг. Линь-чжоу, Цзинь-цзи-пу, Вей-чжоу, Хай-ченъ, Цзинь-юань, до г. Лань-чжоу, столицы Гань-су; съ 27 сентября по 3 ноября 1884 г. Гг. Линь-чжоу (3668 ф.) и Дзинъ-цзи-пу (3912 ф.) лежатъ въ равнинѣ, орошаемой отчасти каналами изъ Желтой рѣки. Мѣстность сильно культивирована, — преимущественно рисовыя поля. Страна между Цзинь-цзи-пу и г. Цзинь-юань очень напоминаетъ западныя предгорья У-тай-шаня, но кажется еще пустыннѣе. Сильно развита формація солончаковатаго лёсса. Дикой древесной растительности нѣтъ; населеніе рѣдкое. Высшая точка 6512 ф. (дер. Санъ-пу-дза, недалеко отъ г. Цзинь-юань), низшая—4770 ф. у г. Цзинь-юань, лежащаго въ долинѣ Желтой рѣки. Отъ Цзинь-юаня экспедиція перешла на лѣвую сторону послѣдней, а затѣмъ обратно на правую сторону около самаго города Лань-чжоу (4915 ф.). Мѣстность по лѣвой сторонѣ Желтой рѣки — глубоко размытое лёссовое плато и дорога постоянно почти идетъ въ узкихъ глубокихъ лёссовыхъ коридорахъ.

7. *Культурная полоса у подошвы Нань-шаня:* По обратному пути экспедиціи отъ г. Ли-юань-инъ, черезъ г. Фу-и-тинъ, до уроч. Цаганъ-бурюкъ; съ 2 по 16 іюня 1886 г. Система рѣки Ецзинъ гола. Дер. Лу-я-тунъ, стоянка экспедиціи, находящаяся въ 10 верстахъ къ востоку отъ города Гао-тай имѣетъ высоту 4613 ф.

8. *Гоби:* По обратному пути экспедиціи отъ уроч. Цаганъ-бурюкъ до уроч. Хара-усу; съ 16 іюля по 3 сентября 1886 г.

9. *Хангай:* По обратному пути экспедиціи отъ уроч. Хара-усу до Троицкосавска; съ 3 сентября до 21 октября 1886 года.

10. *Амдоское нагорье:* Сюда вошелъ сборъ Г. Н. Потанина зимой 1884—85 г. въ мѣстности Санъ-чуань, на Желтой рѣкѣ, выше г. Лань-чжоу въ 5 дняхъ пути;—мой сборъ 13—15 апрѣля 1886 г. около дер. Чунъ-дзя, лежащей верстахъ въ 40 къ югу отъ г. Синина и верстахъ въ 10 отъ Желтой рѣки;—сборъ экспедиціи по пути отъ г. Синина, черезъ г. Гуй-дэ, г. Боу-нань, монаст. Лабранъ, г. Джіу-ченъ, монаст. Джонп-бомбо, до г. Мпнъ-чжоу, — съ 1 мая по 12 іюня 1885 г.; — сборъ по обратному пути экспедиціи отъ г. Дань-гэръ, оз. Куку-норъ, горы Нань-шань, до г. Ли-юань-пнъ, у сѣверной подошвы Нань-шаня; съ 11 апрѣля по 2 іюня 1886 г. Амдо есть сѣверо-восточная часть Тибетскаго нагорья, расположенная почти псключительно въ системѣ Желтой рѣки (кромѣ бассейна Куку-нора и рѣкъ сѣвернаго склона Нань-шаня, питающихъ замкнутые бассейны озеръ на монгольскомъ плоскогорьи). Сѣверную границу Амдоскаго нагорья составляетъ хребетъ Нань-шань примѣрно до меридіана г. Лань-чжоу. Восточная граница идетъ почти въ меридіональномъ направленіи отъ г. Лань-чжоу до Желтой рѣки, а къ югу отъ послѣдней—по водораздѣлу между системами рѣки Тао-хе (притокъ Желтой) и системами Вей-хо (притокъ Желтой рѣки) и Голубой рѣки. Южная граница, вѣроятно, водораздѣльная линія между правыми притоками той части р. Тао-хе, которая течетъ съ з. на востокъ, и системой Голубой рѣки. Амдо—высокая страна, по которой проходятъ еще болѣе высокіе горные хребты, мѣстами со снѣговыми вершинами. Низшая точка въ южной части — городъ Мпнъ-чжоу — лежитъ на высотѣ 7600 Ф.
11. *Юго-западная Гань-су:* сюда вошелъ мой сборъ въ Сигученскомъ округѣ и той части Мпнчжоускаго, которая лежитъ въ системѣ Голубой рѣки.
12. *Нагорная Сы-чуань:* По пути экспедиціи отъ г. Мпнъ-чжоу, черезъ г. Нань-пнпъ, до г. Сунъ-панъ; съ 15 іюня до 27 іюля 1885 г.
13. *Юго-восточная Гань-су:* Сюда вошелъ мой сборъ въ округѣ г. Хой-сяна и на границѣ Шень-си.
14. *Шень-си:* Мой сборъ въ концѣ февраля 1886 г. и въ началѣ марта 1887 г. къ югу отъ г. Хой-сяна, главнымъ образомъ около дер. Лапъ-дзя-коу.

Объясненіе знаковъ.

* , въ графахъ 14-ти областей значитъ, что изъ данной области въ нашей коллекціи есть экземпляры
(*), » » » что, хотя экземпляровъ нѣтъ, но видъ несомнѣнно наблюдался
* , въ графахъ вертикальнаго распредѣленія (16—19) обозначенъ вѣроятный поясъ гнѣздованія.
—, » » » обозначаетъ, что въ данномъ поясѣ добыты наши экземпляры
s — sedens, осѣдлый.
n — nidulans, гнѣздующій.
h — hiemans, зимующій.
t — transvolans, пролетный.
c — craticus, случайный.
. — подлѣ буквы, что видъ рѣдокъ или очень рѣдокъ.
: — подлѣ буквы, что видъ обыкновенъ.
? — подлѣ буквы, какое либо сомнѣніе. Напр. у *Grandala coelicolor* поставлено S? ; видъ этотъ наблюдался и зимой и лѣтомъ, но лѣтомъ только разъ, а громадные табуны, встрѣченные зимой въ альпійскихъ лугахъ, наводятъ на мысль, что частью они состоятъ изъ птицъ, гнѣздующихъ въ Тибетѣ, и соединились въ Гань-су только на зимовку.
nh — nidulans partim, hiemans ex parte, гнѣздующія и зимующія; въ тѣхъ случаяхъ, когда наши наблюденія говорятъ въ пользу того предположенія, что видъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ, но правильно зимуетъ въ мѣстности и что вмѣстѣ съ тѣмъ *лѣтомъ* являются *другія* особи на гнѣздовку.

ТАБЛИЦА РАСПРЕДѢЛЕНІЯ СОБРАННАГО МАТЕРІАЛА

ПО ПУТИ ЭКСПЕДИЦІИ.

Страница.	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВЪ.	Пекинская равнина.	Горн. стр. между Пекинск. рав. и гор. У-тай-шанъ.	Горы У-тай-шанъ.	Горн. страна между У-тай-шанемъ и Ордосомъ.	Ордосъ.	Сѣв.-вост. Ганьсу.	Культурн. полоса у сѣв. подошвы Нань-шаня.	Гоби.	Хангайская горн. страна.	Алтайское нагорье.	Система Голубой рѣки. Юго-зап. Ганьсу.	Нагорная Си-чуань.	Юго-вост. Ганьсу.	Шенъси близъ границы Ганьсу.	Свойство пребыванія вида.	Вертик. распредѣл. Нижній культурный поясъ.	Поясъ лиственныхъ лѣсовъ.	Поясъ хвойныхъ лѣсовъ.	Алтайская область.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Sterna tibetana				*															
1	» longipennis				*															
2	Aegialites minor		*																	
2	» placidus													*		*h*	—			
3	» cantianus				*															
3	Lobivanellus cinereus					*								*		*e*	—			
3	Vanellus cristatus					*										*t*	—			
4	Ibidorhynchus Struthersi			*								(*)		*		*s*	—	—		
4	Himantopus melanopterus							*						*		*n?*	*			
4	Numenius lineatus													*		*e*				
4	Totanus calidris							*												
4	» glareola	*																		
5	» ochropus													*		*h*	—			
5	Actitis hypoleucus	*				*														
5	Limosa melanuroides					*														
5	Gallinago megala					*														
5	» gallinago						*							*		*h*	—			
6	Rallus indicus					*														
6	Gallinula chloropus	*																		
6	Fulica atra						*													
6	Casarca rutila					*														
6	Tadorna cornuta					*														
6	Anas boschas													(*)		*h:*	—			
7	» zonorhyncha						*	*												
7	Querquedula crecca						*							*		*h:*	—			
7	Fuligula cristata													*		*e*	—			
7	Ciconia nigra							*												
7 и 144	Nipponia nippon													*		*s:*	*			
11	Botaurus stellaris					*														
12	Herodias modesta	*																		
12	Tetrastes Sewertzowi											*				*s.*			*	
12	Perdix barbata										*									
13	» sifanica										*	*				*s.*				*
13	Caccabis chukar					*										*s*	*			
14	Lerva nivicola											*				*s.*				*
14	Tetraogallus tibetanus										*	*				*s.*				*
15	Ithaginis sinensis											*				*s*			*	
17	Thaumalea picta											*		*		*s*		*		

Страница.	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВЪ.	Пекинская равнина.	Горн. стр. между Пекинск. рав. и гор. У-тай-шань.	Горы У-тай-шань.	Горн. страна между У-тай-шанемъ и Ордосомъ.	Ордосъ.	Сѣв.-вост. Гань-су.	Культурн. полоса у сѣв. подошвы Нань-шаня.	Гибп.	Ханганская сорн. страна.	Амдоское нагорье.	Система Голубой рѣки. Юго-зап. Гань-су.	Нагорная Сы-чуань.	Юго-вост. Гань-су.	Шеньси близъ границы Гань-су.	Свойство пребыванія вида.	Вертик. распредѣл. Нижній культурный поясъ.	Поясъ лиственныхъ лѣсовъ.	Поясъ хвойныхъ лѣсовъ.	Альпійская область.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Phasianus torquatus	..	...	...	...	*	.	...	..	..	..	..	..	..	...	...	..	...	...	...
18	» Strauchi	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	*	*	*	...	s:	*	*	...	..
19	Pucrasia ruficollis	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s	...	—	—	..
20	Ceriornis Temminckі	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	(*)	...	s	...	*	...	..
21	Tetraophasis obscurus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	.	s	...	...	*	..
22	Lophophorus Lhuysi	..	...	.	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s.	...	...	*	..
24	Crossoptilon auritum	..	...	.	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s	...	...	*	..
26	Syrrhaptes paradoxus	..	...	...	...	..	..	...	*	..	..	..	..	..	...	..	...	..	...	..
26	Alsocomus Hodgsoni	..	...	..	..	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n.	...	*	...	..
26	Columba rupestris	..	...	...	...	..	..	...	..	..	*	(*)	..	(*)	...	s	...	—	..	..
27	Turtur orientalis	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	..	n.	...	*	...	..
27	» chinensis	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	.	..	*	..	s:	*	...	..	..
27	» douraca	..	..	.	*	..	..	...	..	..	..	(·)	..	*	..	s:	*	...	...	..
29	» humilis	.	...	...	...	..	..	...	..	..	..	.	..	*	..	n	*	...	...	..
29	Circus cyaneus	..	...	...	...	.	..	...	..	..	..	..	.	*	..	s?	—	—	...	..
30	Astur palumbarius	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s	...	—	..	..
30	Accipiter nisus	..	...	*	...	..	..	...	..	..	*	*	..	*	...	s	—	...	...	..
30	Nisaetus pennatus	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	...	..	*	...	s?	—	...	...	..
31	Aquila chrysaetus	.	...	...	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s?	—	...	...	..
32	Archibuteo strophiatus	..	...	...	...	*	..	...	..	..	*	..	..	..	...	..	...	...	...	..
34	» hemiptilopus	..	...	...	...	.	..	...	..	..	..	*	.	*	..	s?	—	...	...	..
40	Buteo plumipes	..	...	...	...	.	..	...	..	..	..	*	.	..	...	n?	...	*	...	..
41	Milvus melanotis	..	..	...	...	..	..	...	..	..	*	(*)	..	(*)	...	s	—	—	...	..
41	Tinnunculus japonicus	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	.	..	*	...	n	—	...	...	..
42	Erythropus amurensis	..	*	..	*	..	..	...	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	..
42	Aesalon regulus	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	..	..	*	...	n	—	...	..	..
42	Hierofalco saker	..	...	...	...	*	..	...	..	..	..	*	..	..	...	...	...	...	..	..
43	Syrnium nivicola	..	...	...	..	.	..	...	..	..	..	*	..	..	..	s	...	...	—	..
43	Otus vulgaris	..	...	...	...	*	..	...	..	..	..	..	..	*	..	s	—	...	..	..
43	Glaucidium Brodiei	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s	...	...	*	.
44	Carine bactriana	..	...	...	...	*	..	..	..	..	..	.	..	..	..	...	...	...	...	..
44	Bubo bengalensis	..	...	.	...	..	..	...	..	..	..	..	.	*	..	s	—	...	...	..
44	Cuculus canorus	..	...	...	...	*	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	...	..
45	» striatus	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	...	..
45	» poliocephalus	..	...	...	...	..	..	...	..	..	*	*	..	..	...	n	...	*	..	..
46	Cerile lugubris	..	..	...	...	.	..	...	..	..	..	..	..	*	...	s.	—	...	...	..
46	Upupa epops	..	...	..	..	..	..	...	..	..	..	..	..	*	..	n	*	...	...	..
47	Vivia chinensis	.	...	..	..	.	..	...	..	..	..	.	..	*	...	s	...	*	...	..
47	Gecinus Guerini	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	*	..	*	...	s	—	*	...	..
48	Dryocopus martius	..	...	...	.	..	..	...	..	..	..	*	..	..	..	s.	...	..	*	..
48	Jyngipicus kaleensis	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	..	s.	...	...	*	..
48	Picus Luciani	*	..	..	...	..	..	...	..	..	..	..	..	..	..	...	...	.	...	..
49	» Cabanisi	.	...	*	*	..	..	...	..	..	*	*	..	*	...	s	—	*	...	..
49	» Pernyi	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	.	..	..	...	s.	...	—	...	..
50	Jynx torquilla	..	...	...	...	..	..	...	..	..	*	(·)	..	..	...	n	—	...	...	..
50	Alauda coelivox	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	.	..	..	...	h?	...	.	—	..
50	Otocorys Brandti	..	...	...	...	..	..	...	..	..	*	..	..	..	...	..	...	...	...	..
51	Galerita leautungensis	..	...	.	...	..	..	*	.	.	.	..	..	..	...	...	...	...	...	..
51	Calandrella pispoletta	..	...	...	...	*	..	...	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	..
51	» brachydactyla	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	..	..	*	...	i?	—	..	..	..
51	Melanocorypha mongolica	..	...	...	...	*	..	...	..	..	..	..	..	..	...	...	.	...	...	..
52	Anthus maculatus	..	...	...	...	*	..	...	..	..	*	*	..	..	...	n	...	—	—	..
52	» rosaceus	..	...	*	...	..	..	...	.	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	..
52	» japonicus	..	...	...	...	..	..	...	..	..	..	..	..	*	...	h	—	...	...	..
53	» Richardi	..	...	...	...	..	..	*	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	..
53	» striolatus	..	...	*	...	*	..	...	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	..

Страница.	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВЪ.	Пекинская равнина.	Горн. стр. между Пекинск. равн. и гор. У-тай-шань.	Горы У-тай-шань.	Горн. страна между У-тай-шанемъ и Ордосомъ.	Ордосъ.	Сѣв.-вост. Гань-су.	Культура. полоса у сѣв. подошвы Нань-шаня.	Гоби.	Ханганская горн. страна.	Амдосское нагорье.	Система Голубой рѣки.				Вертик. распредѣл.				
												Юго-зап. Гань-су.	Нагорная Сы-чуань.	Юго-вост. Гань-су.	Шень-си близъ границы Гань-су.	Свойство предѣлания вида.	Нижній культурный поясъ.	Поясъ лиственныхъ лѣсовъ.	Поясъ хвойныхъ лѣсовъ.	Альпійская область.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53	Calobates melanope	..	...	..	...	..	..	..	..	..	..	..	..	*	...	n	—	...	...	...
53	Budytes citreola	..	...	..	..	*	..	...	.	..	.	*	..	*	...	n	—	—	...	...
53	» taivana	*	...	..	...	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	...	...
54	» cinereicapilla	..	...	..	...	*	..	...	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	..	..
54	Motacilla leucopsis	..	...	..	...	.	..	...	..	..	..	*	.	*	...	n	—	—	...	..
54	» lugens	..	...	..	...	*	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	..	...
54	Henicurus sinensis	..	...	..	...	.	..	...	..	..	..	*	..	*	*	s	—	*	...	..
55	Microcichla Scouleri	..	..	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	*	...	s	—	*	*	...
55	Pycnonotus xanthorrhous	..	...	..	..	.	..	...	.	..	..	..	..	*	..	s	—	..	...	...
55	Spizixus semitorques	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	..	..	*	...	s	—	...	...	...
56	Babax lanceolatus	..	...	..	..	..	..	...	..	..	.	*	.	..	...	s.	...	—	...	...
56	Pterorhinus Davidi	..	...	..	...	*	*	...	..	..	*	*	..	*	...	s	—	—	...	...
57	Trochalopteron Ellioti	.	...	..	...	..	.	...	..	..	..	*	.	*	...	s:	...	—	*	..
57	» cinereiceps	..	...	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	...	s	...	*	...	...
59	» Sukatschewi	..	...	..	...	.	..	...	..	.	.	*	..	..	...	s.	...	...	*	..
62	Janthocincla maxima	..	...	..	...	.	..	...	..	..	..	*	*	..	...	s	...	—	*	...
63	» lunulata	..	..	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	*	s	...	*	...	..
63	Pomatorhinus Styani	..	..	..	...	.	..	..	..	.	..	*	..	*	...	s	...	*	..	...
64	» gravivox	..	...	..	...	.	.	...	..	..	..	*	.	*	...	s	—	*	...	...
65	Dryonastes sannio	..	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.	..	*	...	s:	—	—	...	...
66	Conostoma aemodium	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	.	...	s.	...	...	*	...
66	Suthora webbiana	..	...	..	...	.	.	...	..	..	..	*	..	*	*	s	—	—	...	...
66	» conspicillata	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	*	*	s	...	—	—	...
67	» Przewalskii	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	.	s.	...	*	—	..
68	Cholornis paradoxa	..	...	..	...	.	..	...	.	..	..	*	..	..	...	s	...	...	*	...
68	Paradoxornis guttaticollis	..	...	..	...	.	..	...	..	..	..	..	..	..	*	s?	...	—	...	...
69	Fulvetta cinereiceps	..	...	.	...	..	..	..	.	..	..	*	..	*	...	s	...	—	—	...
69	» ruficapilla	.	...	..	...	..	..	..	.	..	..	*	..	*	...	s	...	—	...	...
69	Yuhina diademata	..	..	..	..	..	..	...	..	..	..	..	..	*	...	s	...	—	...	...
70	Suya crinigera	..	...	..	...	..	.	...	..	..	..	..	..	*	...	n	—	..	...	...
70	Hemichelidon fuliginosa	..	..	..	..	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	..	...
70	» ferruginea	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	...	...
71	Alsconax latirostris	..	...	..	..	*	..	...	..	..	..	..	..	.	...	...	...	...	...	..
71	Erythrosterna albicilla	..	...	..	...	*	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n?	...	...	—	..
72	Polyomias Hodgsoni	..	...	..	..	..	..	...	..	..	.	*	..	..	...	n	...	*	...	..
73	Terpsiphone Incei	*	...	..	...	..	..	...	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...
74	Cryptolopha tephrocephala	.	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n:	...	*	—	..
77	Siphia strophiata	..	...	..	...	..	..	...	..	..	.	*	..	..	...	n.	...	*	...	..
77	Digenea cerviniventris	..	...	..	...	..	..	...	..	..	.	*	..	..	...	n	...	*	..	...
78	Xanthopygia cyanomelaena	..	..	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	.	...	n.	...	*	...	...
79	Rhyacornis fuliginosa	.	..	..	...	..	..	...	..	..	..	(*)	.	*	...	s	—	*	*	...
80	Tarsiger cyanurus	..	...	..	...	..	..	...	.	..	..	*	..	*	...	n?h	...	—	...	..
80	» rufilatus	..	...	..	..	.	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	...	—	...
81	Pratincola maura	..	...	..	...	.	..	...	..	..	..	..	..	*	...	n	*	...	..	..
81	Sylvia minuscula	..	...	..	...	*	..	*	..	..	..	.	..	..	...	...	...	...	...	...
82	Phylloscopus plumbeitarsus	..	..	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	...	..
82	» magnirostris	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	...	...
83	» reguloides	.	...	..	...	..	.	...	..	..	.	*	..	..	...	n	...	*	..	..
83	» proregulus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	*	*	.	..	...	n	...	*	...	...
84	» superciliosus	..	.	..	.	.	..	.	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	..	..
84	» Mandellii	..	...	*	...	.	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	..	..
84	Lusciniola Armandi	.	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	...	...	*	...	...
85	Acrocephalus orientalis	..	*	..	...	*	..	...	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	..
85	Locustella certhiola	..	...	..	...	*	..	...	..	..	..	..	..	..	...	..	...	...	...	..
85	Cettia davidiana	..	..	..	...	..	..	...	..	..	..	.	..	*	...	n	—	..	...	..
86	» canturians	.	...	.	...	.	..	...	..	..	..	..	..	*	...	n	*	...	...	..

Страница.	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВЪ.	Пекинская равнина.	Горы. стр. между Пекинск. равн. и гор. У-тай-шань.	Горы У-тай-шань.	Горы. страна между У-тай-шанемъ и Ордосомъ.	Ордосъ.	Сѣв.-вост. Тянь-су.	Культурн. полоса у сѣв. подошвы Нань-шаня.	Гоби.	Хангайскія горы, страна.	Амдосское нагорье.	Система Голубой рѣки. Юго-зап. Тянь-су.	Нагорная Си-чуань.	Юго-вост. Тянь-су.	Нань-си близъ границы Тянь-су.	Свойство преобладающ. вида.	Вертик. распредѣл. Нижній культурный поясъ.	Поясъ лиственныхъ лѣсовъ.	Поясъ хвойныхъ лѣсовъ.	Альпійская область.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	Rhopophilus pekinensis	..	..	..	..	*	*	..	..	..	..	..	..	*	..	s?	—	..	..	..
87	Accentor erythropygius	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s?	..	..	..	*
87	» strophiatus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	*	..	s	..	—	—	*
88	» rubeculoides	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	*	s	..	..	—	*
88	Saxicola isabellina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..
88	» morio	..	..	..	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
88	» vittata	..	..	..	*	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
89	» deserti	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
89	Hodgsonius phoenicuroides	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	n	..	*	—	..
91	Chimarrhornis leucocephala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	*	..	*	..	s	—	*	*	..
92	Ruticilla Sewertzowi	..	..	..	..	..	*	..	..	..	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..
92	» aurorea	..	..	*	..	*	..	..	..	..	..	..	..	*	..	s	—	..	..	..
92	» Hodgsoni	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	*	..	*	..	s	..	—	*	..
93	» rufiventris	..	.	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..
93	» schisticeps	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	*	..	*	..	s	..	—	*	.
94	» frontalis	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	*	..	*	..	s	..	—	*	..
95	Grandala coelicolor	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s?	..	..	..	*
96	Calliope kamtschatkensis	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	*	..	..	..	n.	..	..	*	..
96	Larvivora brunnea	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	*	..	..	..	n	..	*	..	..
97	» obscura	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	*	..	..	..	n	..	..	*	..
98	Myiophoneus coeruleus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	n	..	*	..	..
98	Monticola cyaneus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	n	*	..	..	..
99	» gularis	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	n.	*	..	..	..
99	Turdus auritus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	n.	..	*	..	..
99	Merula sibirica	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	t?	..	..	—	..
100	» mandarina	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s	*	..	..	..
100	» Gouldi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	n:	..	*	..	..
100	» Kessleri	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	.	..	s?	..	..	—	..
101	» ruficollis	..	..	.	..	*	..	..	..	..	*	*	..	*	..	h:	—	—	..	..
101	» Naumanni	..	..	..	..	*	..	..	..	..	..	..	..	*	..	h	—	..	..	..
102	» fuscata	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	h	—	..	..	..
102	» obscura	..	..	..	..	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
102	Cinclus caschmeriensis	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s	—	—	—	..
102	» sordidus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s	..	..	—	..
103	» Pallasi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	s	—	..	..	..
103	Spelaeornis Halsueti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	s	..	—	..	..
103	Troglodytes nipalensis	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	*	..	s	..	—	*	..
104	Pericrocotus brevirostris	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	n	..	*	..	..
104	Campophaga saturata	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	*	..	n	*	..	..	..
105	Buchanga atra	..	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
105	Otomela lucionensis	..	*	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
105	» phoenicura	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	*	..	..	..	c	..	—	..	..
105	» speculigera	..	..	.	..	..	..	..	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
106	Collurio tephronotus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	*	..	..	n	..	*	—	..
106	Phoneus bucephalus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	c	..	—	..	..
107	Lanius sphenocercus	..	..	..	..	*	*	..	..	..	..	..	..	*	..	s?	—	..	..	..
107	Parus minor	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	*	..	*	..	s	—	*	..	..
107	» monticola	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	*	s	..	*	..	..
108	» venustulus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s?	..	*	..	..
109	Periparus aemodius	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	*	s	..	..	—	..
110	» Beavani	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s	.	..	—	—
110	Lophophanes dichroides	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s	..	—	—	..
111	Poecile baicalensis	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
111	» affinis	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s	..	..	*	..
112	» hypermelaena	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	*	s	..	—	..	..
113	» Davidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..	s	..	*	..	..

Страница.	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВЪ.	Пекинская равнина.	Горн. стр. между Пекинск. равн. и гор. У-тай-шань.	Горы У-тай-шань.	Горн. страна между У-тай-шанемъ и Ордосомъ.	Ордосъ.	Сѣв.-вост. Гань-су.	Культура. полоса у сѣв. подошвы Нань-шаня.	Гоби.	Халгайская горн. страна.	Амдоское нагорье.	Система Голубой рѣки. Юго-зап. Гань-су.	Нагорная Сы-чуань.	Юго-вост. Гань-су.	Шень-си близъ границы Гань-су.	Свойство преобладающаго вида.	Вертик. распредѣл. Нижній культурный поясъ.	Поясъ лиственныхъ лѣсовъ.	Поясъ хвойныхъ лѣсовъ.	Альпійская область.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
115	Poecile superciliosa	..	...	..	...	..	..	...	..	.	*	..	..	..	...	...	...	...	...	...
115	Acredula glaucogularis	..	...	..	...	*	..	...	.	..	..	*	..	*	...	s	—	...	...	...
115	» vinacea	..	...	..	...	..	..	...	..	..	*	..	..	..	...	...	...	...	...	...
116	Aegithaliscus fuliginosus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	*	*	s	...	...	—	...
116	» concinnus	..	...	.	...	..	..	...	..	..	..	..	..	*	...	s	...	—	...	...
117	Leptopoecile Sophiae	..	...	..	...	..	..	...	.	..	..	*	..	..	...	s	...	...	...	*
117	Lophobasileus elegans	..	...	..	...	..	..	...	..	..	*	*	..	..	...	s.	...	...	—	...
118	Regulus japonicus	..	...	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	*	...	s	—	...	...	...
118	Sitta sinensis	..	...	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	...	s:	...	*	...	...
118	» villosa	..	...	..	...	..	..	..	..	..	..	*	..	..	...	s.	...	...	*	...
119	» Przewalskii	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s.	...	—	...	...
120	Oriolus diffusus	*	...	..	...	..	..	...	..	.	..	*	..	..	...	n	*	*	...	...
120	Corvus torquatus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	..	..	*	...	c	—	...	...	...
120	» japonensis	.	...	..	...	..	..	...	..	..	..	(*)	..	*	...	s	—	—	...	...
121	Coleus dauricus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	*	(*)	..	*	...	s?	—	—	...	...
121	» neglectus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	..	..	*	...	s?	—	...	...	...
121	Nucifraga hemispila	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	*	...	s	...	...	*	...
121	Pica pica	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	(*)	..	*	...	s	—	—	...	...
122	Cyanopolius cyaneus	*	...	..	...	*	..	...	..	..	..	(*)	..	*	...	s	...	*	..	...
122	Urocissa erythrorhyncha	..	...	..	...	.	..	...	..	..	..	(*)	..	*	...	s	—	—	...	...
122	Garrulus bispecularis	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	..	s	...	*	...	...
123	Fregilus himalayanus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s	...	—	...	...
123	Podoces Hendersoni	..	...	..	...	..	..	...	*	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...
124	» humilis	..	...	..	...	..	..	...	..	..	*	..	..	..	...	...	...	...	...	...
124	Spodiopsar cineraceus	*	..	..	*	..	..	...	..	..	*	..	..	*	...	s?	—	...	...	...
125	Zosterops erythropleura	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	..	n	...	*	...	...
125	Certhia nipalensis	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s	...	—	—	...
125	» himalayana	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	.	...	s	...	—	—	...
126	Tichodroma muraria	.	...	..	...	*	..	...	..	..	*	*	.	(*)	...	s	—	—	—	*
126	Cinchramus polaris	..	...	..	..	*	..	...	.	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...
126	» schoeniclus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	..	.	*	...	c	—	...	...	...
126	Emberiza pusilla	..	...	..	..	*	..	...	..	..	.	..	..	*	...	n?	—	...	...	...
127	» elegans	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	*	*	n	...	*	...	...
127	» aureola	..	...	.	*	*	..	...	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...
127	» castaneiceps	..	*	*	*	..	*	...	..	..	..	.	..	*	...	s	...	—	...	...
127	» Godlewskii	..	...	..	...	..	..	...	..	..	*	*	..	*	...	s	...	—	...	...
128	» leucocephala	.	...	..	...	.	..	...	..	..	..	*	..	*	...	t?	—	...	...	...
128	Fringilla montifringilla	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	*	..	th	—	—	...	...
128	Leucosticte Brandti	..	...	..	...	..	..	...	..	.	..	*	..	..	...	s	...	...	...	*
129	Fringillauda nemoricola	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s	...	...	...	*
129	Erythrospiza mongolica	..	...	..	...	..	*	...	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...
130	Petronia petronia	..	...	..	...	..	*	...	..	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...
130	Passer rutilans	..	...	..	...	..	..	..	..	..	..	*	..	..	...	n	...	*	...	...
130	» montanus	..	*	..	...	*	..	...	..	..	..	*	..	(*)	...	s	*	*	...	...
131	Procarduelis rubescens	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	...	*	...
133	» nipalensis	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n	...	...	*	...
133	Carpodacus Grebnitskii	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	*	..	...	n	...	*	...	...
134	» Stoliczkae	..	...	..	...	..	..	...	..	..	*	..	..	..	...	...	...	...	...	...
135	» pulcherrimus	..	...	*	...	..	..	...	..	..	*	*	..	..	...	s	...	...	—	...
135	» rubicilloides	..	...	..	...	..	..	...	..	..	*	..	..	..	...	...	...	...	...	...
136	» roseus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	h	...	...	—	...
136	» dubius	..	...	..	...	..	..	...	..	..	*	*	..	..	...	s	...	—	*	...
138	» trifasciatus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s	...	—	*	...
139	» Edwardsi	..	...	..	...	..	..	...	..	.	..	*	..	..	...	s	...	—	...	...
140	» vinaceus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	n?	...	*	...	...
140	Pyrrhospiza Humei	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	*	..	..	...	s	...	...	...	*

Страница.	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВЪ.	Пекинская равнина.	Горн. стр. между Пекинск. равн. и горн. У-тай-шань.	Горы У-тай-шань.	Горн. страна между У-тай-шанемъ и Ордосомъ.	Ордосъ.	Сѣв.-вост. Гань-су.	Культурн. полоса у сѣв. подошвы Нань-шаня.	Тебн.	Хангайская горн. страна.	Амурское нагорье.	Система Голубой рѣки.					Вертик. распредѣл.			
												Юго-зап. Гань-су.	Нагорная Сы-чуань.	Юго-вост. Гань-су.	Шэнь-си близъ границы Гань-су.	Свойство пребыванія вида.	Низкій культурный полосъ.	Поясъ лиственныхъ лѣсовъ.	Поясъ хвойныхъ лѣсовъ.	Альпійская область.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
141	Pyrrhula erithacus	..	...	..	...	..	..	..	..	..	❊	❊	.	❊	...	*s*	...	❊	❊	...
142	Uragus lepidus	..	...	..	...	..	..	...	..	..	..	❊	..	❊	...	*s*	...	—	...	...
142	Pycnorhamphus carneipes	..	...	..	...	..	..	...	..	..	❊	❊	..	.	...	*s*	...	...	❊	...
143	Coccothraustes japonicus	..	..	..	...	..	..	...	..	..	..	❊	.	❊	...	*h?*	—	...	...	...
143	Chloris sinica	..	...	..	...	..	..	..	..	..	..	(❊)	..	❊	...	*nh*	—	—	..	...

Всего въ системѣ Голубой рѣки..... 204 видовъ.

LARIDAE.

Sterna fluviatilis tibetana, Saunders.

[*Sterna fluviatilis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 525.]

Saunders, Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 649.

Размѣры:

♂ Дл. 360. Разм. 790. Кр. 255. Кл. 43. Пл. 20. Хв. 152.

Экземпляръ: р. Шань-гань-хэ, близъ монастыря У—тай (С. Кит.), іюнь.

По клюву и ногамъ этотъ экземпляръ ни чѣмъ не отличается отъ птицъ изъ С.-Петербурга, но цвѣтъ оперенія темнѣе, какъ сверху, такъ особенно и снизу; поэтому мы оставляемъ за нимъ названіе *S. tibetana*, хотя сомнѣваемся въ отличіи послѣдней даже какъ subspecies.

Sterna fluviatilis longipennis, Nordm.

[*Sterna longipennis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 526.]

Saunders, Proc. Zool. Soc. Lond. 1876, p. 679.—Seebohm, Hist. Brit. Birds, III, p. 281.

Размѣры:

♂ Дл. 380. Разм. 785. Кр. 258. Кл. 42. Пл. 21. Хв. 153.
♀ » 370. » 790. » 265. » 42 » 19. » 166.

Экземпляры: р. Шань-гань-хэ, близъ монастыря У—тай, іюнь.

Клювъ у нашего ♂ черный, только у основанія нижней челюсти слегка краснѣетъ; у ♀ такой же, но красный цвѣтъ приблизительно достигаетъ $^1/_3$ нижней челюсти; ноги у обоихъ бурыя. Цвѣтъ оперенія такой же, какъ у предыдущей формы, т. е. темнѣе, чѣмъ у петербургскихъ. Это единственныя, повидимому, отличія нашей формы отъ типичной *S. fluviatilis*; по длинѣ крыла ихъ различить нельзя. Отмѣтимъ, что ширина сѣрой полосы вдоль стержня 1-го маха шире, чѣмъ у *S. fluviatilis* и *S. tibetana*.

Ibidorhynchus Struthersii, Vig.

[*Ibidorhynchus Struthersii*, David et Oust., Ois. Chine, p. 456.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., p. 314.

Размѣры:

♂ Дл. 400—420. Разм. 755—770. Кр. 220—224. Кл. 73—74. Пл. 43—46.
? » —— » —— » 225. » 87. » 45.

Экземпляры: горы У-тай-шань, іюль.

Въ южной Гань-су этотъ видъ встрѣчается какъ въ восточной, такъ и въ западной ея части, но рѣдокъ, хотя, кажется, повсюду совершенно осѣдлый. Попадается поодиночкѣ или парами, преимущественно по галечнымъ розсыпямъ горныхъ рѣкъ.

SCOLOPACIDAE.

Himantopus melanopterus, Meyer.

[*Himantopus candidus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 462.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., pp. 276 et 277.

Размѣры:

Кр. 221—240. Кл. 61—65. Пл. 109—124.

Экземпляры: городъ Гао-тай (С. З. Гань-су), іюнь; — г. Хой-Сянъ, май.

Весной 1885 г. около г. Хой-сяна встрѣчена лишь парочка этихъ птицъ въ началѣ мая.

Numenius arquatus lineatus, Cuv.

[*Numenius lineatus*, David et Oust., Ois. Chine. p. 457.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., pp. 321 et 324.

Размѣры:

♂ Дл. 555. Разм. 980. Кр. 272. Кл. 137. Пл. 80.

Экземпляръ: г. Хой-Сянъ, февраль.

Одиночная птица добыта въ началѣ февраля на рисовыхъ поляхъ около г. Хой-сяна. Нашъ экземпляръ средній между типичнымъ *N. arquatus* и *N. lineatus*, но ближе къ послѣднему.

Totanus calidris (Linn.).

[*Totanus calidris*, David et Oust., Ois. Chine, p. 464.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., pp. 349 et 353.

Размѣры:

Кр. 146 — 153. Кл. 50. Пл. 46 — 48.

Экземпляры: городъ Гао-тай (С. З. Гань-су), іюнь.

Totanus glareola (Linn.).

[*Totanus glareola*, David et Oust., Ois. Chine, p. 464.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., pp. 350 et 365.

Размѣры:

Дл. 230. Разм. 415. Кр. 121. Кл. 34. Пл. 37.

Экземпляръ: дер. У-чанъ (близъ Пекина), май.

Totanus ochropus (Linn.).

[*Totanus ochropus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 465.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., pp. 350 et 368.

Размѣры:

♀ Дл. 240. Разм. 445 — 450. Кр. 135 — 138. Кл. 37 — 40. Пл. 33 — 34.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, декабрь, февраль.

Зимуетъ въ небольшомъ количествѣ по рисовымъ полямъ близъ г. Хой-сяна.

Actitis hypoleucus (Linn.).

[*Tringoïdes hypoleucus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 467.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., pp. 350 et 371.

Размѣры:

♂ Дл. 205. Разм. 345. Кр. 110. Кл. 29. Пл. 23.

Экземпляры: дер. У-чанъ (близъ Пекина), май;— оз. Чаганъ-Норъ (Ордосъ), августъ.

Limosa melanura melanuroides, Gould.

[*Limosa brevipes*, David et Oust., Ois. Chine, p. 460.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., p. 391.

Размѣры:

Дл. 370. Разм. 640. Кр. 181. Кл. 71. Пл. 57.

Экземпляръ: оз. Чаганъ-норъ (Ордосъ), августъ.

Gallinago megala, Swinhoe.

[*Gallinago megala*, David et Oust., Ois. Chine, p. 477.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., pp. 470 et 479.

Размѣры:

Дл. 285. Разм. 490. Кр. 141. Кл. 70 Пл. 36.

Экземпляръ: мѣстечко Хе-коу (на Желт. р. къ югу отъ г. Куку-хото), августъ.

У нашего экземпляра 20 рулей, изъ которыхъ 12 шириною меньше 0,3 дюйма (7mm.), и длина крыла въ 5,55 дюйма, что вполнѣ подходитъ подъ діагнозъ Seebohm'a, по которому длина крыла этого вида варіируетъ отъ 5,4 до 5,6 дюйма.

Gallinago gallinago (Linn.).

[*Gallinago scolopacina*, David et Oust., Ois. Chine, p. 478.]

Seebohm, Geogr. distrib. Charadr., pp. 470 et 484.

Размѣры:

♀ Дл. 275. Разм. 425. Кр. 128. Кл. 72 Пл. 32.

Экземпляры: г. Хой-Сянъ., февраль.

Бекасы зимуютъ въ небольшомъ количествѣ по рисовымъ полямъ около г. Хой-сяна.

RALLIDAE.

Rallus aquaticus indicus, Blyth.

[*Rallus indicus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 489.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 552.

Размѣры:

♂ Дл. 295. Разм. 450. Кр. 131. Кл. 45. Пл. 43.
♀ » 260. » 410. » 122. » 40. » 40.

Экземпляры: уроч. Терманъ-байшинъ (Ордосъ), августъ.

Gallinula chloropus (Linn.).

[*Gallinula chloropus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 485.]

Seebohm. Hist. Brit. B., II, p. 557.

Размѣры:

♀ Дл. 330. Разм. 505. Кр. 163. Кл. 27. Пл. 46.

Экземпляръ: дер. У-чанъ (близъ Пекина), май.

Fulica atra, Linn.

[*Fulica atra*, David et Oust., Ois. Chine, p. 489.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 564.

Размѣры:

♂ Дл. 445. Разм. 745. Кр. 200. Кл. 38. Пл. 56.

Экземпляръ: городъ Дзинъ-дзи-пу (С. Гань-су), сентябрь.

ANATIDAE.

Casarca rutila (Pall.).

[*Casarca rutila*, David et Oust., Ois. Chine, p. 497.]

Dresser, B. of Eur., VI, p. 461, pl. 421.

Размѣры:

♀ Кр. 335. Кл. 50. Пл. 58.

Экземпляръ: оз. Чаганъ-норъ (Ордосъ), августъ.

Tadorna cornuta (S. I. Gmel.).

[*Tadorna Belonii*, David et Oust., Ois. Chine, p. 497.]

Dresser, B. of Eur., VI, p. 451, pl. 420.

Размѣры:

Imm. Дл. 545. Разм. 910. Кр. 250. Кл. 41. Пл. 50.

Экземпляръ: оз. Чаганъ-норъ (Ордосъ), августъ.

Anas boschas, Linn.

[*Anas boschas*, David et Oust., Ois. Chine, p. 495.]

Dresser, B. of Eur., VI, p. 469, pl. 422.

Кряквы зимуютъ въ довольно большомъ количествѣ по рисовымъ полямъ близъ г. Хой-сяна, но въ мартѣ улетаютъ и лѣтомъ, какъ говорятъ, здѣсь совсѣмъ нѣтъ утокъ.

Anas zonorhyncha, Swinhoe.

[*Anas zonorhyncha*, David et Oust., Ois., Chine, p. 496.]

Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., 1871, p. 417. — Temm. et Schl., Fauna Jap, pl. 82. (*Anas poecilorhyncha hybrida*).

Размѣры:

♂ Дл. 620. Разм. 970. Кр. 300. Кл. 66. Пл. 48.
? » — » — » 280. » 65. » 43.

Экземпляры: городъ Дзинь-дзи-пу (С. Гань-су), сентябрь; — городъ Фу-и-тинъ (С. Гань-су), іюнь.

Querquedula crecca (Linn.).

[*Querquedula crecca*, David et Oust., Ois. Chine, p. 502.]

Dresser, B. of Eur., VI, p. 507, pl. 426.

Размѣры:

♂ Дл. 365—380. Разм. 595—610. Кр. 168—178. Кл. 42. Пл. 29—30.
♀ » —— » —— » 165. » 42. » 28.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, февраль.

Этотъ чпрокъ зимуетъ въ небольшомъ количествѣ по рѣкамъ Хой-сянскаго округа, но на рисовыхъ поляхъ близъ города Хой-сяна встрѣчается очень рѣдко, отдѣльными парочками; въ февралѣ же становится обыкновеннымъ. Маленькіе табунки, штукъ въ 10, соединяются здѣсь въ большіе и улетаютъ въ мартѣ.

Fuligula cristata (Leach).

[*Fulix cristata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 508.]

Dresser, B. of Eur., VI, p. 573, pl. 437.

Размѣры:

♀ Дл. 355. Разм. 590. Кр. 187. Кл. 43. Пл. 34.

Экземпляръ: г. Хой-Сянъ, февраль.

Одна особь этого вида встрѣчена однажды, въ серединѣ февраля, на рисовыхъ поляхъ близъ г. Хой-сяна.

CICONIIDAE.

Ciconia nigra, Linn.

[*Ciconia nigra*, David et Oust., Ois. Chine, p. 450.]

Dresser, B. of Eur., VI, p. 309, pl. 406.

Размѣры:

Кр. 600. Кл. 197. Пл. 190. Хв. 334.

Экземпляръ: городъ Гао-тай (С. З. Гань-су), іюнь.

IBIDIDAE.

Nipponia nippon (Temm.).

[*Ibis nippon* et *Ibis nippon, var. sinensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 453, pl. 116 et p. 454, pl. 117.]

Ibis nippon: Temminck, Pl. Color., pl. 551 (1835).—Temm. et Schl., Fauna Jap., p. 117, pl. LXXI (1850).—Schlegel, Handl. Dierk., I, p. 428 (1857).—Маакъ, Путеш. по дол. р. Уссури, I, стр. 180

(1861).—Swinhoe, Ibis 1861, p. 261. — Blakiston, Ibis 1862, p. 331.—Schlegel, Nat. Hist. Nederl; de Dier. p. 244 (1862); — Id., Mus. Pay-Bas, livr. 4, p. 9 (1863). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond. 1863, p. 318; — Id., Ibis 1863, p. 416; — Id., Ibis 1867, p. 413.—Пржевальскій, Нут. Усс. Кр. стр. 175, прил. стр. 52, nº 189 (1870).—von Homeyer, Journ. für Ornith. 1870, p. 427. — A. David, Nouv. Arch. Mus. 1871, Bull. VII, Cat. nº 409.—Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond. 1871, p. 411; — Id., Ibis 1873, p. 249; — Id., Ibis 1875, p. 455. — Taczanowski, Journ. für Ornith. 1875, p. 256.—A. David, Journ. trois. Voy. Emp. Chin. I, p. 28 (1875). — David et Oustalet, Ois. Chine, p. 453, pl. 116 (1877). — Oustalet, Nouv. Arch. Mus. 1878, p. 175. —Blakiston et Preyer, Ibis 1878, p. 223;—Id., Tr. As. Soc. Jap. VIII (1880), p. 198;—Id., Tr. As. Soc. Jap. X (1882), p. 117.—Blakiston, Amend. List. B. Jap., p. 12 (1884).

Geronticus nippon: G. R. Gray, List B. Brit. Mus., III, p. 91 (1844);—Id., Hand-l. B. III, p. 40, sp. 10232 (1871).—M'Vean, Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. 1877, p.—extr. p. 7 (fide Stejneger, Proc. Un. St. Nat. Mus. 1887, p. 272).

Nipponia Temminckii: Reichenbach, Syst. Av. p. XIV, pl. 141, fig. 538 (1850).

Nipponia nippon: Bonaparte, Compt. rend. Ac. Sc. XL, Tabl. des Héron, nº 162 (1855):—Id., Consp. Av. II, p. 152 (1857). — Taczanowski, Bull. Soc. Zool. Fr. 1876, p. 258.—Elliot, Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 477.—Stejneger, Proc. Un. St. Nat. Mus. 1887, p. 272.

Ibis (*Geronticus*) *nippon*: Radde, Reise im Süd. v. Ost-Sib., p. 341 (1863).

Ibis sinensis: A. David, Compt. rend. Ac. Sc. LXXV p. 64 (1874);—Id., Ann. des Sc. Nat, 5º sér, XIX art. nº 9, (1874).

Ibis nippon, var. sinensis: Oustalet, Nouv. Arch. Mus. 1872. Bull. VIII, p. 129, pl. 6.—David et Oustalet, Ois. Chine, p. 454, pl. 117 (1877).—Oustalet, Nouv. Arch. Mus. 1878, p. 175.

Ibis Temminckii: Reichenow, Journ. für Ornith. 1877, p. 152.

Размѣры:

♂ Дл. 820. Разм. 1500. Кр. 410. Кл. 183. Пл. 83. Хв. 185.
♀ » 750—770. » 1390—1410. » 376—392. » 158—162. » 75—77. » 166—180.
Хвостъ выдается за крылья на 25 м. м.

Радужина грязно-красная; голая морщинистая кожа головы оранжево-красная; плюсны такаго же, но болѣе грязнаго цвѣта; клювъ черный, конецъ его красный.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, Февраль.

Первый разъ я встрѣтилъ ибисовъ въ концѣ ноября 1884 г. по пути отъ г. Ланьджеу въ г. Хой-сянъ, куда ѣхалъ зимовать. Небольшой табунокъ, штукъ въ 5, попался въ долинѣ одной горной рѣки, верстахъ въ 70 не доѣзжая до г. Хой-сяна. Я добылъ одну совершенно бѣлую птицу и такого же цвѣта были и остальныя. Около г. Хой-сяна я нашелъ ибисовъ въ большомъ количествѣ, они постоянно держались по рисовымъ полямъ близъ самаго города. Всѣ, которыхъ я видѣлъ въ продолженіи декабря, были совершенно бѣлы. Въ концѣ января я въ первый разъ замѣтилъ, что нѣкоторые ибисы имѣютъ слабый сѣрый оттѣнокъ на головѣ и шеѣ. Въ февралѣ сѣроватыя птицы стали попадаться чаще и чаще, а цвѣтъ ихъ сталъ гораздо рѣзче; къ концу этого мѣсяца сѣрые ибисы были въ громадномъ большинствѣ, бѣлые же встрѣчались какъ исключеніе. Постепенность въ измѣненіи окраски дѣлаетъ невѣроятнымъ предположеніе, что зимующіе здѣсь бѣлые ибисы улетаютъ и смѣняются къ лѣту другими, сѣрыми. Очевидно, происходитъ перемѣна наряда тѣхъ же самыхъ птицъ. Этого же мнѣнія держатся католическіе миссіонеры бельгійцы, живущіе въ г. Хой-сянѣ уже нѣсколько лѣтъ. Смѣна наряда ибисовъ, кажется, вполнѣ заканчивается къ марту. Посѣтивши г. Хой-сянъ вторично въ концѣ февраля 1887, я особенно старался добыть бѣлыхъ ибисовъ. Сѣрыхъ я видалъ ежедневно десятками, но бѣлаго отыскалъ лишь

одного. Это оказалась сравнительно молодая самка съ бурыми концами первыхъ трехъ маховъ. Она была очень худа, имѣла на груди не вполнѣ еще зажившую рану и, вѣроятно, только по болѣзни отстала отъ другихъ въ перемѣнѣ наряда.

Вмѣстѣ съ измѣненіемъ цвѣта оперенія, идетъ отложеніе чернаго пигмента въ кожѣ шеи и головы. Приготовляя шкурки сѣрыхъ ибисовъ, битыхъ въ концѣ февраля, я замѣтилъ, что всѣ они имѣли на кожѣ шеи и головы большія темныя пигментныя пятна, которыхъ не было у бѣлыхъ ибисовъ, битыхъ въ началѣ зимы, а также и у вышеупомянутой самки. Эти пятна особенно рѣзко выступали на внутренней поверхности кожи, хотя были видны и снаружи. Чтобы дать понятіе объ ихъ формѣ, прилагаемъ, сдѣланный на мѣстѣ, схематическій рисунокъ, изображающій кожу головы и шеи ибисовъ, какъ она представляется при препаровкѣ.



Пигментныя пятна на кожѣ шеи и головы *N. nippon.*

На лѣво видна передняя часть черепа съ глазной впадиной и ноздревой полостію; направо — шкура; два черныхъ пятна — отверстія въ ней, большое — глазное, малое—ушное; изогнутая черта между ними — складка образующаяся на границѣ плотной кожи, которая снаружи покрыта перьями, и тонкой кожи, которая снаружи гола. Верхній рисунокъ взятъ со стараго самца, нижній — со старой, очень сѣрой самки. Обѣ птицы добыты въ концѣ февраля.

Въ связи съ цвѣтомъ оперенія птицъ, величина, цвѣтъ и рѣзкость очертаній пигментированнаго пространства были различны. Не очень сѣрые ибисы имѣли съ

каждой стороны шеи, къ зади отъ ушныхъ отверстій, по отдѣльному большому пигментному пятну (верхній рисунокъ), которое было рѣзко ограничено только со стороны клюва и подбородка, совершенно черно только внизъ отъ ушныхъ отверстій; со стороны же затылка — безъ рѣзкой границы, буровато и усѣяно маленькими совершенно черными пятнышками. У болѣе сѣрыхъ ибисовъ пятна были больше и чернѣе, а у очень сѣрыхъ (нижній рисунокъ) пигментированная область составляла одно сплошное цѣлое, занимая весь верхъ оперенной части головы и бока передней части шеи и протягиваясь вдоль послѣдней, узкимъ клиномъ съ каждой стороны, довольно далеко назадъ. Цвѣтъ ея былъ угольно-черный, а границы совершенно рѣзки. Очевидно, въ первомъ случаѣ процессъ пигментаціи былъ въ ходу, въ послѣднемъ — закончился.

Смѣна наряда, какъ я уже сказалъ, началась съ конца января, и почти закончилась къ марту. За все это время въ поведеніи ибисовъ не замѣчалось никакихъ признаковъ, которые указывали бы на наступленіе брачнаго періода. Яичники самки, добытой въ концѣ февраля, очень сѣрой и съ закончившейся пигментаціей кожи, были почти не набухши, а отдѣльные (самые крупные) пузырьки въ нихъ — величиной едва лишь въ конопляное зерно.

Просмотрѣвъ литературныя свѣденія, мы убѣдились, что во всѣхъ случаяхъ, когда есть описаніе цвѣта птицъ и время наблюденій или добычи, сопоставленіе одного съ другимъ вполнѣ подтверждаетъ выше приведенныя наблюденія. Ибисы бываютъ бѣлыми только осенью и зимой, весной же и лѣтомъ они сѣры. Это вѣрно какъ для взрослыхъ птицъ, такъ и для молодыхъ и подтверждается данными, какъ изъ Китая и Уссурійскаго края, такъ и изъ Японіи [1]).

---

[1]) *Бѣлыя птицы*: Swinhoe наблюдалъ около г. Нинъ-по большія стаи ибисовъ два раза: 23 *августа* они состояли изъ бѣлыхъ и темныхъ птицъ вмѣстѣ, а 18 *ноября* только изъ однихъ бѣлыхъ. Два, изъ добытыхъ послѣдняго числа ибисовъ, описаны Swinhoe, какъ самецъ и самка послѣ осенней линьки. Судя по остаткамъ оперенія на тѣхъ частяхъ головы, которыя голы у старыхъ, по темному цвѣту плюсенъ и бурымъ наружнымъ махамъ,—это несомнѣнно молодыя птицы. (Ibis 1873, p. 249).—Два японскихъ экземпляра г. Stejneger'a, добытые въ *январѣ*, оба бѣлы, и оба несомнѣнно молодыя птицы (Proc. Un. St. Nat. Mus. 1887, p. 282). — Бѣлые ибисы появляются около Пекина, по словамъ Давида, только *зимой*, и *зимой* же онъ наблюдалъ ихъ въ Шенси (Ois. Chine, pp. 454 et 455.).

Сѣрыя птицы: На оз. Ханка ибисы появились, по словамъ Пржевальскаго, 13 *марта* ст. ст. и добытые имъ экземпляры имѣютъ спину, переднюю часть шеи и хохолъ «пепельно голубые». (Пут. Усс. Кр. стр. 175.).—Экземпляръ Swinhoe изъ Хакодате, помѣченъ *апрѣлемъ* и названъ имъ «вполнѣ выросшей незрѣлой сѣрой птицей». По времени добычи это, вѣроятно, совершенно взрослая птица. (Ibis 1875, p. 455.)—Всѣ ибисы, которыхъ наблюдалъ Давидъ *весной* въ Ю. З. части провинціи Же-дзянъ были, по его словамъ, сѣры; экземпляры, добытые 12—27 *апрѣля*, послужили типомъ его *Ibis sinensis* (Journ. Trois. Voy. Emp. Chin., I, p. 28.). — Три сѣрыхъ экземпляра добыты въ Уссурійскомъ краѣ Годлевскимъ въ то время, когда *въ гнѣздахъ* были еще *птенцы*. (Journ. für Ornith. 1875, p. 256; Bull. Soc. Zool. Fr. 1876, p. 258.).—Ибисъ, полученный Swinhoe 10 *іюня* живымъ, имѣлъ оперенie «dusky cream colour, washed lightly with rosy». Птица эта, судя по описанію, несомнѣнно молодая. (Ibis 1873, p. 249).—Ибисы, встрѣченные тѣмъ же авторомъ *21 іюня — 25 іюля* 1860 г. около Talien-Bay (сѣв. Кит.) всѣ были съ темной головой (Ibis 1861, p. 261.). — Экземпляръ, добытый Маакомъ 3 *августа* ст. ст на р. Сунгачи (близъ Ханка), по описанію Радде «besitzt eine schmutzig graue, in's Gelbliche ziehende Farbe». Эта птица, вѣроятно, одного возраста съ птицей, полученной живою Swinhoe (Путеш. по дол. р. Уссури, I, стр. 180; Reise im Süd. v. Ost-Sib., p. 342).

Какимъ путемъ происходитъ осенняя смѣна наряда и о линькѣ ибисовъ ничего неизвѣстно [1]).

Ибисы водятся въ Ю. Гань-су, насколько мнѣ извѣстно, только въ округахъ городовъ Хой-сяна и Ченъ-сяна. Это объясняется тѣмъ, что только въ этой мѣстности встрѣчаются условія, благопріятныя для ихъ жизни. Широкія и пологія долины рѣкъ дѣлаютъ здѣсь возможной культуру риса въ большихъ размѣрахъ, но рисовымъ же полямъ птицы во всякое время года находятъ достаточно пищи. Условія особенно благопріятны около г. Хой-сяна, гдѣ, при обширныхъ рисовыхъ поляхъ, обиліе крупныхъ деревьевъ, на которыхъ ибисы ночуютъ и гнѣздятся. Они составляютъ здѣсь совершенно осѣдлую колонію. Цѣлый день птицы держатся по рисовымъ полямъ, расхаживая по одиночкѣ или собираясь компаніями штукъ въ 5—6. Иногда они посѣщаютъ пашни, расположенныя по увалamъ и долины смежныхъ рѣхъ, но къ вечеру, какъ я замѣтилъ, всегда прилетаютъ обратно. Ночуютъ, обыкновенно, на разъ избранныхъ деревьяхъ въ садахъ г. Хой-сяна и ближайшихъ кумирень; на ночлегъ прилетаютъ на закатѣ солнца.

Ибисы умныя, спокойныя и молчаливыя птицы. Не преслѣдуемые ни кѣмъ, они не пугливы, однако же очень осторожны. Спокойно пасясь вблизи тропинокъ, по которымъ снуютъ пѣшеходы, они тотчасъ улетаютъ, если замѣтятъ, что на нихъ обращено вниманіе. Расхаживали-ли они по болоту, отдыхали-ли обществомъ на сухомъ берегу (при чемъ одни дремлютъ, стоя неподвижно и закинувъ голову на спину, другіе охорашиваются и чистятъ клювомъ перья) — я никогда не замѣчалъ между ними никакого оживленія, ссоръ или игръ. Голосъ ибиса, низкое и отрывистое каркань, слышится крайне рѣдко; каркнетъ иногда разъ или два, пролетающая мимо птица, но я никогда не слыхалъ, чтобы ибисы кричали подолгу или, сидя на землѣ.

ARDEIDAE.

Botaurus stellaris (Linn.).

[*Botaurus stellaris*, David et Oust., Ois. Chine, p. 446.]

Dresser, B. of Eur., VI, p. 289, pl. 403.

Размѣры:

♀ Дл. 700. Разм. 1160. Кр. 285. Кл. 76. Пл. 89. Хв. 110.

Экземпляры: ур. Терминъ-байшинъ (Ордосъ), августъ.

---

[1]) О линькѣ ибисовъ говоритъ только Swinhoe (Ibis 1873.), но кажется, лишь по предположенію. Молодыя птицы, по его словамъ, удерживаютъ сѣрое оперенie въ продолженіи лѣта и переливаютъ около октября въ бѣлое, при чемъ крылья и хвостъ остаются старые. Послѣдняя подробность предполагаетъ непремѣнно фактическое основаніе. Такъ какъ, насколько намъ извѣстно, Swinhoe другихъ молодыхъ ибисовъ, кромѣ описанныхъ въ этой же статьѣ, не имѣлъ, то подробность эта, вѣроятно, относится къ двумъ птицамъ, описаннымъ имъ подъ названіемъ самца и самки послѣ осенней линьки. Старый хвостъ и крылья и остатокъ пуха на головѣ указываютъ только на молодость, но никакихъ указаній въ описаніи, что птицы эти дѣйствительно перелинявшія—нѣтъ. Такимъ образомъ, линька и время ея являются только предположеніями автора для объясненія того, что стая ибисовъ, встрѣченная имъ 23 августа, состояла изъ бѣлыхъ и сѣрыхъ птицъ, 18 же октября — только лишь изъ бѣлыхъ.

Herodias alba modesta (J. E. Gray).

[*Herodias alba*, David et Oust., Ois. Chine, p. 439.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 478.

Размѣры:

Дл. 970. Разм. 1430. Кр. 362. Кл. 131. Пл. 170. хв. 148.

Экземпляръ: дер. У-чанъ (близъ Пекина), май.

TETRAONIDAE.

Tetrastes Sewertzowi, Przew.

Пржевальскій, Монг и стр. Танг., II, птицы, стр. 130, табл. XVIII.

Размѣры:

♂ Дл. 365—390. Разм. —540. Кр. 162—164. Кл. 21—20. Пл. 35—38. Хв. 120—133.
♀ » 350—380. » 510—530. » 160. » 20—21. » 36—38. » 120—130.

Экземпляры: дер. Дзю-юàнь, августъ;—дер. Джозà-пазà, сентябрь;—дер. Сàтани, октябрь, январь.

Открытый Пржевальскимъ въ горахъ С. З. Гань су, рябчикъ водится также въ юго-западной части провинціи, въ Минджеускомъ и Сигученскомъ округахъ, но повсюду здѣсь очень рѣдокъ. За два года я встрѣтилъ его всего разъ пять, большею частію въ еловыхъ лѣсахъ на высотѣ съ 9000 футъ и разъ (лѣтомъ) въ альпійской области, въ зарослях кустарныхъ рододендровъ; — во всѣхъ случаяхъ одиночныхъ птицъ. Тангуты зовутъ рябчика «Шоба» или «Чоба», но названіе это, какъ и сама птица, мало извѣстно.

Молодой самецъ, добытый въ началѣ августа (7^го^), почти вылинявшій, но еще съ невполнѣ отросшими махами и хвостомъ, совершенно похожъ на взрослаго. Старая самка, убитая въ концѣ того же мѣсяца (20^го^), была въ полной линькѣ. Старая самка, добытая въ началѣ октября, очевидно, только что закончила линьку: оперенiе безукоризненной свѣжести, а на очинахъ маховъ видны еще пленки.

Perdix barbata, J. Verr. et des Murs.

[*Perdix barbata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 392.]

Размѣры:

Кр. 150. Кл. 21. Пл. 37. Хв. 89.

Экземпляръ: монаст. Гумбумъ (близъ г. Синина), зима.

Въ Ю. Гань-су не встрѣчена.

Perdix sifanica, Przew.

Пржевальскій, Монг. и стр. Танг., II, птицы, стр. 124.

Размѣры:

♂ Дл. 320. Разм. 480. Кр. 148. Кл. 22. Пл. 45. Хв. 93.
♀ » 300—305. » 445—470. » 133—138. » 21. » 39—40. » 79—86.

Радужина свѣтло-коричневая; клювъ зеленовато-сѣрый; ноздревые клапаны желтые; плюсны свѣтло-сѣрыя; подошвы желтоватыя; когти бурые. Вокругъ глазъ узкое оперенное колечко, пространство же подъ и къ зади отъ глазъ покрыто бородавчатой кожей краснаго цвѣта.

Экземпляры: дер. Чунъ-дзя́ (70 верстъ къ ю. отъ г. Синина), апрѣль; — дер. Та-хей-гоу декабрь.

Пржевальскій, открывшій эту куропатку въ горахъ С. З. Гань-су, отличилъ ее отъ *P. Hodgsoni* только по отсутствію у нея чернаго пятна на животѣ. Никакихъ слѣдовъ чернаго цвѣта на животѣ нѣтъ также и у нашихъ экземпляровъ, но кромѣ этого они отличаются отъ *P. Hodgsoni*, судя по рисунку Gould'a (B. of As., VI, pl. 74.) тѣмъ, что имѣютъ перья подбородка удлиненыя и съ темными кончиками, совершенно какъ у *P. barbata*, о чемъ Пржевальскій не упоминаетъ.

Куропатка эта въ Ю. Гань-су встрѣчена мной лишь въ одномъ мѣстѣ: противъ дер. Та-хей-гоу, на перевалѣ черезъ хребетъ, отдѣляющій здѣсь Гань-су отъ Сычуани. Птицы держались табунками, въ 5 — 10 штукъ, въ лугахъ и кустарныхъ зарослях альпійской области. По словамъ охотниковъ тангутовъ, *P. sifanica* водится также въ округѣ г. Ди-дао, въ горахъ праваго берега р. Тао-хэ.

Caccabis saxatilis chukar (Gray).

[*Caccabis chukar*, David et Oust., Ois. Chine, p. 395.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 458. — Dresser, B. of Eur., VII, p. 102, pl. 470, fig. 2 (sinistra).

Размѣры:

Кр. 162. Кл. 24. Пл. 49. Хв. 110.

Экземпляръ: рѣк. Уланъ-муренъ (Ордосъ), августъ.

Въ Ю. Гань-су эта куропатка рѣдка и встрѣчена мною лишь въ одномъ мѣстѣ: по береговымъ скаламъ рѣки, на которой стоитъ г. Си-гу, близъ города и ниже. Вверхъ же по рѣки и въ другихъ частяхъ Сигученскаго округа, насколько мнѣ извѣстно, ея нигдѣ нѣтъ. Не встрѣчалъ я ее также и въ Хой-сянскомъ округѣ. Мои ганьсуйскіе экземпляры, къ сожалѣнію, затерялись, но кажется, они не представляли ни какихъ отличій отъ птицъ изъ Ордоса.

Lerva nivicola (Hodgs.).

[*Lerva nivicola*, David et Ous., Ois. Chine, p. 392, pl, 115.]

Jerdon, B. Ind., II, p. 555. — Gould, B. of As., VI, pl. 75.

Размѣры:

♂ Дл. 390—405. Разм. 605—625. Кр. 180—185. Кл. 24—27. Пл. 40—41. Хв. 112—134.
♀ » 400. » 620. » 186. » 25. » 42. » 125.

Радужина свѣтлая буро-коричневая; клювъ и ноздревые клапаны кораллово-красные, верхъ клюва съ буроватымъ оттѣнкомъ; плюсны красныя, какъ клювъ; пальцы бурѣе; когти сверху черные, снизу желтые.

Экземпляры: дер. Та-хей-гоу, ноябрь.

Эта куропатка, найденная въ Китаѣ только въ Муппиѣ Давидомъ, встрѣчена мной въ Сигученскомъ округѣ, въ хребтѣ, отдѣляющемъ его отъ Сы-чуани. Очень рѣдка. Живетъ небольшими табунками, въ 5—6 штукъ, въ скалахъ и розсыпяхъ альпійской области, въ тѣхъ же почти мѣстахъ, гдѣ и *Tetraogallus tibetanus*. Объ птицы извѣстны у тангутовъ подъ общимъ названіемъ «Куму», къ которому для обозначенія *L. nivicola* прибавляютъ слово «чэ» — малый (Куму-чэ.).

Tetraogallus tibetanus, Gould.

[*Tetraogallus tibetanus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 391.]

Gould, B. of As., VI, pl. 32. — Пржевальскій, Монг. и стр. Танг., II, птицы, стр. 127.

Размѣры:

♂ Дл. 550—565. Разм. 880—885. Кр. 257—262. Кл. 35—36. Пл. 58—60. Хв. 178—183.
♀ » 535 » 830. » 238. » 34. » 55. » 163.

Радужина темно-бурая; клювъ и голая кожа надъ глазомъ желтые; ноздревые клапаны оранжево-красные; плюсна и голая кожа за глазомъ оранжево желтыя; когти бурые. У самокъ клювъ блѣднѣе, чѣмъ у самцовъ и верхъ его зеленоватый.

Экземпляры: дер. Та-хей-гоу, ноябрь;—долина р. Бардунъ въ Нань-шанѣ, май.

О нашихъ экземплярахъ скажемъ тоже, что замѣтилъ Пржевальскій о птицахъ изъ С. З. Гань-су и С. Тибета. Ни у одного изъ нихъ нѣтъ на груди такого сплошнаго бѣлаго пятна, какъ изображено у Gould'a, а три отдѣльныхъ пятна, два по бокамъ груди и одно на подбородкѣ. Промежутки между пятнами и бока шеи пепельно-сѣрые съ желтоватымъ оттѣнкомъ. У одного изъ нашихъ экземпляровъ (нанышаньскаго) боковыя пятна очень велики, такъ что почти слились на серединѣ груди, но отъ шейнаго пятна вестаки отдѣлены широкимъ промежуткомъ сѣраго цвѣта. Наша самка (Сигученскаго округа) подобна, описанной Пржевальскимъ: «имѣетъ узкую середину горла бѣлаго цвѣта, бока же горла и передняя часть груди почти одноцвѣтны со спиной, т. е. изжелта буроваты съ частыми черноватыми струйками и крапинками». Прибавимъ только, что наибольшая примѣсь чернаго цвѣта на груди у нашей птицы находится близъ нижней границы бѣлаго шейнаго пятна.

Въ Ю. Гань-су *T. tibetanus* крайне рѣдокъ и встрѣчается лишь на самыхъ высокихъ вершинахъ горныхъ хребтовъ, въ скалахъ и розсыпяхъ альпійской области. Я нашелъ его въ хребтѣ, отдѣляющемъ Сигученскій округъ отъ Сы-чуани и въ горахъ лѣваго берега Сигученской рѣки противъ д. Лотани.

Въ верховьяхъ Сигученской рѣки *T. tibetanus* по словамъ тангутовъ довольно обыкновенъ. Тангуты называютъ эту птицу «Куму-чва», т. е. Куму большой, въ отличіе отъ малаго Куму или *L. nivicola*.

PHASIANIDAE.

Ithaginis sinensis, David.

[*Ithaginis sinensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 402, pl. 114.]

David et Oustalet, Ois. Chine p. 402, pl. 114.— Пржевальскій, Монг. и стр. Танг., II, птицы, стр. 122 (*I. Geoffroyi*);—id., Отъ Кяхт. на ист. Желт. Рѣки, стр. 114.

Размѣры:

♂ старые, имѣющіе отъ 1 до 5 шпоръ.
Дл. 460—500. Разм. 600—620. Кр. 192—209. Кл. 25—27. Пл. 58—63. Хв. 170—187.

♂ Молодые безъ шпоръ зимой
» —— » —— » 181—191. » 25—27. » 59—61. » 152—174.

♀ Старыя насѣдки.
» —— » —— » 180—195. » 23—26. » 57—61. » 135—147.

♀ Молодыя зимнія (съ красными краями челюсти)
» —— » —— » 177—185. » 24. » 56—57. » 153—160.

Клювъ у взрослыхъ птицъ черный, у самцовъ съ красными, у самокъ съ черными ноздревыми клапанами; плюсны красныя, у взрослыхъ самцовъ съ 1—5 шпорами на обѣихъ ногахъ,—чѣмъ шпоръ больше, тѣмъ птица старше.

Экземпляры: дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Сатани, ноябрь, декабрь, январь.

Мы имѣемъ довольно большую серію экземпляровъ этого вида, представляющую интересъ по возрастнымъ нарядамъ и по особенностямъ въ окраскѣ птицъ изъ различныхъ мѣстностей.

Различіе въ нарядахъ самки и самца появляется у *I. sinensis*, вѣроятно, очень рано: оно вполнѣ уже рѣзко даже у птицъ не достигшихъ еще полнаго роста. Самый молодой изъ нашихъ самцовъ (добытый 1-го августа), величиной лишь въ половину взрослаго (дл. кр. 147.), уже сѣро полосатый, съ хохломъ, черными ушными перьями, каштановой конечной частью крыла и розовыми оторочками рулей. Онъ отличается отъ стараго только меньшей яркостью всѣхъ цвѣтовъ, цвѣтомъ клюва и отсутствіемъ зеленыхъ перьевъ на груди. Послѣднія начинаютъ уже пробиваться у двухъ другихъ птицъ немного постарше (добытыхъ 7 — 15 авг, дл. кр. 154 — 161). У всѣхъ этихъ трехъ ноздревые клапаны и конецъ клюва красные, основаніе клюва черноватое, у болѣе молодаго черноты меньше, у тѣхъ, которые постарше,— больше; очевидно, у птенцовъ клювъ красный и темнѣетъ по мѣрѣ того, какъ они растутъ. Молодые самцы того же года зимой совершенно похожи на старыхъ и отличаются отъ нихъ только тѣмъ, что не имѣютъ шпоръ.

Шпоры появляются у самцовъ, вѣроятно, лишь на второй годъ: мы имѣемъ съ одной стороны декабрьскихъ и январскихъ птицъ, которыя шпоръ еще не имѣютъ, съ другой стороны одинъ экземпляръ, добытый 15 августа, очевидно, не менѣе, какъ годовикъ, у котораго только на одной ногѣ полная шпора, на другой же лишь зачатокъ шпоры. Наибольшее количество шпоръ у старыхъ — 5, три на одной и 2 на другой ногѣ, но есть птицы съ 2-мя, 3-мя, 4-мя шпорами. Весьма вѣроятно, что число шпоръ прямо указываетъ на число лѣтъ птицы. Самокъ, не достигшихъ полнаго роста, у насъ нѣтъ. Молодыя самки, битыя въ ноябрѣ и декабрѣ, имѣютъ еще красные концы и края челюстей, ноздревые же клапаны черные, — какъ у старыхъ (насѣдокъ). Они отличаются отъ послѣднихъ большею яркостью оперенія и тѣмъ, что имѣютъ болѣе рѣзко разграниченными сѣрый цвѣтъ горла и бурый груди, тогда какъ у насѣдокъ оба цвѣта незамѣтно переходятъ. И яркость цвѣтовъ, и рѣзкость границъ зависятъ, вѣроятно, только отъ свѣжести оперенія. Розовыхъ оторочекъ рулей, какъ у шенсійскихъ птицъ, по описанію David'a, ни у одной изъ нашихъ самокъ нѣтъ. Всѣ наши экземпляры добыты только въ двухъ мѣстностяхъ Сигученскаго округа: близъ дер. Дзююань и близъ дер. Сàтанп. Деревни эти отстоятъ другъ отъ друга не болѣе 40 верстъ по прямой линіи, но раздѣлены глубокой долиной Сигученской рѣки. Птицы изъ этихъ двухъ мѣстностей не много различаются: дзю-юаньскіе самцы слегка крупнѣе, каштановый цвѣтъ крыла имѣютъ очень яркій, свѣтлое же пятно на груди очень слабо выраженное, почти не замѣтное; сатанпнскіе помельше, каштановый цвѣтъ крыла мутнѣе, грязноватой, пятно же на груди рѣзко,—совершенно какъ на рисункѣ David et Oustalet. Кромѣ того у многихъ (но не у всѣхъ) изъ сатанпнскихъ самцовъ на нѣкоторыхъ каштановыхъ перьяхъ крыла есть розовые ободки и такого же цвѣта неправильныя полоски вдоль опахалъ, въ серединѣ, чего нѣтъ ни у одного изъ дзю-юаньскихъ. Эти различія объясняются можетъ быть отчасти временемъ года (дзююаньскіе — всѣ осенніе, сатанпнскіе — всѣ зимніе), но мы склонны болѣе видѣть въ нихъ признаки мѣстныхъ породъ. *I. sinensis* живетъ всегда многочисленными табунами, ведущими исключительно нѣшій образъ жизни, благодаря чему такія естественныя преграды, какъ широкія и глубокія долины рѣкъ, совершенно изолируютъ одну колонію отъ другой. Обособленность же — благопріятная почва для выработки мѣстныхъ породъ.

I. sinensis открытъ Давидомъ въ горахъ западной Шенси и распространяется, по его словамъ, до Хо-нанп. Въ Гань-су онъ найденъ Пржевальскимъ въ сѣверозападной части къ с. отъ г. Синина, а мною въ юго-западной, въ Сигученскомъ округѣ. Послѣдній составляетъ, вѣроятно, южную границу распространенія вида, такъ какъ южнѣе, въ «странѣ Манзъ» (близъ г. Лунъ-ань-фу) и въ горахъ западной Сычуани, Давидомъ открытъ другой видъ — *I. Geoffroyi*.

Въ Сигученскомъ округѣ *I. sinensis* живетъ преимущественно въ еловыхъ лѣсахъ и бамбуковыхъ зарослях съ 9000 футъ, всегда болѣе или менѣе многочисленными табунами: я встрѣчалъ штукъ до 50, а по словамъ охотниковъ бываютъ и больше,

чѣмъ въ сотню. Даже въ періодъ вывода, какъ уже замѣтилъ Давидъ, птицы держатся вмѣстѣ. Я встрѣчалъ подобныя общества въ августѣ близъ дер. Дзю-юань. Въ одной компаніи было по нѣскольку насѣдокъ и самцовъ и по нѣскольку выводковъ различнаго возраста. Когда случалось наткнуться на подобное стадо, со всѣхъ сторонъ раздавался протяжный и рѣзкій свистъ самцовъ и все пряталось и убѣгало, но не далеко. Отбѣжавъ немного, самцы взбирались на возвышенныя мѣста, камни или нависшія вѣтви и, притаившись, молча слѣдили за мной. Стопло направиться въ ихъ сторону, снова раздавался свистъ и въ чащѣ слышался шорохъ убѣгающихъ птицъ. Выгнать ихъ на болѣе открытое мѣсто или заставить взлетѣть не было ни какой возможности. Я десятки разъ слышалъ кругомъ, въ бамбуковой чащѣ, писк цыплятъ, но добыть ихъ такъ и не удалось. Не вполнѣ выросшіе самцы попали въ коллекцію только благодаря тому, что сами считали себя уже за взрослыхъ. Они также свистѣли и взмащивались повыше, чтобы полюбопытствовать. Образъ жизни *I. sinensis* ведетъ почти исключительно нѣшій, летаетъ крайне не охотно и не далеко. Только птицы, застигнутыя въ распохъ, притомъ въ лѣсу, гдѣ нѣтъ кустарнаго подсѣда, взлетаютъ, но сейчасъ же садятся на ближайшія деревья и сидятъ неподвижно, прижавшись къ вѣтвямъ. Сидящія на деревѣ, птицы подпускаютъ почти вплотную, но различить ихъ крайне трудно.

Въ зобахъ птицъ, битыхъ осенью, я нѣсколько разъ находилъ только одни грибы, зимой же — мохъ и зеленую лѣсную траву въ родѣ осоки. Жирной эта птица никогда не бываетъ и мясо ея, хотя бѣлое, но съ пронзительнымъ запахомъ дичи, не вкусно. Вѣроятно, благодаря этому, китайцы называютъ *I. sinensis* «Суань-дзиръ», т. е. кислая курочка.

Thaumalea picta (Linn.).

[*Thaumalea picta*, David et Oust., Ois. Chine, p. 414.]

Elliot, Monogr. of Phas., II, pl. XV.

Размѣры:

♂ Дл. 1085. Разм. 635.

Экземпляры: дер. Сатани, декабрь;—ур. Кванъ-дзя-коу (на гр. Шенси), декабрь.

Золотой фазанъ водится въ Гань-су только въ самыхъ южныхъ ея частяхъ. Я встрѣтилъ его къ в. отъ г. Хой-сяна въ урочищѣ Кванъ-дзя-коу (на границѣ Шенси) и въ Сигученскомъ округѣ. Въ урочищѣ Кванъ-дзя-коу, гдѣ мѣстность сравнительно густо населена и хорошо распахана, золотой фазанъ держится въ глубокихъ, заросшихъ колючкою и бамбуками, оврагахъ между пашнями, изъ которыхъ выходитъ кормиться на пашни только рано утромъ и поздно вечеромъ. Въ Сигученскомъ округѣ золотой фазанъ довольно обыкновенъ въ горахъ до 7000 футъ и держится въ лѣсахъ и кустарныхъ чащахъ по береговымъ увалам рѣкъ.

Phasianus torquatus, Gm.

[*Phasianus torquatus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 409.]

Elliot, Monogr. of Phas., II, pl. V.

Размѣры:

♂ Дл. 955. Разм. 790. Кр. 232. Пл. 67. (В. Ордосъ).

Экземпляры: уроч. Терминъ-байшинъ (В. Ордосъ), августъ; — р. Хуанъ-хэ у с.-з. ея изгиба, іюнь.

Оба наши экземпляра *P. torquatus* изъ Ордоса, одинъ изъ восточной части, другой изъ самой западной. Первый въ яркомъ, свѣжемъ перѣ, имѣетъ грудныя перья съ широкими черными каймами и очень узкими черными серединными полосками; второй, блѣднѣе цвѣтомъ, имѣетъ грудныя перья почти безъ каймъ, но съ очень широкими серединными полосками. Блѣдность оперенія и почти полное отсутствіе каймъ у западно-ордосскаго экземпляра, вѣроятно, отчасти объясняются поношенностью оперенія (убитъ въ іюнѣ), но этимъ нельзя объяснить ширину наствольныхъ полосъ грудныхъ перьевъ. Этой особенностью онъ приближается къ *P. tarimensis* Przew.

Въ южной Гань-су кольчатый фазанъ не встрѣченъ.

Phasianus Strauchi, Przew.

[*Phasianus decollatus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 411 (partim)].

Пржевальскій, Монг. и стр. Танг., II, птицы, стр. 119, табл. XVII.—Seebohm, Ibis 1888, p. 312 et sqq.

Размѣры:

♂ Кр. 217—234. Пл. 62—64.

Экземпляры: дер. Ма-пуа (50 в. къ югу отъ г. Лань-джеу), ноябрь;—г. Хой-сянъ, декабрь;—дер. Сатани, февраль;—р. Хей-хо (въ Сы-чуани, выше города Нань-пинъ), іюль.

Г-нъ Seebohm, разбирая группу *P. torquatus*, соединяетъ въ одну подгруппу (по ярко-каштановому цвѣту боковъ) *P. vlangali*, *P. Strauchi* и *P. elegans*. Первый выдѣляется одноцвѣтными каштановыми плечевыми, изъ остальныхъ же двухъ, у *P. Strauchi* грудь мѣдно красная, а у *P. elegans* вся нижняя сторона почти одноцвѣтно-зеленая. Одинъ изъ нашихъ экземпляровъ подтверждаетъ близость двухъ послѣднихъ видовъ, представляя *какъ-бы* переходъ между ними. Мѣдно-красный цвѣтъ занимаетъ у него почти только одинъ бокъ груди, такъ какъ въ середину ея врѣзывается съ живота клиномъ зеленый, который не доходитъ до соединенія съ зеленымъ же цвѣтомъ шеи только на 10—15 мм. Кромѣ того онъ выдѣляется изъ другихъ нашихъ экземпляровъ сильнымъ развитіемъ зеленаго цвѣта вообще вездѣ въ оперенiи. Добытъ въ ноябрѣ около перевала черезъ высокую гору Ма-пуа-сань, верстахъ въ 70 къ югу отъ г. Лань-джеу. Между фазанами Хой-сянскаго округа попадаются особи болѣе или менѣе приближающіяся къ вышеупомянутому, но большинство ихъ, также какъ фазаны Сигученскаго

округа и единственный нашъ экземпляръ изъ Сы-чуани, имѣютъ почти всю грудь мѣдно-краснаго цвѣта, а зеленый цвѣтъ въ опереніи не такъ рѣзко выраженнымъ.

Между южно-ганьсуйскими *Ph. Strauchi* весьма обыкновенны особи со слѣдомъ бѣлаго ошейника: иногда это довольно большія бѣлыя пятна, иногда только отдѣльныя бѣлыя перышки, иногда же лишь бѣлая основная часть нѣкоторыхъ перьевъ, видимая только, когда ихъ раздвинуть.

Въ южной Ганьсу *Ph. Strauchi* весьма обыкновенен. Водится повсюду, гдѣ есть пашни и держится главнымъ образомъ въ зарослях колючихъ кустарниковъ по пашенным межамъ и террасамъ. Зимой фазаны пасутся по пашнямъ по одиночкѣ, съ конца же февраля начинаютъ собираться табунами. Самцы и самки, какъ я замѣтилъ, образуютъ иногда совершенно отдѣльные табуны. Выводки я встрѣчалъ въ началѣ іюля и птенцы были въ это время величиной съ недѣльнаго цыпленка. Самки съ выводками держатся въ самыхъ глухихъ колючкахъ и отыскать ихъ чрезвычайно трудно, самцы же въ это время не рѣдки по пашнямъ. Я сотни разъ наблюдалъ, какъ они, спокойно пасясь въ хлѣбахъ, иногда вдругъ, съ громкимъ крикомъ и хлопаньемъ крыльевъ, подпрыгиваютъ на аршинъ отъ земли и затѣмъ снова продолжаютъ спокойно пастись. Или же нѣкоторыя, забравшись въ середину небольшаго куста, непрестово кричать въ продолженіи порядочнаго промежутка времени. Токованіе-ли это холостыхъ, не нашедшихъ себѣ подругъ птицъ, или же это отцы семейства, дающіе знать самкамъ, что они по близости и слѣдятъ за ихъ безопастностью?

Pucrasia xanthospila ruficollis, David et Oust.

[*Pucrasia xanthospila, var. ruficollis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 408.]

David et Oustalet, Ois. Chine, p. 408.

Размѣры:

♂ Дл. 565—620. Разм. 700—740. Кр. 214—229. Кл. 29—31. Пл. 62—65. Хв. 217—245.
♀ » 500. » 700. » 208. » 27. » 60. » 165.

Экземпляры: дер. Сатани, декабрь, январь;—дер. Чаго, декабрь.

По описанію гг. David et Oustalet шенсійская разновидность отличается отъ типичной *P. xanthospila* слѣдующими признаками: темно рыжими боками шеи; меньшей величиной бѣлаго пятна на щекахъ, которое окружено притомъ со всѣхъ сторонъ металлически чернымъ цвѣтомъ; черными перьями подхвостья, безъ каштановыхъ полосъ и съ конечными бѣлыми пятнами закругленной, а не угловатой формы; меньшимъ распространеніемъ на животъ срединной каштановой полосы, и большимъ развитіемъ черныхъ оттѣнковъ на спинѣ и крыльяхъ. Мы относимъ наши экземпляры къ формѣ *P. ruficollis* только на основаніи ярко-рыжаго цвѣта полуошейника, обхватывающаго шею сверху и съ боковъ, чѣмъ они дѣйствительно довольно рѣзко отличаются, какъ отъ всѣхъ просмотрѣнныхъ нами рисунковъ *P. xanthospila*, такъ и отъ единственнаго бывшаго у насъ въ рукахъ экземпляра изъ С. Китая. У послѣдняго цвѣтъ

полуошейника песочно-желтый. Что же касается другихъ вышеприведенныхъ особенностей шенсійскихъ птицъ, то у нашихъ экземпляровъ они либо не рѣзко выражены, либо даже отсутствуютъ: бѣлыя пятна на щекахъ у нѣкоторыхъ малы и почти окружены чернымъ, у другихъ же такія же—какъ у типичной формы. Различія отъ послѣдней въ цвѣтѣ перьевъ подхвостья и въ степени распространенія на животъ серединной каштановой полосы, мы не нашли; цвѣтъ же верхней стороны тѣла хотя у нашихъ птицъ и темнѣе, но въ самой незначительной степени.

P. ruficollis водится въ небольшомъ количествѣ въ Сигученскомъ и Миндже-скомъ округахъ на высотѣ 6 — 9000 футъ. Встрѣчается и выше, но, какъ говорятъ, очень рѣдко. Образъ жизни ведетъ уединенный и держится, по одиночкѣ или парами, въ смѣшанныхъ лѣсахъ и кустарныхъ чащахъ береговыхъ уваловъ рѣкъ. Несмотря на постоянную лѣсную охоту, мнѣ пришлось встрѣтить эту осторожную птицу всего раза два и всѣ наши экземпляры добыты въ силки. Я держалъ разъ молодаго самца въ клѣткѣ. Онъ не былъ пугливъ, не бился и позволялъ даже брать себя въ руки, но все время меланхолически сидѣлъ на одномъ мѣстѣ и не хотѣлъ ни ѣсть, ни пить. Пришлось кормить его насильно. Мѣсяца черезъ $1^1/_2$ онъ все таки околѣлъ.

Китайцы называютъ *P. ruficollis* «Ко-дзи», тангуты — «Гуй-дуй».

Ceriornis Temminckі (J. E. Gray).

[*Ceriornis Temminkii*, David et Oust., Ois. Chine, p. 418, pl. 112.]

Elliot, Monogr. of Phas., I, pl. XXV.

Размѣры:

♂ ad.	Дл.	580—630.	Разм.	780—810.	Кр.	230—238.	Кл.	30—32.	Пл.	64—70.	Хв.	205—215.
♂ imm.	»	580.	»	770—780.	»	227—235.	»	32—33.	»	68—69.	»	180—185.
♀ ad.	»	540.	»	720.	»	207.	»	33.	»	62.	»	165.
♀ juv.	»	520.	»	700.	»	200.	»	29.	»	57.	»	160.

Радужина темно-бурая. Верхняя челюсть у основанія черная, къ концу свѣтлѣе; нижняя — синевато-бурая. Голая кожа надъ и передъ глазами и рожки (12 мм. въ серед. января) — ярко-синія. Кожистый передникъ на подбородкѣ (65 мм. въ серед. января) — грязно-синій; углубленія между складками по краямъ его — грязно-розовыя. Плюсны у одного стараго самца, добытаго 20 декабря, розовато-бѣлыя, у другихъ, тоже взрослыхъ самцовъ, — свѣтло-бурыя, а у самокъ и молодыхъ — бурыя.

Экземпляры: дер. Сатани, декабрь;—дер. Чаго, январь.

C. Temminckі водится въ ю. Гань-су только въ самой восточной и южной ея частяхъ, въ мѣстностяхъ пограничныхъ съ Шенси и съ Сычуанью. Онъ несомнѣнно встрѣчается въ горахъ къ востоку отъ г. Хой-сяна [1]) и найденъ мною въ Сигученскомъ округѣ и въ смѣжной съ послѣднимъ части Миндже-скаго, около мѣстечка Танъ-чанъ. Въ другихъ частяхъ Миндже-скаго округа, какъ лежащихъ въ системѣ

[1]) Въ 50 верстахъ къ в. отъ г. Хой-сяна, на границѣ Шенси, въ уроч. Кванъ-дзя-коу (округъ г. Лянъ-танъ) видъ этотъ несомнѣнно водится, но рѣдокъ. Я слыхалъ это, какъ отъ туземцевъ, такъ и отъ мѣстныхъ католическихъ миссіонеровъ и самъ нѣсколько разъ находилъ перья, но птицъ добыть не удалось.

Желтой рѣки, такъ и Голубой, а также въ среднихъ частяхъ Ю. Гань-су, въ округахъ городовъ Лп-сянъ, Си-хо и Чэнъ-сянъ, на сколько мнѣ извѣстно, этотъ видъ нигдѣ не встрѣчается.

Въ Сигученскомъ округѣ *C. Temminckі* наиболѣе обиленъ къ югу отъ г. Си-гу, въ котловинѣ рѣки текущей параллельно Сигученской. Онъ не рѣдокъ здѣсь около д. Чаго, изрѣдка попадается около д. Сатанп, но выше послѣдней его уже нѣтъ. Вообще выше 7—7500 футъ этотъ видъ не встрѣчается. Живетъ въ чащѣ лиственныхъ лѣсовъ, по береговымъ увалампъ рѣкъ и, по словамъ мѣстныхъ охотниковъ, держится преимущественно тамъ, гдѣ растетъ самшатъ (по кит. Хуанъ-янъ), листья котораго будто бы очень любитъ. Въ зобахъ, препарпрованныхъ мною птицъ, я дѣйствительно почти всегда находилъ эти листья. Подобно *P. xanthospila*, *C. Temminckі* ведетъ скрытный образъ жизни, не выходя изъ лѣсной чащи, и добываютъ его исключительно силками. Особенные мастера этой ловли жители д. Чаго. Я прожилъ здѣсь около двухъ недѣль и ни я, ни мои два охотника тангута, охотясь ежедневно, ни разу даже не встрѣтили этой птицы, мѣстные же жители принесли мнѣ около десятка пойманныхъ въ силокъ, въ томъ числѣ четырехъ живыхъ. Этихъ послѣднихъ я держалъ нѣкоторое время въ клѣткѣ. На другой день послѣ поимки они ѣли уже хлѣбныя зерна, предпочитая другимъ гречиху, и дрались, если ихъ садили вмѣстѣ.

Китайцы называютъ *C. Temminckі* «Чау-дзи», тангуты — «Юма» или «Ума».

Tetraophasis obscurus (J. Verr.).

[*Tetraophasis obscurus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 404, pl. 109.]

Elliot, Monogr. of Phas., I, pl. XXI. — Пржевальскій, Монг. и стр. Танг., II, птицы, стр. 129.

Размѣры:

♂ Дл. 490—520. Разм. 700—730. Кр. 203—220. Пл. 49—53. Хв. 166—185.
♀ » 490. » —— » 204—220. » 49—52. » 170—183.

Экземпляры: дер. Дзю-юань, августъ; — дер. Сатанп, ноябрь, декабрь, январь.

Этотъ видъ, открытый Давидомъ въ Муппнѣ и найденный Пржевальскимъ въ С. З. Гань-су, распространенъ, вѣроятно, по всей западной, возвышенной части провинціи, расположенной еще на уступѣ тибетскаго плоскогорья. Въ восточной, болѣе низкой части Гань-су, на сколько намъ извѣстно, его нигдѣ нѣтъ.

Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ *T. obscurus* водится повсюду на высотѣ съ 8000 футъ, но не особенно многочисленъ. Держится, главнымъ образомъ, въ еловыхъ лѣсахъ, въ особенности по опушкамъ и тамъ, гдѣ они растутъ по крутпкамъ, вблизи скалъ и луговъ. Обыкновенно, птицы встрѣчаются небольшими табунками штукъ до 10, держатся большею частью на землѣ, выкапывая корни травъ, которыми питаются. Застигнутый въ расплохъ, табунокъ нѣкоторое время бѣжитъ, затѣмъ разлетается по деревьямъ. Полетъ *T. obscurus* чрезвычайно стремительный и быстрый, на дерево онъ садится съ такимъ рѣзкимъ ударомъ, что его

слышно далеко, и по числу ударовъ можно всегда опредѣлить, сколько было штукъ въ стадѣ. На дерево птица садится либо въ середину, либо даже внизу и всегда около самаго ствола. Сидитъ такъ крѣпко, что подпускаетъ вплотную. Лѣтомъ присутствіе въ данной мѣстности *T. obscurus* можно всегда опредѣлить по ихъ очень громкимъ и чрезвычайно страннымъ крикамъ на закатѣ солнца. Крики эти, по своей странности, не поддаются описанію и болѣе всего напоминаютъ нестройные голоса птенцовъ нѣкоторыхъ птицъ, когда родители принесли имъ добычу. Зимой голосъ *T. obscurus* слышится чрезвычайно рѣдко.

Относительно періодическихъ явленій жизни этой интересной птицы можемъ сообщить очень мало. Молодыя пріобрѣтаютъ нарядъ взрослыхъ, вѣроятно, очень рано. Мы имѣемъ молодую птицу, добытую 8 августа, которая ростомъ только въ $^3/_4$ взрослой, но уже похожа на послѣднюю, отличаясь только меньшею яркостью всѣхъ цвѣтовъ въ опереніи. Старыя, битыя въ это же время, линять еще не начинали, а битыя въ концѣ мѣсяца, находились въ полной линькѣ.

Китайцы называютъ *T. obscurus* «Пей-ина-дзи», т. е. бѣлохвостая курица; тангуты — «Кулё».

Lophophorus Lhuysii, J. Verr. et A. Geoffr.

[*Lophophorus Lhuysii*, David et Oust., Ois. Chine, p. 403, pl. 110.]

Elliot, Monogr. of Phas., I, pl. XX.

Размѣры:

♂ ad. Дл. 830 Разм. 1110. Кр. 347. Кл. 60. Пл. 85. Хв. 280.
♂ imm. » 800—835. » 1080—. » 318—322. » 56—60. » 80—84. » 273—298.
♀ — » — —825. » —— » 317—337. » 56—59. » 78—80. » 273—300.

Радужина темно-коричневая; клювъ темно-розоваго цвѣта; плюсны зеленовато-бурыя, къ пальцамъ темнѣе. У взрослаго самца ярко-синее голое пятно передъ глазомъ.

Экземпляры: дер. Та-хей-гоу, ноябрь, декабрь, январь.

David и Oustalet говорятъ, что самцы этого вида получаютъ полный нарядъ не ранѣе, какъ на второй годъ, а до этого времени они, какъ и самки, буро-пестрые. Послѣднее вѣрно лишь отчасти и только, вѣроятно, для очень молодыхъ птицъ. Наши экземпляры молодыхъ самцовъ, еще пестрые и въ общемъ похожіе на самокъ, однако уже рѣзко отъ нихъ отличаются.

Самки имѣютъ голову, зашеекъ, междуплечевыя, всѣ верхнекроющія крыла и махи втораго порядка — бурые съ мелкимъ рыжеватымъ узоромъ на всѣхъ перьяхъ, характеръ и оттѣнки котораго на разныхъ частяхъ слегка различны; спина бѣлая; надхвостье бѣловатое, сильно исчерченное бурымъ и рыжеватымъ; хвостъ бурый съ многочисленными рыжими поперечными полосами; бока головы вокругъ глазъ и подбородокъ грязно бѣлые; вся нижняя сторона буро-черная съ грязно бѣлыми широкими полосами вдоль середины всѣхъ перьевъ. Полосы эти шире у той изъ нашихъ самокъ, которую по общей величинѣ, а также по массивности плюснъ, мы считаемъ за болѣе старую.

Наши молодые самцы сверху очень похожи на самокъ, но сразу отличаются отъ нихъ тѣмъ, что имѣютъ бока головы и подбородокъ матово-черные, безъ всякихъ слѣдовъ бѣлаго цвѣта. Нижняя сторона тѣла у одного изъ самцовъ продольно-полосатая, какъ у самки, только полосы уже; у другаго же почти одноцвѣтная, буро-черная, съ бѣлыми полосками только по бокамъ груди и съ бѣлыми кончиками перьевъ на нижней части живота и на бокахъ тѣла.

Хотя молодые самцы сверху и очень похожи на самокъ, но сходство это нарушается тѣмъ, что нѣкоторыя отдѣльныя перья у нихъ уже начинаютъ принимать металлически-блестящіе цвѣта полнаго наряда. Подобныя перья разбросаны по одиночкѣ на головѣ, шеѣ и крыльяхъ и, при бѣгломъ взглядѣ, почти не замѣтны. Нѣкоторыя изъ нихъ, болѣе мелкія, такого же цвѣта и блеска какъ у старыхъ самцовъ, другія же, покрупнѣе, имѣютъ только еле замѣтный въ серединѣ и болѣе или менѣе рѣзкій по краямъ, металлически-блестящій налетъ. Въ общемъ же, послѣднія перья похожи на окружающія т. е. бурыя съ рыжеватымъ узоромъ. Тоже самое явленіе замѣтно и на хвостѣ. Всѣ рули у молодыхъ самцовъ еще, какъ у самокъ, поперечно полосатые, но на нѣкоторыхъ изъ нихъ уже блестяще-синій налетъ по краямъ. Подобные рули отличаются отъ другихъ меньшей шириной рыжихъ поперечныхъ полосъ, которыя, при томъ выклинниваясь, не доходятъ до краевъ рулей.

Такая частичная окраска перьевъ указываетъ на то, что самцы получаютъ полный нарядъ постепенно, пигментаціей перьевъ. Вѣроятно, подобнымъ же путемъ у нихъ исчезаютъ и бѣлыя полосы на нижней сторонѣ тѣла.

Lophophorus Lhuysii водится въ Гань-су только въ хребтѣ, отдѣляющемъ Сигученскій округъ отъ Сычуани и здѣсь, насколько мнѣ извѣстно, только въ двухъ, трехъ мѣстахъ, отдѣльными колоніями. Одну изъ такихъ колоній я встрѣтилъ не далеко отъ дер. Та-хей-гоу (Сигуч. окр.), въ горахъ лѣваго берега небольшой рѣчки, на которой она расположена. Птицы живутъ здѣсь близъ предѣла древесной растительности, въ дикихъ скалахъ и каменныхъ розсыпяхъ, поросшихъ рѣдкими лѣсами древовиднаго можжевельника (*Juniperus pseudosabina?*), спускаясь отсюда ниже только на кормежку и лишь зимой, въ особенности же послѣ снѣговъ [1]). Они встрѣчаются тогда на небольшихъ луговинахъ, расположенныхъ на вершинахъ хребтиковъ между ущельями и даже въ лѣсахъ, на днѣ послѣднихъ. Питается *L. Lhuysii* кажется исключительно корнями травъ, которые выкапываетъ клювомъ. На кормежку птицы прилетаютъ небольшими табунками въ 5 — 7 штукъ и своимъ плавнымъ, съ медленными размахами крыльевъ, полетомъ напоминаютъ хищныхъ. Самцы на лету не рѣдко кричатъ. Голосъ ихъ, протяжный и громкій, похожъ на голосъ чернаго дятла. *L. Lhuysii* вообще

---

[1]) Это объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что послѣ снѣговъ, при наступившей затѣмъ ясной погодѣ, почва высокихъ и сравнительно открытыхъ мѣстъ, гдѣ живетъ *L. Lhuysii*, покрывается, отъ пригрѣва солнца и ночныхъ морозовъ, крѣпкимъ ледянымъ слоемъ, не позволяющимъ птицамъ выкапывать корни травъ, которыми онѣ питаются. Такое образованіе ледяной коры я наблюдалъ самъ. Ледяной слой днемъ немного таетъ, ночью крѣпнетъ и исчезаетъ постепенно только въ продолженіи нѣсколькихъ дней

довольно остороженъ. Въ открытой мѣстности птицы не подпускаютъ на сотни шаговъ и, либо перелетаютъ въ другое ущелье, либо возвращаются обратно въ скалы. Застигнутый въ расплохъ въ лѣсу, табунокъ разлетается въ разныя стороны, причемъ иногда и, кажется только молодыя птицы, садятся на деревья. Сидятъ чрезвычайно крѣпко. Мнѣ пришлось разъ спугнуть въ лѣсномъ ущельѣ небольшой табунокъ и замѣтить, что одна изъ птицъ сѣла по близости. Послѣ долгихъ поисковъ, я разыскалъ ее въ чащѣ густыхъ елей, гдѣ она сидѣла на суку около самого ствола дерева, не высоко надъ землей, и совершенно скрытая вѣтвями. Такъ какъ разстояніе до нея было не болѣе 10—15 шаговъ, то, боясь разбить, я взялъ немного въ сторону и промахнулся. Не смотря на это, птица не слетѣла и сидѣла совершенно неподвижно до тѣхъ поръ, пока я не зарядилъ ружья и не положилъ ее со втораго выстрѣла.

Охота за *L. Lhuysii* очень трудна и утомительна главнымъ образомъ вслѣдствіе мало доступной мѣстности, гдѣ онъ водится. Узкія и глубокія, но не длинныя ущелья имѣютъ видъ почти коридоровъ. Забравшись на раздѣляющій ихъ хребтикъ, гдѣ по лугамъ скорѣе всего можно разсчитывать найдти птицъ, нельзя по верху хребтика перейти на другую сторону ущелья, такъ какъ вершины ущелій замкнуты отвѣсными скалами. Иногда птицы перелетаютъ только на другую сторону ущелья, но чтобы вновь отыскать ихъ, приходится спуститься и подняться, все время карабкаясь и рискуя забраться въ такое мѣсто, откуда нѣтъ ходу ни взадъ, ни впередъ. Проживъ 40 дней въ декабрѣ и январѣ въ горахъ около дер. Та-хей-гоу, съ исключительной цѣлью добыть *L. Lhuysii* и охотясь ежедневно, я за все время видѣлъ около 30 штукъ, но добылъ лишь двухъ: одного стараго и одного молодаго самца. Мѣстные охотники не могли добыть для меня ни одного стараго самца, а поймали силками лишь нѣсколько самокъ.

Китайцы называютъ *L. Lhuysii* «Янъ-дзи», тангуты — «Цидо».

Crossoptilon auritum, (Pall.).

[*Crossoptilon auritum*, David et Oust., Ois. Chine, p. 406. pl. 108.]

Elliot, Mongor. of Phas., I, pl. XVII. — Пржевальскій, Монг. стр. Танг., II, птицы, стр. 121.

Размѣры:

♂ Кр. 288—314. Кл. 50—54. Пл. 93—104. Хв. 475—530.
♀ » 270—298. » 45—50. » 88— 98. » 450—510.

Экземпляры: дер. Сатани; ноябрь, декабрь, январь.

Нарядъ молодыхъ, кажется, не извѣстенъ. Я добылъ разъ молодую птицу изъ выводка, но у меня осталась объ ней лишь замѣтка въ записной книжкѣ, такъ какъ шкурка, къ сожалѣнію, не сохранена. Эта птица, добытая 3 августа, величиной была уже въ половину взрослой. Оперѣніе имѣла двухъ сортовъ: новое—аспидно-синее и старое—рыжевато-бурое. Всѣ перья послѣдняго цвѣта съ рыжеватыми каймами и такими же узкими поперечными полосками. Махи почти всѣ аспидно-синіе. Два первыхъ маха по всему наружному опахалу и къ концу внутренняго—бурые съ рыжеватыми прерыви-

стыми и волнистыми полосками. Клювъ темно-роговаго цвѣта; плюсны желто-красныя; пальцы на сгибахъ черноватые.

Crossoptilon auritum, подобно *Tetrastes Sewertzowi* и *Tetraophasis obscurus* водится въ Гань-су только въ западной, нагорной части провинціи и совершенно неизвѣстенъ въ восточной. Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ онъ довольно обыкновенепъ. Зимой живетъ въ словыхъ съ бамбуковой порослью лѣсахъ, растущихъ на вершинахъ междудолинныхъ хребтовъ съ 8 — 9000 футъ; лѣтомъ заходитъ и въ альпійскую область, гдѣ я находилъ его въ зарослях кустарныхъ рододендровъ. Обыкновенно, даже зимой, птицы живутъ небольшими табунками въ 10 — 15 штукъ и держатся большею частью на землѣ, питаясь корнями травъ, которые выкапываютъ клювомъ. Табунки ведутъ кочевой образъ жизни, оставаясь нѣкоторое время въ одной мѣстности и затѣмъ переселяясь въ другую. Почуютъ ушастые фазаны на деревьяхъ и, собираясь заночевать, на закатѣ солнца подолгу и громко кричатъ. Этимъ обстоятельствомъ мѣстные жители пользуются для охоты. Замѣтивъ примѣрно по крикамъ мѣсто ночлега, птицъ отыскиваютъ и бьютъ ночью. Мнѣ не приходилось бывать на подобной охотѣ, но, какъ говорятъ, можно перестрѣлять весь табунъ, при условіи только бить на повалъ. Если же которая либо изъ птицъ будетъ лишь ранена и закричитъ, — сейчасъ же разлетается все стадо. Успѣхъ охоты зависитъ также оттого, на какихъ деревьяхъ заночевали птицы. На лиственныхъ, ихъ легко разглядѣть даже въ сравнительно темную ночь, на хвойныхъ же трудно и въ свѣтлую. Днемъ ушастые фазаны крайне осторожны и чутки, и встрѣтиться съ ними можно лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Если охотникъ идетъ снизу, то они уходятъ пѣшкомъ, если же сверху, то, пробѣжавъ значительное разстояніе, слетаютъ уже внѣ выстрѣла, и обыкновенно, перелетаютъ на другую сторону долины.

Выводки, по словамъ мѣстныхъ жителей, появляются въ іюлѣ, и въ одномъ бываетъ до 15 штукъ. Выводокъ, встрѣченный мною 3 августа, состоялъ не менѣе какъ изъ 10, ростомъ уже вполовину взрослыхъ и при немъ были оба старика.

Длинныя среднія хвостовыя перья ушастаго фазана идутъ на украшеніе офицерскихъ шляпъ и, иногда, цѣнятся дорого. За два года до моего пріѣзда въ Гань-су, цѣна одного хвоста, говорятъ, доходила до 2-хъ рублей, въ мое же время спроса на нихъ совершенно не было и тангуты охотно продавали мнѣ цѣлыхъ птицъ съ мясомъ за четвертакъ.

По деревнямъ около г. Минджеу я нерѣдко видѣлъ *C. auritum*, пасущимся около домовъ вмѣстѣ съ другой домашней птицей. Всѣ они, по справкамъ, выведены изъ яицъ отъ дикихъ птицъ, подложенныхъ подъ домашнихъ куръ. Подобныя птицы совершенно ручныя, но говорятъ, не плодятся и нерѣдко, прожившъ даже два, три года, улетаютъ.

PTEROCLIDAE.

Syrrhaptes paradoxus (Pall.).

[*Syrrhaptes paradoxus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 389.]

Dresser, B. of Eur., VI, pl. 468.

Размѣры:

♂ Кр. 257. Кл. 19. Пл. 25. Хв. 196.
♀ » 208. » 18—19. » 24. » 96—114.

Экземпляры: Уроч. Кобденъ-оботу (близъ оз. Гашіунъ-норъ въ Гоби), августъ.

Въ южной Гань-су этотъ видъ не встрѣченъ.

COLUMBIDAE.

Alsocomus Hodgsonii (Vig.).

[*Dendrotreron Hodgsonii*, David et Oust., Ois. Chine, p. 381.]

Jerdon, B. of Ind., III, p. 463.—Scully, Str. Feath., X, p. 163.—Bonaparte, Icon. des Pig., pl. 61 (fig. pessima).

Размѣры:

♂ Дл. 385—400. Разм. 700. Кр. 220—228. Кл. 25—26,5. Пл. 23. Хв. 150.
♀ » 395—460. » 660. » 213—218. » 24,5—26. » 23. » 150.

Радужина грязно-бѣлая; плюсны черноватыя съ просвѣчивающими желтыми пятнами; подошва и когти желтые, послѣдніе у самокъ съ черными концами.

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, августъ.

Самецъ отличается отъ самки большею чистотою сѣраго цвѣта на головѣ и верхней части груди и, въ особенности, преобладаніемъ винно-коричневаго цвѣта (вмѣсто темно-бураго у самки) на всей нижней сторонѣ тѣла и на межлопаточной области.

Этотъ голубь, по словамъ Давида, обыкновенный въ горахъ западной Сычуани, въ Гань-су встрѣченъ мною лишь въ одномъ мѣстѣ,—близъ дер. Дзю-юань, 7 — 15 августа. Табунки, штукъ въ 10—15, прилетали на кормежку въ высокіе горные луга надъ деревней. Птицы были крайне пугливы и не подпускали въ открытой мѣстности на сотни шаговъ.

Columba rupestris, Pall.

[*Columba rupestris*, David et Oust., Ois. Chine, p. 385.]

Gould, B. of As., VI, pl. 54. — Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 406.

Размѣры:

Кр. 215—219. Кл. 23—24. Пл. 24—25. Хв. 122—125.

Экземпляры: гг. Гао-тай и Ли-юань-инъ, у с. подошвы Нань-шаня, іюнь.

Обыкновенъ въ скалистыхъ горахъ, какъ сѣверной, такъ и южной Гань-су.

Turtur orientalis (Lath.).

[*Turtur rupicola*, David et Oust., Ois. Chine, p. 385.]

Dresser, B. of Eur., VII, pl. 463.—Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 412.

Размѣры:

♂ Дл. 350. Кр. 196. Кл. 23. Пл. 26. Хв. 138.
♀ » — » 190. » 24. » 27. » 133.

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, августъ; — гора Чагола.

Въ Сигученскомъ округѣ эта горлинка встрѣчается изрѣдка, высоко въ горахъ и вдали отъ жилищъ.

Turtur chinensis (Scop.).

[*Turtur chinensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 386.]

Hume, Str. Feath., III, p. 164.

Размѣры:

♀ Дл. 330—335. Разм. 470—475. Кл. 20—22. Пл. 25. Хв. 145.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, декабрь, февраль.

Эта горлинка весьма обыкновенна въ садахъ по всей южной Гань-су.

Turtur douraca, Hodgs.

[*Turtur risorius*. David et Oust., Ois. Chine, p. 387.]

Schlegel, Mus. Pays-Bas, IV, Columb., p. 123. (1873).

Размѣры:

♂ Дл. 345. Разм. 550. Кр. 175. Кл. 23,5. Пл. 25. Хв. 148. (a)
♀ » 345. » 525—. » 170—173. » 23. » 23. » 136—142. (b)

Экземпляры: (a) Монаст. У-тай, іюнь; — (b) г. Хой-сянъ, декабрь.

Schlegel первый указалъ на то, что дикая азіятская горлинка, относимая различными авторами къ виду *T. risorius*, и типичная *T. risorius*, описанная Линнеемъ по домашнимъ птицамъ,—рѣзко различаются. У первой хвостъ сравнительно длиннѣе и наружныя опахала крайнихъ рулей съ чернымъ, у второй хвостъ сравнительно короче и наружныя опахала крайнихъ рулей чисто бѣлыя. Вслѣдствіе этого различія, Schlegel выдѣляетъ дикихъ азіятскихъ птицъ въ самостоятельный видъ—*T. douraca*, употребляя названіе, данное Hodgson'омъ индійскимъ горлинкамъ только однажды и то безъ описанія [1]).

Богдановъ думалъ найдти для азіятскихъ горлинокъ болѣе древнее названіе въ *T. torquatus*, Brisson, но, какъ замѣтилъ г. Stejneger [2]), ошибочно, такъ какъ птица, описанная Brisson'омъ, имѣетъ, какъ и *T. risorius*, Linn., наружныя опахала крайнихъ

---

[1]) Gray's Zool. Misc., p. 85 (1844).

[2]) Stejneger, Proc. Un. St. Nat. Mus, X (1888), p. 426. [*Turtur douraca torquatus* (Bogd)].

рулей бѣлыя. Указавъ на ошибочность отожествленія Богданова, Stejneger оставляетъ однако названіе *T. torquatus* Bogd., nec Briss., для обозначенія китайской и японской расы, отличающейся отъ типичной *T. douraca* изъ Индіи большей величиной и блѣднымъ цвѣтомъ оперенія.

Мы думаемъ, что названіе *T. torquatus* не можетъ быть удержано даже для обозначенія какой либо расы. Во 1-хъ, оно отнесено, принимая во вниманіе синонимію Богданова [1]), къ птицамъ изъ Тянь-шаня, Кульджи, Алашаня, Уссурійскаго края и Китая, однородность которыхъ, въ смыслѣ расы, очень сомнительна; во 2-хъ, если различать въ видѣ *T. douraca* только двѣ расы и одну изъ нихъ характеризовать крупной величиной и блѣдной окраской оперенія, то раса эта имѣетъ уже названіе въ *T. Stoliczkae* [2]), описанной г. Hume'омъ по экземплярамъ изъ Кашгара и Яркенда.

Однородность вида *T. douraca* къ сѣверу отъ Гималаевъ, какъ мы замѣтили, очень сомнительна. Это довольно ясно выступаетъ при сравненіи размѣровъ птицъ изъ различныхъ мѣстностей. Приводимъ табличку только длины сложеннаго крыла, такъ какъ на этотъ размѣръ менѣе всего вліяетъ способъ измѣренія.

			Полъ.	Дл. Кр.
1 экз.	Пржевальскаго [3])	изъ Алашаня	♂	188. мм.
3 »	Hume (*T. Stoliczkae*)	» Кашгара и Яркенда	?	187. »
1 »	Пржевальскаго	» с. Гань-су	♂	178. »
1 »	Stejneger'a	» Японіи	♂	176. »
1 »	нашъ	» г. У-тай-шань.	♂	175. »
1 »	Stejneger'a	» Японіи	♀	174. »
1 »	нашъ	» ю. Гань-су	♀	173. »
1 »	нашъ	» ю. Гань-су	♀	170. »
2 »	Муз. И. Ак. Наукъ	» Пенджаба	?	168. »
2 »	Муз. И. Ак. Наукъ	» Пенджаба	?	165. »
1 »	Муз. И. Ак. Наукъ	» Пенджаба	?	160. »
1 »	Stejneger'a	» Wadale (Индія)	♀	160. »
По Jerdon'у и г. Hume'у у индійскихъ птицъ крыло				165. »

Индивидуальныя и половыя колебанія въ размѣрахъ индійскихъ горлинокъ, повидимому, очень малы и не превосходятъ 10 милл. въ сложенномъ крылѣ. Наши экземпляры на столько же крупнѣе индійскихъ, на сколько меньше экземпляровъ изъ Кашгара, Яркенда и Алашаня, такъ что отнести ихъ къ *T. douraca* или къ *T. Stoliczkae* въ смыслѣ расы, совершенно невозможно; выдѣлить же, сходныхъ по величинѣ, гань-суйскихъ, утайшаньскихъ и японскихъ птицъ въ отдѣльную расу,—также нельзя: японскія горлинки, по словамъ г. Stejneger'a, гораздо свѣтлѣе индійскихъ, наши

[1]) Bogdanow, Consp. Av. Imp. Ross., fasc. I, p. 9 (1884).
[2]) Hume, Str. Feath., II, p. 519 (1874).
[3]) Пржевальскій, Монг. и стр. Танг., II, птицы, стр. 111.

же экземпляры и экземпляры изъ Пенджаба Музея Императорской Академіи Наукъ цвѣтомъ совершенно не различаются. Считая такимъ образомъ вопросъ о расахъ вида *T. douraca* къ сѣверу отъ Гималаевъ совершенно не выясненнымъ, мы называемъ нашихъ птицъ *T. douraca* только въ коллективномъ смыслѣ [1]).

T. douraca въ южной Гань-су еще болѣе многочисленна, чѣмъ *T. chinensis* и оба вида живутъ вмѣстѣ въ садахъ.

Turtur humilis (Temm.).

[*Turtur humilis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 388.]

Walden, Trans. Zool. Soc. Lond., IX, p. 219. — Hume, Str. Feath., IV, p. 292.

Размѣры:

♂ Дл. 250. Кр. 140. Кл. 17,5. Пл. 21.

Экземпляръ: городъ Чэнъ-сянъ, май.

Нашъ экземпляръ принадлежитъ къ типичной крупной формѣ, отличающейся отъ индійской *T. tranquebarica*, кромѣ величины, болѣе темнымъ винно-краснымъ цвѣтомъ оперенія и болѣе темными сѣрыми нижними кроющими крыла.

Въ южной Гань-су эта горлинка встрѣчена лишь однажды, 9 мая, на пашнѣ около г. Чэнъ-сяна.

FALCONIDAE.

Circus cyaneus (Linn.).

[*Circus cyaneus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 27.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 52. — Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 19.

Размѣры:

♂ Дл. 500. Разм. 1050. Кр. 327. Пл. 70. Хв. 225.
♀ » 500. » 1080. » 345. » 73. » 238.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, февраль.

За зиму проведенную мною въ окрестностяхъ г. Хой-сяна, видъ этотъ встрѣченъ всего раза два или три.

---

[1]) Для выясненія расъ и ихъ распространенія весьма интересно слѣдующее обстоятельство. Изъ двухъ экземпляровъ, размѣры которыхъ приводитъ Пржевальскій, одинъ, добытый въ паркѣ алашаньскаго князя—гдѣ, какъ сообщали ему, горлинки появились всего лѣтъ двадцать—такъ же великъ, какъ и *T. Stoliczkae*. Другой же, добытый въ с.-з. Гань-су, не отличается по размѣрамъ отъ нашихъ птицъ. Различіе въ величинѣ алашаньскаго и ганьсуйскаго экземпляровъ (оба самцы) настолько велико, что, принимая во вниманіе малыя колебанія въ ростѣ индійскихъ птицъ, трудно предположить, чтобы алашаньскія птицы были переселенцами изъ Гань-су. — David et Oustalet даютъ размѣры крыла *T. risorius* въ 185 мм., но неизвѣстно откуда измѣренный экземпляръ. Возможно, что онъ изъ с. Монголіи и земли Уротовъ, гдѣ Давидъ также коллектировалъ.

Astur palumbarius (Linn.).

[*Astur palumbarius*, David et Oust., Ois. Chine, p. 23.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 95. — Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 28.

Размѣры:

Дл. 590. Разм. 1040. Кр. 336. Пл. 77. Хв. 280.

Экземпляръ: дер. Сатани, декабрь.

Нашъ экземпляръ, еще не вполнѣ взрослая птица (продольно-полосатая снизу, но уже съ нѣсколькими поперечно-полосатыми перьями на шеѣ), отличается отъ птицъ соотвѣтствующаго возраста изъ Европейской Россіи ржаво-рыжимъ цвѣтомъ (вмѣсто грязно-бѣлаго) нижней стороны тѣла. Кромѣ того, онъ имѣетъ, по сравненіи съ послѣдними, хвостъ сравнительно длиннѣе и черныя полосы на немъ шире. Цвѣтъ верхней стороны тѣла и ширина черныхъ полосъ на нижней — тѣже, что у европейскихъ птицъ.

Этотъ экземпляръ не подходитъ ни подъ одну изъ четырехъ разностей, которыя признаетъ г. Мензбиръ между русскими тетеревятниками (*typicus*, *albidus*, *Schvedowi* и *buteoides*)[1]).

Accipiter nisus (Linn.).

[*Accipiter nisus*, David et Oust., Ois. Chine p. 27.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 132. — Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 41.

Размѣры:

♂ Дл. 355. Разм. 665. Кр. 205. Пл. 58. Хв. 168.
♀ » 430. » 780. » 243. » 67. » 213.

Экземпляры: монаст. У-тай, іюнь; — г. Хой-сянъ, февраль; — дер. Сатани, январь.

Въ южной Гань-су перепелятникъ довольно рѣдокъ.

Nisaetus pennatus (Gm.).

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 253. — Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 41.

Размѣры:

♂ Дл. 510. Разм. 1220. Кр. 368. Пл. 60. Хв. 226.
Радужина рыжевато-бурая; восковица и лапы грязно-желтыя.

Экземпляръ: г. Хой-Сянъ, начало апрѣля.

Нашъ экземпляръ, темно-бурый сверху и снизу, съ болѣе свѣтлыми концами верхнихъ кроющихъ крыла и маховъ 3-го порядка, рыжеватымъ зашейкомъ, бѣловатыми наружными опахалами перьевъ надхвостья и темно-бурымъ (съ болѣе свѣтлыми, неясными поперечными полосками) хвостомъ, очень похожъ на рисунокъ *A. minuta*, Brehm[2]).

---

[1]) Мензбиръ, Орнит. Геогр. Европ. Росс. стр. 438—440.
[2]) Brehm, Vög. Deutschl., pl. 2, fig. 2,

Съ другой стороны, по пластическимъ признакамъ, приводимымъ г. Мензбиромъ для различія *A. minuta* отъ *A. pennata*[1]), онъ долженъ быть отнесенъ къ послѣдней формѣ. Въ виду того, что большинство орнитологовъ не различаютъ этихъ двухъ формъ, мы оставляемъ за нашей птицей названіе *A. pennata*.

Видъ этотъ, распространенный по всей Европѣ и найденный на Цейлонѣ, до сихъ поръ не былъ находимъ въ Китаѣ. Наша птица добыта въ саду г. Хой-сяна, куда была загнана стаей преслѣдовавшихъ ее воронъ.

Aquila chrysaetus (Linn.).

[*Aquila chrysaetus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 7.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 235.—Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 53.

Размѣры:

♀ Дл. 930. Разм. 2200. Кр. 675. Пл. 122. Хв. 300.

Экземпляръ: дер. Сатани, январь.

Общій цвѣтъ нашего экземпляра темно-бурый, почти одинаково темный, какъ на верхней, такъ и на нижней сторонѣ тѣла. Передняя половина верха головы темно-бурая; на зашейкѣ значительная примѣсь рыжаго цвѣта. Основная часть средне-кроющихъ и главныхъ маховъ бѣлая. Опереніе плюсенъ и штаны рыжевато бурые; послѣдніе выдаются за плюсну на длину внутренняго пальца. Хвостъ закругленный, въ основной половинѣ бѣлый. Первая фаланга большаго пальца оперена.

Это краткое описаніе составлено примѣнительно къ діагнозамъ Сѣверцова для всѣхъ возрастовъ *A. chrysaetus*, *A. nobilis*, *A. fulva* и *A. daphanea* [2]), которыхъ онъ считаетъ за самостоятельные виды. Мы не рѣшаемся отнести нашъ экземпляръ ни къ одной изъ этихъ формъ. Замѣтимъ только, что наша птица, соотвѣтствуя большинствомъ признаковъ *A. nobilis*, имѣетъ верхъ головы темно бурый, тогда какъ голова этого вида, по Сѣверцову, во всѣхъ возрастахъ рыжеватая.

Въ лѣсистыхъ горахъ ю.-з. Гань-су беркутъ встрѣчается крайне рѣдко, но я нѣсколько разъ видалъ этихъ птицъ, по десятку вмѣстѣ, по скаламъ ущелья Сигученской рѣки, вплзъ отъ г. Си-гу.

---

[1]) Мензбиръ, Орнит. Геогр. Европ. Россіи, стр. 406—409.—По г. Мензбиру, у *A. minuta* клювъ короче, по сгибу равенъ $^1/_2$ длины плюсны и меньше средняго пальца, равнаго 0,6 длины плюсны; у *A. pennata* клювъ длиннѣе, въ 0,6 длины плюсны, равенъ среднему пальцу, который тоже въ 0,6 длины плюсны. Кромѣ того, хотя у обоихъ видовъ плюсны короче длины головы съ клювомъ (по прямой линіи), но у *A. minuta* онѣ сравнительно длиннѣе, чѣмъ у *A. pennata*. — У нашего экземпляра длина клюва по сгибу (гибкой тесьмой), отъ лба до конца клюва — 38 мм.; та же длина по прямой линіи (циркулемъ) — 36 мм.; длина головы съ клювомъ (по прямой линіи отъ затылочной кости до конца клюва) — 73 мм.; средній палецъ безъ когтя (отъ сочлененія съ плюсной до начала когтя) — 41 мм. По большой длинѣ клюва нашъ экземпляръ — *A. pennata*, что же касается до меньшей длины плюсенъ сравнительно съ головой этого вида, намъ неизвѣстно насколько она должна быть меньше, чѣмъ у *A. pennata*.

[2]) Sewertzow, Nouv. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, Tome XV, pp. 147—195 (1888).

Archibuteo strophiatus (Hodgs.).

[*Archibuteo strophiatus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 20. pl. 7.]

Archibuteo strophiatus: Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 199 (partim). — David et Oust., Ois. Chine, p. 20, pl. 7.

Archibuteo hemiptilopus: Hume, Str. Feath., IV, p. 369 — 370 (partim: ♀ ex Tibet). — Gurney, Ibis 1879, p. 178; Id., List Diurn. B. of Prey, p. 61 (partim)

Размѣры:

♀ (?) Дл. 680. Разм. 1540. Кр. 444. Кл. отъ воск. 27,5. Пл. 85. Хв. 278 (a)
? » — » — » 488. » » » 27. » 86. » 300 (b)

Экземпляры: (a), Шабаръ-чайдамъ (В. Ордосъ), сентябрь;—(b), рѣка Таншту въ Нань-шанѣ, май.

Оба наши экземпляра очень похожи на птицу, изображенную у David et Oustalet, l. c., отличаясь немного большей рыжеватостью нижней стороны тѣла. Вотъ ихъ краткое описаніе:

Экземпляръ (a) въ очень свѣжемъ оперенiи. Сверху шеколадно-бурый съ ярко рыжими каймами перьевъ надглазной области, зашейка, межлопаточной области, плечевыхъ, малыхъ кроющихъ крыла и надхвостья. Кроющія главныхъ маховъ съ рѣзко ограниченными рыжевато-бѣлыми конечными каймами; подобныя же, но менѣе рѣзкія, каймы и на внутреннихъ махахъ втораго порядка; на остальныхъ же изъ послѣднихъ и на главныхъ махахъ лишь неясная бѣлизна на концахъ. Самые длинные махи 2-го порядка въ конечной части одноцвѣтные, темно-бурые, и болѣе свѣтлыхъ поперечныхъ полосъ на нихъ почти не замѣтно. Нижняя сторона тѣла по цвѣторасположенію совершенно какъ у птицы, изображенной у David et Oustalet, но бѣлый цвѣтъ съ рыжеватымъ оттѣнкомъ, болѣе рѣзкимъ на верхней части груди. Подмышечныя свѣтло ржаво-рыжія съ неправильными бурыми пятнами. Средніе рули темно-бурые съ рѣзкой рыжевато-бѣлой конечной каймой въ 10 мм. ширины и съ расплывчатыми сѣроватыми поперечными полосами, не доходящими до краевъ рулей. Боковые рули свѣтлѣе и полосы на нихъ рѣзче. Въ крылѣ 4-й махъ самый длинный, 5-й на 3, 7-й на 38, 6-й на 61 и 1-й на 120 мм. короче 4-го. Махи 2-го порядка длиннѣе 1-го маха на 35 мм.

Экземпляръ (b) въ обношенномъ перѣ. Сверху похожъ на экз. (a), но имѣетъ рыжія каймы только на зашейкѣ, межплечевыхъ и надхвостьѣ и, притомъ, блѣдиѣе цвѣтомъ. Зато на зашейкѣ каймы эти очень широки, занимаютъ болѣе половины каждаго пера и образуютъ сплошной свѣтло-рыжій полуошейникъ. Рѣзкихъ свѣтлыхъ каймъ на кроющихъ главныхъ маховъ, какъ у экз. (a)—нѣтъ. Конечная часть длинныхъ маховъ 2-го порядка съ довольно рѣзкими волнистыми сѣрыми поперечными полосами. Рыжій цвѣтъ груди еще рѣзче, чѣмъ у экз. (a), но остальная часть нижней стороны тѣла совершенно такого же цвѣта, какъ на рисункѣ David et Oustalet. Подмышечныя, какъ у экз. (a). Средніе рули свѣтлѣе, чѣмъ у послѣдняго и безъ рѣзкой свѣтлой конечной каймы,—концы рулей постепенно становятся рыжеватыми. Поперечныя полосы на рулях рѣзки и черезъ все перо, но не прямыя: полосы одного опахала схо-

дятся съ полосами другаго подъ угломъ, вершина котораго обращена къ концамъ рулей. Въ крылѣ 4-й махъ самый длинный, 5-й на 5, 3-й на 7, 2-й на 41, 6-й на 58, 1-й на 125 мм. короче. Махи 2-го порядка длиннѣе 1-го маха на 35 мм.

У обоихъ экземпляровъ восковица и лапы желтыя. Плюсны съ задней стороны (acrotarsium) покрыты въ самой нижней части крупными щитками, въ верхней — сѣтчатыя. Характеръ щитковъ у одной и той же птицы на разныхъ ногахъ не одинаковъ: на одной 2—4 правильныхъ щитка (по одному въ рядъ), затѣмъ крупные, но не правильные (по 2, по 3 въ рядъ); на другой же ногѣ правильныхъ щитковъ совсѣмъ нѣтъ.

Мы относимъ вышеописанные экземпляры къ виду *A. strophiatus*, считая этотъ видъ за совершенно самостоятельный и отличный отъ *A. hemiptilopus*, Blyth. Основанія для такого мнѣнія слѣдующія.

Кромѣ двухъ экземпляровъ изъ Ордоса и Нань-шаня, у насъ есть два другихъ изъ южной Гань-су. Птицы изъ той и другой мѣстности въ общемъ довольно схожи, но различаются длиной маховъ втораго порядка, характеромъ покрововъ задней стороны плюсенъ, оттѣнкомъ бураго цвѣта оперенія и цвѣтомъ головы. У птицъ изъ Ордоса и Нань-шаня голова темно-бурая, одноцвѣтная съ остальнымъ верхомъ тѣла; у южно-ганьсуйскихъ — бѣловатая, въ рѣзкомъ контрастѣ съ цвѣтомъ остальнаго верха тѣла. Это послѣднее различіе настолько рѣзко, что мы придаемъ ему видовое значеніе. Дѣлаемъ это съ тѣмъ большей увѣренностью, что, просмотрѣвъ литературныя данныя, мы убѣдились, что всѣ извѣстные и описанные экземпляры южно-палеарктическихъ *Archibuteo*, при разнообразіи ихъ окраски, могутъ быть, однако, раздѣлены на двѣ группы: темноголовыхъ и свѣтлоголовыхъ. Первыхъ мы считаемъ за *A. strophiatus*, Hodgs., вторыхъ за *A. hemiptilopus*, Blyth.

Кромѣ типичнаго экземпляра Hodgson'a, птицы David'a, изображенной въ «Oiseaux de la Chine» и нашихъ экземпляровъ изъ Ордоса, Нань-шаня и с.-з. Монголіи [1]), мы относимъ къ виду *A. strophiatus*—экземпляръ порвичскаго музея (происходящій вѣроятно изъ Тибета), описанный г. Gurney'емъ, и одинъ изъ двухъ тибетскихъ экземпляровъ (предполагаемую самку) г. Hume'a [2]). Обѣ птицы, отнесенныя авторами къ виду

---

[1]) Экземпляръ *A. strophiatus* (♀) добытъ мной 31 марта 1877 г. близъ озера Дурга-норъ въ с.—з. Монголіи и хранится въ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ. Этотъ экземпляръ подобенъ типу Hodgson'a (Cat. B. Brit. Mus., I, pl. 7, fig. 2), но одноцвѣтно бурый, безъ бѣлаго пятна на груди. Размѣры его: кр. 481. пл. 82. хв. 275.—Махи 3-й, 4-й и 5-й почти равны и самые длинные; 2-й махъ на 32, 6-й на 57, 7-й на 88, 1-й на 119 мм. короче. Самые длинные махи 2-го порядка на сложенномъ крылѣ слегка длиннѣе 1-го маха. Хвостъ совершенно такой же, какъ на рисункѣ каталога Британскаго Музея, т. е. сѣро-бурый; средніе рули съ широкой черной конечной каймой и неправильными поперечными полосами, сходящимися въ серединѣ руля подъ угломъ. Узоръ хвоста у всѣхъ *Archibuteo* очень измѣнчивъ и такое полное совпаденіе его у нашей птицы и экземпляра Hodgson'a дѣлаетъ ихъ видовое тождество несомнѣннымъ. Птица эта имѣла въ яйцеводѣ вполнѣ развитое яйцо и добыта близъ гнѣзда, въ которомъ яицъ однако еще не было. Гнѣздо помѣщалось въ разщелинѣ скалы не высоко надъ землей. На гнѣздѣ препараторомъ Сѣверцова, г. Коломейцевымъ, убитъ и самецъ. Послѣдній былъ также одноцвѣтно-бурый и отличался отъ самки только немного болѣе темной окраской и меньшимъ ростомъ.

[2]) Относительно другаго тибетскаго экз. г. Hume'a—предполагаемаго самца—мы находимся въ сомнѣніи. Дѣло въ томъ, что это—единственная, изъ извѣстныхъ по описаніямъ, вполнѣ меланистическая

A. hemiptilopus, имѣютъ темную голову, тогда какъ у типичнаго экземпляра этого вида, по описанію Blyth'a,—«head mingled whitisch and brown».

A. strophiatus встрѣченъ въ довольно большомъ количествѣ въ ю.-в. Ордосѣ, въ урочищѣ Шабпръ-чайдамъ. Мѣстность эта почти сплошь покрыта песчаными барханами, въ промежуткахъ между которыми повсюду маленькія озерки и довольно порядочная растительность. Въ кустарныхъ зарослях обиліе зайцевъ, а по степнымъ увалам — мелкихъ грызуновъ. Въ южной Гань-су я этого сарыча не видалъ.

Archibuteo hemiptilopus. Blyth.

Archibuteo hemiptilopus: Blyth, Journ. As. Soc. Beng., XV, p. 1 (1846.).—Hume, Str. Feath., IV, p. 359 (1876, part.).—Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 61 (1884, part.).

Archibuteo cryptogenys: Hodgson, Calc. Journ. Nat. Hist., VIII, p. 94, pl. 3, fig. 1 (1847, fide Hume, Str. Feath., I, p. 316).—Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 61.

Archibuteo leucoptera: Hume, Str. Feath., I, p. 318 (1873).

Archibuteo strophiatus: Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 199 (1879, part.).

Размѣры:

♀ Дл. 645. Разм. 1565. Кр. 461. Кл. отъ воск. 28. Пл. 82. Хв. 280. (a)
♀?[1]) » 590. » 1430. » 432. » » 25. » 81. » 255. (b)

Экземпляры: (a), г. Хой-слинъ, декабрь;—(b), дер. Сатани, декабрь.

Вотъ описаніе нашихъ птицъ:

Экз. (a). *Уздечки* (lores) грязно-бѣлыя, покрывающія ихъ щетинообразныя перья также бѣлыя около лба и поздрей, черныя въ остальной части. *Середина верха головы* свѣтло рыжевато-бурая [2]), блѣднѣе ко лбу, темнѣе на затылкѣ,—всѣ перья съ бѣловатыми оторочками. *Надглазная область, щеки, ушныя перья* и *бока шеи* сливочно бѣлые [3]),—большинство перьевъ съ рыжевато-бурыми узкими наствольными полосками. *Зашеекъ* (cervix) вблизи затылка также сливочно-бѣлый, съ рыжевато-бурыми наствольными полосками, только послѣднія шире и ярче, къ спинѣ же — ярко бурый [4]) съ свѣтло-рыжими [5]) каймами по краямъ перьевъ; бурая конечная часть перьевъ отдѣлена отъ бѣлой основной также промежуткомъ свѣтло-рыжаго цвѣта. *Межплечья* — какъ низъ зашейка, но рыжія каймы шире и на внутреннемъ опахалѣ нѣкоторыхъ перьевъ совершенно вытѣсняютъ бурый цвѣтъ. *Спина* одноцвѣтная темно-бурая [6]).

особь. Въ литературѣ неизвѣстно другой аналогично темно окрашенной, но имѣющей бѣловатую голову, птицы, противопоставленіе которой экземпляру г. Hume'a, дало бы право отнести послѣдній къ *A. strophiatus.* Нѣтъ ничего невѣроятнаго при томъ, что въ меланистической стадіи различіе въ цвѣтѣ головы *A. strophiatus* и *A. hemiptilopus* можетъ совершенно изчезнуть.

[1]) Полъ опредѣлялся всегда вскрытіемъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда опредѣленіе противорѣчило другимъ признакамъ, я провѣрялъ его и дѣлалъ отмѣтку въ книжкѣ, что опредѣленіе пола вѣрно. Къ сожалѣнію, въ данномъ случаѣ такой отмѣтки нѣтъ. Слишкомъ малъ этотъ экземпляръ для самки.

[2]) Wood brown, Ridgway, Nomencl. Colors, pl. III, n° 19.

[3]) Cream white, ibid., pl. VI, n° 20.

[4]) Prout's brown, ibid., pl. III, n° 11.

[5]) Ochraceus buff, ibid., pl. V, n° 10.

[6]) Sepia, ibid., pl. III, n° 3.

Надхвостье и *верхнія кроющія хвоста* слегка свѣтлѣе спины; первые съ неяснымі рыжими оторочками на концахъ перьевъ, вторые—съ бѣловатыми или свѣтло рыжими конечными каймами и такого же цвѣта неправильными поперечными полосами и пятнами. *Средніе рули* рыжевато-бурые къ краямъ, свѣтло-рыжіе къ концу, бѣловатые въ серединѣ вдоль стержней,—покрыты темно-бурыми поперечными полосами, сходящимися въ серединѣ рулей подъ угломъ, вершина котораго обращена къ концу рулей. Только въ конечной половинѣ рулей полосы болѣе правильны (3 — 4), выше же прерывисты и не доходятъ до краевъ. *Боковые рули* подобны среднимъ, только свѣтлѣе. *Стержни рулей* бѣлые, около самаго конца — темные. *Плечевыя* свѣтло-бурыя [1]) съ рыжеватыми каймами по краямъ, нѣкоторыя перья съ неправильными рыжеватыми пятнами по наружному опахалу. *Большія и среднія кроющія крыла* свѣтло-бурыя, по краямъ свѣтлѣе. *Кроющія маховъ перваго порядка* темно рыжевато-бурыя [2]) съ рѣзкими бѣлыми конечными каймами. *Малыя кроющія крыла* свѣтло-бурыя, съ темными стержнями и рыжеватыми каймами. *Сгибъ крыла* сливочно-бѣлый; нѣкоторыя перья съ яркими рыжевато-бурыми наствольными полосками. *Нижнія кроющія крыла*: малыя—рыжевато-бѣлыя съ бурыми наствольными полосками, среднія—сѣро-бурыя съ неправильными поперечными полосками и пятнами бѣлаго цвѣта; кроющія главныхъ маховъ—черновато-сѣрыя, у основанія бѣлыя. *Подмышечныя* бѣлыя съ темно-сѣрыми неправильными пятнами на концахъ и такого же цвѣта стержнями перьевъ. *Наружное опахало перваго маха* на нѣсколько миллиметровъ отъ основанія бѣлое, ниже сѣрое [3]), темнѣе къ концу. *Наружныя опахала 2-го, 3-го, 4-го и 5-го маховъ* въ верхней (основной) половинѣ широкой части—чисто бѣлыя, въ нижней—свѣтло-рыжевато-бурыя въ серединѣ вдоль опахала, грязно-бѣлыя по краямъ и близъ стержней; съуженныя части опахалъ, какъ у перваго маха,—сѣрыя. *Внутреннія опахала первыхъ пяти маховъ* чисто бѣлыя въ широкой основной части и рыжевато-черныя въ узкой конечной. *Остальные махи перваго порядка* бѣлые въ основной и рыжевато-бурые въ конечной части,—покрыты темно-бурыми поперечными полосами, которыя расплывчаты на болѣе темномъ наружномъ опахалѣ и рѣзки на болѣе свѣтломъ внутреннемъ. *Махи 2-го и 3-го порядковъ* у основанія бѣлые, въ большей же части длины бурые, съ слабо замѣтными болѣе свѣтлыми поперечными полосками, которыя на внутреннихъ опахалахъ рѣзче и сѣроваты; концы самыхъ длинныхъ маховъ 2-го порядка и концы маховъ 3-го порядка дюйма на два совершенно одноцвѣтно-бурые. Самые короткіе махи 2-го порядка имѣютъ на концахъ нерѣзкія бѣловатыя каймы, которыя постепенно изчезаютъ на болѣе внутреннихъ махахъ. *Подбородокъ, передъ шеи и нижняя часть груди* сливочно-бѣлые. По бокамъ шеи отъ основаній нижней челюсти узкіе рыжевато-бурые *усы*. *Бока верхней части груди и верхняя часть боковъ тыла* — ярко бурые. *Штаны* и *опереніе плюсенъ*—темно-бурые, первые съ неяснымі рыжеватыми

---

[1]) Brocolli brown, Ridgway, Nomencl. Colors pl. III, n° 15.
[2]) Mummy brown, ibid., pl. III, n° 13.
[3]) Mouse grey, ibid., pl. II, n° 11.

поперечными полосками, второе съ такого же цвѣта конечными оторочками перьевъ. *Середина живота, подхвостье, нижнія кроющія хвоста* и *нижняя часть боковъ тѣла* — рыжевато-бѣлыя [1]). *Клювъ* черный. *Восковица* синеватая. *Лапы* грязно-желтыя.

Штаны длинны, достигаютъ до сгибовъ пальцевъ, но не густы. Плюсны спереди густо оперены до сгибовъ пальцевъ. Задняя сторона плюсенъ, болѣе чѣмъ на половину длины снизу, покрыта правильными щитками (10) по одному въ рядъ, выше—сѣтчатая. Первые четыре маха съ рѣзкой выемкой на внутреннемъ опахалѣ ниже середины его длины, внизъ отъ которой махи гораздо уже; 2-й—5-й махи съ середины длины по наружному опахалу съужены; 4-й махъ самый длинный, 3-й обломанъ, 5-й на 12, 2-й на 21, 6-й на 62, 1-й на 95 мм. короче 4-го. Самые длинные махи 2-го порядка на сложенномъ крылѣ одинаковой длины съ первымъ махомъ.

Экз. (b). Цвѣтомъ и цвѣторасположеніемъ очень похожъ на вышеописанный, только имѣетъ передъ головы свѣтлѣе, почти бѣлый, затылокъ же немного ярче. Полосы на хвостѣ правильнѣе и идутъ поперекъ, а не сходятся подъ угломъ, какъ у экз. (a). Концы рулей съ довольно рѣзкой конечной каймой грязно-рыжеватаго цвѣта въ 10 мм. ширины. Восковица и лапы грязно-желтыя. Штаны такой же длины какъ у экз. (a), но еще менѣе густы. Лѣвая плюсна спереди оперена до пальцевъ, но оперепіе менѣе густо, чѣмъ у экз. (a). Правая плюсна съ внѣшней стороны частью голая (обтерта?). Задняя сторона плюсенъ какъ у экз. (a). 4-й махъ самый длинный, 3-й на 4, 5-й на 6, 2-й на 36, 6-й на 58, 1-й на 114 мм. короче 4-го. Самые длинные махи 2-го порядка на сложенномъ крылѣ одинаковой длины съ первымъ махомъ.

Говоря объ *A. strophiatus*, мы уже сказали, что имѣемъ въ нашей коллекціи четыре экземпляра *Archibuteo*, изъ которыхъ два настолько отличаются отъ двухъ другихъ, что мы принуждены признать ихъ принадлежащими къ двумъ различнымъ видамъ. Экземпляры изъ Ордоса и Пань-шаня, совершенно сходные съ птицей изображенной въ «Oiseaux de la Chine», мы вмѣстѣ съ гг. David и Oustalet отнесли къ виду *A. strophiatus*, Hodgs.; экземпляры же изъ южной Гань-су, только что описанные, принимаемъ за *A. hemiptilopus*, Blyth. Первымъ толчкомъ для послѣдняго отожествленія послужило большое сходство, судя по описанію, нашихъ экземпляровъ съ *A. leucoptera*, Hume, котораго самъ авторъ признаетъ впослѣдствіи за блѣдную «стадію» *A. hemiptilopus*.

Признавая *A. strophiatus* и *A. hemiptilopus* за самостоятельные виды, мы расходимся съ гг. Sharpe'омъ, Hume'омъ, и Gurney'емъ, которые считаютъ ихъ синонимами, фазами оперенія одного и того же вида. Гг. Sharpe и Hume признаютъ при этомъ существованіе лишь одного вида южно-палеарктическаго *Archibuteo*, г. же Gurney—двухъ, но второй *(A. cryptogenys)* онъ считаетъ сомнительнымъ и приводитъ со

[1]) Cream buff, Ridgway, Nomencl. Colors pl. V, nº 11.

знакомъ вопроса. Считаемъ поэтому не лишнимъ мотивировать нашъ взглядъ подробнѣе.

Различіе нашихъ экземпляровъ сводится къ слѣдующему:

Экземпляры изъ Ордоса и Нань-шаня. *(A. strophiatus).*	Экземпляры изъ ю. Гань-су. *(A. hemiptilopus).*
Голова одноцвѣтна съ верхомъ тѣла.	Голова гораздо свѣтлѣе верха тѣла.
Бурый цвѣтъ въ опереніи вездѣ темнѣе.	Бурый цвѣтъ вездѣ въ опереніи свѣтлѣе.
Самые длинные махи втораго порядка на сложенномъ крылѣ длиннѣе перваго маха.	Самые длинные махи втораго порядка на сложенномъ крылѣ одинаковой длины съ первымъ махомъ.
Задняя сторона плюсенъ только въ самой нижней части покрыта нѣсколькими (3—4) правильными щитками по одному въ рядъ, выше же щитки неправильны, расположены по нѣскольку въ рядъ и постепенно, съ половины длины плюсны, переходятъ въ сѣтку.	Вся нижняя половина задней стороны плюсенъ покрыта правильными крупными щитками, расположенными по одному въ рядъ (10 ряд. и больше); верхняя половина сѣтчатая.

Тѣ и другія птицы въ общемъ довольно схожи, въ особенности при первомъ взглядѣ и, если разсматривать ихъ съ нижней стороны. Рѣзкой разницы въ цвѣтѣ нѣтъ и всѣ они имѣютъ очень свѣтлую грудь и животъ. Различіе бросается въ глаза только, когда смотрѣть сверху. У наньшаньскаго и ордосскаго экземпляровъ верхъ и бока головы почти одноцвѣтно бурые, такого же цвѣта, какъ и верхъ тѣла; у южно-ганьсуйскихъ бока головы, надглазная область и лобъ бѣловаты, темя очень свѣтло-бурое и въ общемъ голова свѣтла, гораздо свѣтлѣе остальнаго верха тѣла.

Кромѣ цвѣта головы птицы различаются также, хотя не рѣзко, оттѣнками бураго цвѣта. У наньшаньской и ордосской бурый цвѣтъ вездѣ въ опереніи темнѣе, у ганьсуйскихъ — свѣтлѣе. Это различіе не объяснимо выцвѣтаніемъ. Бурый цвѣтъ наньшаньскаго и ордосскаго экземпляровъ совершенно одинаковъ, не смотря на то, что одинъ изъ нихъ осенній, въ совершенно свѣжемъ перѣ, другой же весенній и сильно отрепанъ. Мы останавливаемся на этомъ собственно незначительномъ различіи въ цвѣтѣ потому, что свѣтлая окраска южно-ганьсуйскихъ птицъ получаетъ особое значеніе при сравненіи ихъ съ *Buteo leucocephalus*, о чемъ скажемъ ниже.

Различію въ цвѣтѣ головы мы придаемъ видовое значеніе. Но возможно ли это сдѣлать въ виду того, что всѣ извѣстные экземпляры южно-палеарктическаго *Archibuteo* представляютъ такое разнообразіе окраски, что цвѣтовые признаки самыми компетентными орнитологами считаются не заслуживающими никакого значенія въ смыслѣ разграниченія видовъ?[1]) Въ чемъ же состоитъ это разнообразіе окраски?

Г. Hume, на основаніи своей многочисленной коллекціи *B. ferox*, различаетъ 5

[1]) «Coloration goes absolutely for nothing in these birds,..» Hume, Str. Feath., IV, p. 272, footn.

типовъ или какъ онъ называетъ «стадій оперенія» этого вида. Резюмируя характеристики «стадій» г. Hume'a [1]), оказывается, что измѣненіе окраски состоитъ въ послѣдовательномъ большемъ и большемъ распространеніи бураго цвѣта на нижней сторонѣ тѣла насчетъ бѣлаго или рыжеватаго, до полнаго вытѣсненія свѣтлыхъ цвѣтовъ въ 4-й стадіи, причемъ позже всего они изчезаютъ съ груди. Въ 5-й, меланистической стадіи измѣняется и бурый цвѣтъ, становясь черноватымъ.

Совершенно аналогичныя варіаціи окраски въ предѣлахъ одного и того же вида г. Hume и другіе авторы констатируютъ у всѣхъ южно-палеарктическихъ видовъ *Buteo*, а также и *Archibuteo*. Вслѣдствіе этого всѣ извѣстные экземпляры послѣдняго рода г. Hume относитъ къ одному и тому же виду *A. hemiptilopus*, а описанаго имъ раньше *A. leucoptera* считаетъ за первую, блѣдную «стадію оперенія» этого вида.

Общность типовъ цвѣтовой измѣнчивости у всѣхъ видовъ южно-палеарктическихъ *Buteo* и *Archibuteo* очень замѣчательна, указывая на общую для всѣхъ видовъ причину этой измѣнчивости, но самая причина до сихъ поръ совершенно невыяснена. Г. Hume склоненъ придавать «стадіямъ оперенія» значеніе возрастныхъ фазъ, но это не совсѣмъ вяжется съ тѣмъ фактомъ, что нѣкоторые типы оперенія встрѣчаются чаще въ одиѣхъ мѣстностяхъ, чѣмъ въ другихъ, а въ иныхъ и совсѣмъ неизвѣстны.

Какъ бы однако не смотрѣть на «стадіи оперенія», считать ли ихъ за возрастныя фазы, или за общіе типы измѣнчивости не вполнѣ установившихся видовъ, связанныхъ общимъ происхожденіемъ, или же допускать совокупное дѣйствіе обѣихъ причинъ,—во всякомъ случаѣ то разнообразіе окраски, которое представляютъ всѣ извѣстные намъ по описаніямъ экземпляры южно-палеарктическихъ Archibuteo, не вполнѣ объяснимо «стадіями оперенія» и даже имъ противорѣчитъ, если всѣхъ ихъ считать принадлежащими къ одному и тому же виду. Просмотрѣвъ описаніе экземпляровъ, мы убѣдились, что всѣхъ ихъ можно по цвѣту головы раздѣлить на двѣ группы—темноголовыхъ и свѣтлоголовыхъ, причемъ цвѣтъ головы не стоитъ, повидимому, ни въ какой связи съ общей окраской. Въ той и другой группѣ есть какъ очень темно окрашенныя птицы, такъ и очень свѣтлыя. Эти противорѣчія изчезаютъ, если цвѣту головы придать видовое значеніе и принять, что мы имѣемъ дѣло не только со «стадіями оперенія» одного вида, а со стадіями двухъ различныхъ видовъ,—одного темноголоваго, другаго свѣтлоголоваго. Всѣ извѣстные экземпляры располагаются тогда въ два параллельныхъ ряда, изъ которыхъ каждый вполнѣ соотвѣтствуетъ «стадіямъ». Съ одной стороны темноголовый рядъ *A. strophiatus*, къ которому мы относимъ (располагая отъ болѣе свѣтлыхъ къ болѣе темнымъ): типъ рисунка «Oiseaux de la Chine»; наши ордосскій и наньшаньскій экземпляры; экземпляръ порвичскаго музея, описанный г. Gurney'емъ; тибетскій экземпляръ (♀) г. Hume'a; типъ *A. strophiatus*, Hodgs., и экземпляръ Музея Императорской Академіи Наукъ, о которомъ мы упоминали (стр. 33, прим.). Съ другой стороны—свѣтлоголовый рядъ *A. hemiptilopus*, къ которому мы относимъ: наши два южно-гань-

[1]) Str. Feath., IV, p. 363.

суйскіе экземпляра; *A. leucoptera*, Hume; типъ *A. hemiptilopus*, Blyth, и типъ *A. cryptogenys*, Hodgs. Мы не опредѣлили только мѣсто другаго тибетскаго экземпляра (♂) г. Hume'a, такъ какъ птица эта по своей исключительно темной окраскѣ внѣ аналогій, и мы допускаемъ возможность, что въ подобной «меланистической стадіи» различіе въ цвѣтѣ головы между двумя видами можетъ совершенно изчезнуть.

Нашъ взглядъ на значеніе цвѣта головы какъ видоваго признака, постояннаго для всѣхъ «стадій оперенія», косвеннымъ путемъ подтверждается примѣромъ *B. leucocephalus*. Очень темная особь этого вида, изображенная въ Каталогѣ Британскаго Музея подъ именемъ *B. ferox*[1]), и типъ *A. strophiatus*, Hodgs., изображенный тамъ же [2]), по «стадіи оперенія» совершенно соотвѣтствуютъ другъ другу. Обѣ птицы почти одноцвѣтно бурыя, только съ небольшой примѣсью бѣлаго цвѣта на груди. Сходныя по общей окраскѣ, онѣ различаются цвѣтомъ головы,—бѣлой у *B. leucocephalus* и темной у *A. strophiatus*. Точно также цвѣтомъ головы различаются и свѣтлыя «стадіи оперенія» этихъ видовъ, какъ, съ одной стороны, B. hemilasius [3]), котораго большинство авторовъ относитъ къ *B. leucocephalus*, такъ съ другой стороны, типъ рисунка «Oiseaux de la Chine» (*A. strophiatus*) и наши два экземпляра *A. strophiatus* изъ Ордоса и Нань-шанія.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о пластическихъ особенностяхъ нашихъ птицъ.

Какъ видно изъ приведенной таблички, наши экземпляры *A. hemiptilopus* и *A. strophiatus* различаются также формой крыла и характеромъ покрововъ задней стороны плюсенъ. Къ сожалѣнію, въ этомъ отношеніи данныхъ въ литературѣ мало: о формѣ крыла—никакихъ, а о характерѣ покрововъ acropodia только относительно тѣхъ экземпляровъ, которыхъ мы принимаемъ за *A. hemiptilopus*. У типа *A. hemiptilopus*, Blyth,—«acropodia scutated»; у *A. cryptogenys*, Hodgs.,—«acropodia, half scutellate, nearly»; у *A. leucoptera*, Hume,—«acropodia covered with broad transverse plate». Т. е., какъ видно изъ таблички, характеръ покрововъ acropodia всѣхъ этихъ птицъ совершенно такой же, какъ у нашихъ экземпляровъ *A. hemiptilopus*.

Мы не склонны преувеличивать значеніе обоихъ этихъ признаковъ и формы крыла, и характера покрововъ acropodia, признаковъ вѣроятно измѣнчивыхъ, но они получаютъ совершенно особое освѣщеніе при сравненіи *A. strophiatus* и *A. hemiptilopus* съ *B. leucocephalus* (*hemilasius*); при этомъ получаетъ значеніе и болѣе блѣдный оттѣнокъ бураго цвѣта нашихъ южно-ганьсуйскихъ экземпляровъ, о которомъ мы упомянули выше (стр. 37).

Мы имѣли въ рукахъ четыре экземпляра *B. leucocephalus* (*hemilasius*), Музея Императорской Академіи Наукъ, изъ которыхъ три сбора г. Padde въ Дауріи, а одинъ экземпляръ Пржевальскаго изъ восточной Монголіи. Всѣ эти 4 экземпляра и наши два *A. hemiptilopus* изъ ю. Ганьсу, настолько похожи другъ на друга по общей

---

[1]) Cat. B. Brit. Mus., I, pl. VII; cf, Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 135

[2]) Cat. B. Brit. Mus., I, pl. VI, fig. 2.

[3]) Temm. et Schl., Faun. Jap., Aves pl. VIII.

окраскѣ, что ихъ возможно различить только по оперенію плюсенъ. Но и тутъ различіе не рѣзко. Одинъ изъ нашихъ *A. hemiptilopus* имѣетъ плюсны менѣе густо оперенныя, чѣмъ другой, а на одной ногѣ часть плюсны спереди даже голую. По этой ногѣ его можно принять за *B. leucocephalus* съ ненормально-сильно оперенной плюсной. Съ другой стороны, у двухъ экземпляровъ послѣдняго вида оперепіе плюсенъ спереди узкой полоской спускается внизъ и не доходитъ до сгибовъ пальцевъ лишь на 10 — 12 мм. По формѣ крыла и характеру покрововъ acropodia—также есть переходы. Изъ трехъ экземпляровъ *B. leucocephalus* (у 4-го крылья попорчены), у двухъ—махи втораго порядка на сложенномъ крылѣ короче перваго маха, у третьяго же одинаковой съ нимъ длины, какъ у нашихъ *A. hemiptilopus*. Acropodia у одного экземпляра *B. leucocephalus* совершенно такія же, какъ у нашихъ *A. hemiptilopus*, у трехъ же другихъ—совершенно какъ у нашихъ *A. strophiatus*.

Такое сходство *A. hemiptilopus* съ *B. leucocephalus*, видовъ различающихся, очевидно, даже не вполнѣ установившимися признаками, дѣлаетъ отнесеніе ихъ къ двумъ различнымъ родамъ неестественнымъ и подтверждаетъ правильность взгляда Gray'я, соединявшаго всѣхъ крупныхъ южно-палеарктическихъ *Buteo* и *Archibuteo* въ особую подродовую группу *Butaquila*.

Изъ нашихъ двухъ экземпляровъ *A. hemiptilopus* одинъ добытъ въ саду около г. Хой-сяна, другой купленъ въ дер. Сатани, Сигучепскаго округа, и, вѣроятно, принесенъ съ нижняго теченія рѣки, на которой стоитъ эта деревня. Самъ я въ этихъ мѣстахъ этого сарыча ни разу не наблюдалъ.

Buteo plumipes (Hodgs.).

[*Buteo japonicus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 19.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 180.—Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 63.—Temm. et Schl., Fauna Jap., Aves pl. VI (*Buteo japonicus*).

Размѣры:

? juv. Кр. 265 (махи не отросли). Пл. 71.

Верхняя половина передней стороны плюсенъ оперена, опереніе спускается узкой полоской внизъ и не доходитъ до сгибовъ пальцевъ на 27 мм.; неоперенная часть покрыта вверху крупными неправильными щитками, которые къ низу становятся мельче и къ пальцамъ образуютъ грубую сѣтку. Задняя сторона плюсенъ въ нижней половинѣ одѣта правильными щитками по одному въ рядъ (9—10 рядовъ), въ верхней сѣтчатая.

Экземпляръ: дер. Іо-дзамъ-пу, 8 іюля.

Нашъ экземпляръ совершенно молодая птица, у которой махи и хвостъ растутъ, а на подбородкѣ еще сохранился пухъ. Птица убита на землѣ и хотя перелетала, но плохо, такъ что, вѣроятно, вывалилась изъ гнѣзда.

Сверху нашъ экземпляръ темно-бурый съ рыжими краями перьевъ головы и межплечевой области; снизу свѣтло-ржаво-рыжій съ рыжевато-бурыми боками и уже обозначившимися по бокамъ шеи темными усами. Хвостъ темно рыжевато-бурый

съ буро-сѣрыми неясными поперечными полосами и рыжими маленькими и не рѣзкими пятнышками на концахъ рулей.

По общему цвѣту нижней стороны тѣла и цвѣторасположенію наша птица, несмотря на молодость, замѣчательно похожа на изображенную въ «Fauna Japonica». Сходство таково, что не оставляетъ сомнѣнія въ принадлежности обѣихъ птицъ къ одному и тому же виду. Сходство это интересно въ томъ отношеніи, что Temminck и Schlegel считаютъ свою птицу за совершенно взрослую, другую же, гораздо болѣе блѣдную, изображенную въ «Fauna Japonica» на pl. VI B,—за молодую самку. Изъ сопоставленія этого, какъ бы выходитъ (если не объяснять различія въ цвѣтѣ поломъ) что свѣтлыя птицы съ возрастомъ становятся рыжими. Нашъ экземпляръ противорѣчитъ такому предположенію. Мы склонны думать, что различія въ цвѣтѣ *B. plumipes*, встрѣчающіяся, какъ между японскими, такъ и между гималайскими птицами, не объяснимы возрастомъ,—хотя послѣдній, вѣроятно, и играетъ роль въ деталяхъ окраски,—а что нѣкоторыя изъ нихъ можно признать за типы измѣнчивости неустановившагося вида.

B. plumipes единственный дневной хищникъ, котораго я нашелъ гнѣздующимъ въ лѣсистомъ ущельѣ р. Іо-дзамъ-ну за три лѣтнихъ мѣсяца охоты. Двухъ стариковъ, очевидно родителей нашей птицы, я ежедневно видѣлъ кружащимися высоко въ воздухѣ, но добыть, не смотря на всѣ старанія, никакъ не могъ.

Milvus melanotis, Temm. et Schl.

[*Milvus melanotis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 16.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 324. — Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 80.—Temm. et Schl., Fauna Jap., Aves, pl. V.

Размѣры:

Кр. 472. Пл. 55. Хв. 327.

Экземпляръ: Гань-су.

Этотъ коршунъ весьма обыкновенепъ внутри деревень и городовъ по всей Гань-су. Болѣе обиленъ въ мѣстностяхъ открытыхъ съ равнинпымъ характеромъ и сравнительно рѣдокъ въ горпстыхъ и, особенно, въ очень лѣсистыхъ.

Tinnunculus japonicus (Temm. et Schl.).

[*Falco tinnunculus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 36.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 428.—Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 97.—Seebohm, Hist. Brit. B., I, p. 46.

Размѣры:

♂ Дл. 360. Разм. 730. Кр. 233. Пл. 43. Хв. 163.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, мартъ, апрѣль.

Въ Хойсянскомъ округѣ, гдѣ я провелъ зиму 1884—85 г., первая пустельга встрѣчена 5 марта и, въ продолженіи всего этого мѣсяца, я видѣлъ ее всего раза три или четыре.

Erythropus amurensis (Radde).

[*Falco amurensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 34.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 445.—Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 101.

Размѣры:

♂ Дл. 315. Разм. 690. Кр. 224. Пл. 30. Хв. 129.
♀ » 297. » 690. » 225. » 28. » 130.

Экземпляры: города Шопинъ-фу, Тай-джеу и Гуй-хуа-чэнъ; іюнь, іюль.

Въ южной Гань-су этотъ видъ не встрѣченъ.

Aesalon regulus (Pall.).

[*Falco regulus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 34.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 407.—Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 104.

Размѣры:

♂ Дл. 325. Разм. 645. Кр. 210. Пл. 38. Хв. 140.
♀ » 335. » 685. » 219. » 39. » 140.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, мартъ, апрѣль.

Соколъ дерябникъ появился около г. Хой-сяна въ 1885 г. вмѣстѣ съ пустельгой, въ мартѣ, и также въ незначительномъ количествѣ. Добытыя въ это время, птицы были очень худы и переполнены глистами.

Hierofalco saker (Gm.).

[*Falco saker*, David et Oust., Ois. Chine, p. 31.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 407.—Gurney, List Diurn. B. of Prey, p. 104.

Размѣры:

? Дл. 610. Разм. 1295. Кр. 400. Пл. 65. Хв. 243.

Экземпляръ: монаст. Чайдамынъ-джао (Ордосъ), августъ.

Пржевальскій относитъ соколовъ, добытыхъ имъ въ долинѣ Желтой рѣки, къ *F. Hendersoni*, Hume [1]), причемъ упоминаетъ объ одномъ экземплярѣ молодой самки, которая, по его словамъ, совершенно похожа на *F. saker*. Нашъ экземпляръ добытъ почти въ тѣхъ же мѣстахъ, что и экз. Пржевальскаго, т. е. близъ Желтой рѣки, и судя по описанію, совершенно похожъ на вышеупомянутую самку. Можетъ быть его и надо отнести къ формѣ *F. Hendersoni*, Hume, но данныхъ для этого у насъ никакихъ нѣтъ.

---

[1]) Пржевальскій. Монг. и стр. Танг., II, птицы, стр. 14.

STRIGIDAE.

Syrnium aluco nivicola (Hodgs.).

[*Syrnium nivicola*, David et Oust., Ois. Chine, p. 44.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., II, p. 250.—Seebohm, Hist. Brit. B., I, p. 155.

Размѣры:

♂ Дл. 410. Разм. 1000. Кр. 286. Пл. 58 Хв. 197. (a).
♂ » 405. » 1020. » 305. » 54. » 187. (b).

Радужина темно-коричневая; клювъ у основанія зеленый, къ концу темный; когти желто-зеленые съ темными концами.

Экземпляры: дер. Сàтани, ноябрь (a), январь (b).

Наши два самца, добытые въ одной мѣстности, рѣзко различаются цвѣтомъ. Одинъ изъ нихъ (a) рыжеватый, другой (b) — бурый. Свѣтлый совершенно похожъ на экз. изъ Индіи Музея Императорской Академіи Наукъ.

Otus vulgaris (Linn.).

[*Otus vulgaris*, David et Oust., Ois. Chine, p. 41.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., II, p. 227.

Размѣры:

♂ Дл. 390. Разм. 970. Кр. 293. Пл. 40. Хв. 155. (a)
♀ » 395. » 985. » 304. » 45. » 165. (b)

Экземпляры: (a) р. Уланъ-муренъ (в. Ордосъ), августъ;—(b) г. Хой-сянъ, мартъ.

Самецъ изъ Ордоса гораздо свѣтлѣе, чѣмъ изъ южной Гань-су.

Glaucidium Brodiei (Burton).

[*Athene Brodiei*, David et Oust., Ois. Chine, p. 38, pl. 5.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., II, p. 212.

Размѣры:

♀ Дл. 163. Разм. 335. Кр. 92. Пл. 20. Хв. 67.

Радужина свѣтло-желтая; клювъ, вѣки и пальцы — зеленые, конецъ клюва и подошва-желтые.

Экземпляръ: дер. Джозà-пазà, октябрь.

Нашъ экземпляръ отличается отъ птицы, изображенной въ «Oiseaux de la Chine» только тѣмъ, что имѣетъ бѣлый цвѣтъ на подбородкѣ и груди съ желтоватымъ оттѣнкомъ, а поперечныя полосы на хвостѣ грязно-рыжія, вмѣсто бѣлыхъ, какъ на рисункѣ. Во всякомъ случаѣ онъ гораздо темнѣе, чѣмъ птица, изображенная Gould'омъ (B. of. As., I, pl. 15.).

Наша птица добыта на высотѣ не менѣе 10 тыс. футъ, на днѣ горной долины въ кустарной заросли, гдѣ ее съ ожесточеніемъ травила и преслѣдовала цѣлая стая мелкихъ пташекъ.

Carine bactriana (Hutton).

[*Athene plumipes*, David et Oust., Ois. Chine, p. 37.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., II, p. 137.—Seebohm, Ibis 1885, p. 420; Id. Hist. Brit. B., I, p. 174.

Размѣры:

? Дл. 255. Разм. 560. Кр. 156. Пл. 33. Хв. 89.

Экземпляръ: уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), сентябрь.

Въ Гань-су я встрѣтилъ сыча лишь однажды, на высотѣ не менѣе 10 т. футъ близъ дер. Ламаии, лежащей въ горахъ праваго берега р. Тао-хэ между городами Ди-дао и Мин-джеу. Экземпляровъ однако не добылъ.

Bubo bengalensis (Frankl.).

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., II, p. 25.

Размѣры:

♀ Дл. 580. Разм. 1500. Кр. 401. Пл. 80. Хв. 222.

Экземпляръ: Дер. Лянъ-дзя-коу (къ югу отъ г. Хой-сяна, уже въ провинціи Шенси), 15 марта.

Нашъ экземпляръ ничѣмъ не отличается отъ экз. *Bubo bengalensis* изъ Индіи Музея Императорской Академіи Наукъ.

Видъ этотъ не упомянутъ въ «Oiseaux de la Chine». Въ замѣткѣ объ *B. maximus*, Давидъ говоритъ, что онъ встрѣчалъ обыкновеннаго филина въ Урато, Монголіи, Шенси и Муппиѣ. Не будутъ ли птицы изъ двухъ послѣднихъ мѣстностей—*B. bengalensis?*

CUCULIDAE.

Cuculus canorus, Linn.

[*Cuculus canorus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 65.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 378. — Oates, Ibis 1889, pp. 355 — 359.

Размѣры:

♂ ad. Дл. 370. Разм. 635. Кр. 226. Кл. 23. Пл. 23. Хв. 183. (a)
? ad. » — » — » 210. » 23. » 19. » 168. (b)

Экземпляры: (a), уроч. Терминъ-байшинъ (Ордосъ), августъ;—(b), дер. У-пинъ (Сигуаньскаго округа), іюль.

Нашъ южно-ганьсуйскій экземпляръ значительно меньше величиной, чѣмъ ордосскій. Оба совершенно взрослыя птицы и ничѣмъ, кромѣ величины, не различаются. Ширина темныхъ поперечныхъ полосъ на груди у обоихъ совершенно одинакова.

Въ Сигуаньскомъ округѣ обыкновенная кукушка рѣдка. Въ лѣсистыхъ горныхъ долинахъ я ее не встрѣчалъ. Единственный нашъ экземпляръ добытъ на перевалѣ между рѣками Сигуаньской и Сатанпиской, въ мѣстности сравнительно открытой, гдѣ лѣса чередуются съ обширными луговыми пространствами.

Cuculus striatus, Drap.

[*Cuculus striatus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 65.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 378. — Oates, Ibis 1889, pp. 355 — 359.

Размѣры:

♂ ad. Дл. 335. Разм. 510. Кр. 185. Кл. 22,5. Пл. 19,5. Хв. 160 (a).
♂ hep. » 315. » 560. » 198. » 21. » 20. » 153 (b).
♀ hep. » 300. » 520. » 187. » 20. » 20. » 151 (c).

Радужина у взрослаго самца оранжевая, у экземпляровъ въ рыжеватомъ нарядѣ (hep.) грязно-бѣлая.

Экземпляры: (a) дер. Іо-дзамъ-пу, май;—(b), дер. Дзю-юань, 15 августа;—(c), дер. Лотани, конецъ сентября.

У одного изъ нашихъ самцовъ въ рыжеватомъ нарядѣ (b.) крыло длиннѣе, чѣмъ у другаго, совершенно взрослаго. Оба они, однако, имѣютъ темныя поперечныя полосы на груди совершенно одинаковой ширины,—шире чѣмъ у *C. canorus*.

Въ лѣсистыхъ ущельяхъ Сигученскаго округа *C. striatus* кажется вполнѣ замѣщаетъ *C. canorus*. Въ ущельѣ р. Іо-дзамъ-пу, гдѣ я прожилъ 3 лѣтнихъ мѣсяца, въ маѣ я ежедневно слышалъ характерный голосъ этого вида, тогда какъ кукованья обыкновенной кукушки за все время не слыхалъ ни разу.

Cuculus poliocephalus, Lath.

[*Cuculus poliocephalus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 66.]

Oates, Ibis 1889, pp. 355 — 359.

Размѣры:

♂ ad. Дл. 275. Разм. 445. Кр. 152—154. Кл. 21—22. Пл. 18—19. Хв. 134—142.
? hep. » — » — » 150. » 22. » 19. » 134. (a)

Экземпляры: дер. Лото-пинъ, іюль; — дер. Іо-дзамъ-пу, май, іюнь; — (a), дер. Нда-ми (близъ монаст. Лабранъ, окр. города Хе-джеу), 21 мая.

Экземпляръ (a), птица въ рыжеватомъ нарядѣ, добытъ г. Потаниннымъ на Амдоскомъ нагорьѣ, недалеко отъ монастыря Лабранъ, лежащаго въ верховьяхъ рѣки, на которой стоитъ городъ Хэ-джеу. Этотъ экземпляръ самая сѣверная, какая только извѣстна, находка этого вида. Въ с.-з. Гань-су онъ Пржевальскимъ не встрѣченъ.

Въ Сигученскомъ округѣ *C. poliocephalus* болѣе обыкновенна, чѣмъ оба вышеприведенные вида кукушекъ. Я встрѣчалъ ее повсюду въ горахъ средней высоты, по окушкамъ тѣнистыхъ лиственныхъ лѣсовъ и, обыкновенно, вблизи деревень.

ALCEDINIDAE.

Ceryle lugubris (Temm.)

[*Ceryle lugubris*, David et Oust., Ois. Chine, p. 78, pl. 10.]

Temm. et Schl., Fauna Jap., Aves, pl. XXXVIII, B.

Размѣры:

♂ Дл. 400—425. Разм. 630—665. Кр. 177—189. Кл. 66—76. Пл. 14. Хв. 116—120.

Радужина темно-каштановая; клювъ черный, у основанія синеватый; плюсны грязно-зеленыя; подошвы розовыя.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, Февраль.

Всѣ наши экземпляры—самцы и всѣ имѣютъ подбой крыльевъ бѣлый, а на груди и по бокамъ зоба очень рѣзкій рыжеватый оттѣнокъ.

Г. Hume высказываетъ предположеніе, что японскій *C. lugubris* тождественъ съ гималайскимъ *C. guttata*, Vigors. [1]) Мы не имѣли въ рукахъ гималайскихъ птицъ и ничего поэтому не можемъ сказать, насколько это предположеніе основательно. Наши экземпляры совершенно тождественны съ рисункомъ «Oiseaux de la Chine».

Я встрѣтилъ *C. lugubris* только въ Хойсянскомъ округѣ, гдѣ онъ очень рѣдокъ и держится только въ тѣснинахъ рѣкъ. Около г. Хой-сяна, расположеннаго въ сравнительно ровной мѣстности, я этого вида ни разу не видалъ, но онъ встрѣчается изрѣдка на той же рѣкѣ, на которой расположенъ г. Хой-сянъ, но лишь съ того мѣста, гдѣ она входитъ въ каменныя щеки. *C. lugubris* крайне остороженъ, держится всегда около самой воды и, при приближеніи человѣка, тотчасъ же улетаетъ. Летитъ всегда надъ самой водой, издавая при этомъ очень громкій и пронзительной крикъ.

UPUPIDAE.

Upupa epops, Linn.

[*Upupa epops*, David et Oust., Ois. Chine, p. 79.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 335.

Размѣры:

♂ Дл. 320. Разм. 475. Кр. 148. Кл. 58. Пл. 24. Хв. 111.

Экземпляръ: г. Хой-сянъ, начало марта.

Удодъ встрѣчается въ Хой-сянскомъ округѣ изрѣдка зимой, въ мартѣ же становится обыкновеннымъ. Особенно обиленъ около самаго г. Хой-сяна.

---

[1]) Hume, Str. Feath., VI, p. 85, footn.

PICIDAE.

Vivia chinensis, Hargitt.

[*Vivia innominata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 54.]

Hargitt, Ibis 1881, p. 228, pl. VIII.

Размѣры:

♂ Дл. 107—117. Разм. 200—205. Кр. 59—62. Кл. 11—13. Пл. 13. Хв. 36—40.
♀? » 110. » 200. » 61. » 11,5. » 13. » 38.

Экземпляры: уроч. Кванъ-дзя-коу (50 верстъ къ востоку отъ г. Хой-сяна), декабрь, февраль; — дер. Лянъ-дзя-коу (50 верстъ къ югу отъ г. Хой-сяна, ужѣ въ провинціи Шенси), апрѣль;—дер. Сатани, декабрь.

Наши экземпляры отличаются отъ экз. *Vivia innominata* изъ Сиккима Музея Императорской Академіи Наукъ слѣдующимъ:

1. Каштановымъ цвѣтомъ верха головы (вмѣсто оливково-зеленаго).

2. Меньшей величиной лобнаго зеркальца, которое занимаетъ только середину лба (вмѣсто всего лба).

3. Оранжевымъ цвѣтомъ концевъ перьевъ, образующихъ зеркальце (вмѣсто краснаго).

4. Немного большей величиной (крыло сиккимскихъ экз., у ♂—55 мм., у ♀—57 мм.).

Экземпляръ, помѣченный нами «♀?» отличается отъ другихъ только полнымъ отсутствіемъ лобнаго зеркальца.

Видъ этотъ довольно обыкновенъ въ восточной части Гань-су по границѣ съ Шенси. Встрѣчается въ горахъ средней высоты по мелкимъ кустарнымъ и бамбуковымъ зарослямъ, а также по небольшимъ лиственнымъ лѣскамъ среди хорошо населенныхъ мѣстностей. Въ Сигученскомъ округѣ встрѣченъ лишь однажды.

Gecinus Guerini (Malh.).

[*Gecinus Guerini*, David et Oust., Ois. Chine, p. 52.]

Hargitt, Ibis 1888, p. 11.

Размѣры:

♂ Дл. 320—340. Разм. 485—505. Кр. 149—154. Кл. 38—45. Пл. 28—29. Хв. 112—123.
♀ » 330. » 480. » 145. » 38. » 28. » 127.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, декабрь, январь;—дер. Сатани, декабрь;—Іо-дзамъ-пу, іюнь.

Этотъ видъ зеленаго дятла въ южной Гань-су весьма обыкновенъ. Встрѣчается какъ въ глубокихъ долинахъ, такъ и довольно высоко въ горахъ, но преимущественно въ культурныхъ мѣстностяхъ, въ садахъ и по отдѣльно расположеннымъ группамъ деревьевъ вблизи дорогъ. Сплошныхъ лѣсовъ, кажется, избѣгаетъ. Въ лѣсистыхъ горахъ Сигученскаго округа хотя и встрѣчается, но рѣдокъ.

Dryocopus martius (Linn.).

[*Dryocopus martius*, David et Oust., Ois. Chine, p. 49.]

Dresser, B. of Eur. V, pl. 274.

Размѣры:

♂ Дл. 440—465. Разм. 730—775. Кр. 236—256. Кл. 54—56. Пл. 35. Хв. 175—194.

Экземпляры: дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь;—дер. Джоза-паза, сентябрь.

Черный дятелъ встрѣченъ только въ словыхъ лѣсахъ ю.-з. Гань-су, да и здѣсь крайне рѣдокъ. За все время я видѣлъ его всего раза два—три.

Jyngipicus pygmaeus kaleensis (Swinhoe).

[*Jyngipicus kaleensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 50.]

Hargitt, Ibis 1882, p. 32.

Размѣры:

♂ Дл. 180. Разм. 345. Кр. 107. Кл. 17. Пл. 18. Хв. 71.

Экземпляры: дер. Сатани, декабрь;—дер. Іо-дзамъ-пу, іюль.

Наши экземпляры отличаются отъ *J. scintilliceps*, изображеннаго Gould'омъ (B. of As., VI, pl. 21), какъ разъ тѣми признаками, которыми г. Hargitt отличаетъ *J. kaleensis* отъ *J. scintilliceps*, а именно: меньшимъ количествомъ бѣлаго цвѣта на спинѣ, меньшей пятнистостью крыльевъ и, — болѣе темной нижней стороной тѣла, покрытой болѣе широкими темными продольными штрихами. Объ эти формы вѣроятно стоятъ другъ къ другу въ такомъ же отношеніи, какъ *P. Cabanisi* и *P. Luciani*, т. е. одна горная, другая болѣе равнинная.

Этотъ дятелъ встрѣченъ въ Сиганскомъ и Миндзеускомъ округѣ всего раза два или три, въ словыхъ лѣсахъ.

Picus mandarinus Luciani. Malh.

[*Picus mandarinus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 47, partim.]

Seebohm, Ibis 1883, p. 24.

Размѣры:

♀ Кр. 126. Кл. 30. Пл. 22. Хв. 86.

Экземпляръ: городъ Бао-динъ-фу, май.

Нашъ единственный экземпляръ—съ Пекинской равнины. Въ южной Гань-су этотъ видъ ни разу не встрѣченъ.

Picus mandarinus Cabanisi, Malh.

[*Picus mandarinus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 47, partim.]

Seebohm, Ibis 1883, p. 24.

Размѣры: экз. изъ Утайшаньскихъ горъ:

♂ Дл. 235. Разм. 430. Кр. 129. Кл. 31. Пл. 23. Хв. 87.
♀ » — » 435. » 131. » 30. » 22,5. » 94.
экз. изъ с. Гань-су:
♂ » — » — » 139. » 32. » 23. » 99.
♀ » — » — » 132—134. » 28—29. » 22. » 90—100.
экз. изъ ю. Гань-су:
♂ » 240—250. » 420—445. » 134—137. » 30—33. » 22—23. » 96—100.
♀ » 230—245. » 415—445. » 130—138. » 27—29. » 21—23. » 88—99.

Экземпляры: горы У-тай-шань, іюнь;—уроч. Санъ-чуань (на Желтой рѣкѣ, выше г. Ланьджеу въ 2-хъ—3-хъ дняхъ пути), декабрь;—г. Хой-сянъ, декабрь, мартъ.

У всѣхъ нашихъ (16) экземпляровъ этого вида, бѣлыя пятна на махахъ сравнительно не велики и на сложенномъ крылѣ образуютъ неправильныя зигзагообразныя поперечныя полосы, или даже отдѣльныя пятна, лежащія въ шахматномъ порядкѣ. У всѣхъ также экземпляровъ по два боковыхъ руля съ каждой стороны имѣютъ отъ 3—4 широкихъ черно-бурыхъ поперечныхъ полосъ. Единственный же нашъ экземпляръ *P. Luciani*, изъ Бао-динъ-фу, отличается отъ нихъ болѣе крупными бѣлыми пятнами на махахъ (располагающимися при томъ на сложенномъ крылѣ въ широкія и правильныя полосы) и боковыми рулями, которые почти бѣлы и имѣютъ только нѣсколько узкихъ черныхъ поперечныхъ пятнышекъ.

Въ цвѣтѣ нашихъ экземпляровъ *P. Cabanisi* изъ различныхъ мѣстностей есть небольшія различія. У птицъ изъ ю. Гань-су низъ тѣла очень темный, рыжевато-бурый; у утайшаньскихъ и сѣверо-ганьсуйскихъ низъ тѣла свѣтлѣе, но въ незначительной степени. Какъ у тѣхъ, такъ и у другихъ на груди есть болѣе или менѣе значительная примѣсь краснаго цвѣта, но ни у одного изъ нашихъ экземпляровъ нѣтъ такихъ рѣзкихъ красныхъ пятенъ подъ усами, какъ изображено у Malherbe'a (Monogr. Picid., pl. XVII, fig. 1).

Во всей южной Гань-су *P. Cabanisi* довольно обыкновенъ.

Picus Pernyi, J. Verr.

[*Picus Pernyi*, David et Oust., Ois. Chine, p. 48.]

Verreaux, Revue et Magas. de Zool. 1867, p. 271, pl. 16.

Размѣры:
♂ Дл. 185—200. Разм. 325—345. Кр. 104—110. Кл. 19—19,5. Пл. —22. Хв. 73—82.

Экземпляры: дер. Сатани и дер. Чаго, конецъ декабря.

Видъ этотъ встрѣченъ только въ Сигученскомъ округѣ и всего два раза.

Jynx torquilla, Linn.

[*Jynx torquilla*, David et Oust., Ois. Chine, p. 55.]

Dresser, B. of Eur., V, p. 103, pl. 289.

Размѣры:

? Кр. 93. Кл. 16. Пл. 19. Хв. 78.

Единственный экземпляръ нашей коллекціи добытъ экспедиціею Г. Н. Потанина, вѣроятно, на Амдоскомъ нагорьѣ; къ сожалѣнію этикетъ утерянъ.

Въ ю.-з. Гань-су я встрѣтилъ *J. torquilla* лишь однажды, въ долинѣ рѣки, на которой стоитъ мѣстечко Танъ-чанъ, но экземпляровъ не добылъ.

ALAUDIDAE.

Alauda gulgula coelivox, Swinh.

[*Alauda coelivox*, David et Oust., Ois. Chine, p. 314.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 267.

Размѣры:

♀ Дл. 180. Разм. 260. Кр. 100. Кл. 15. Пл. 25. Хв. 64.

Экземпляръ: дер. Сатани, середина января.

Г. Seebohm, различая по величинѣ двѣ крайнія формы полеваго жаворонка,— мелкую *A. gulgula* (къ которой онъ относитъ и *A. coelivox*) и крупную — *A. arvensis*, дастъ предѣльные размѣры крыла для первой 82—95 мм. а для второй 100—125 мм. Хотя нашъ экземпляръ и выходитъ изъ предѣльныхъ размѣровъ мелкой формы, мы все таки относимъ его къ *A. coelivox*, принимая во вниманіе большую примѣсь рыжаго цвѣта въ опереніи этого экземпляра.

Небольшой табунокъ этихъ жаворонковъ былъ встрѣченъ однажды, зимой, на высокихъ горныхъ пашняхъ Сигучейскаго округа, на высотѣ не менѣе 9000 футъ.

Otocorys Brandti, Dress.

[*Otocorys sibirica*, David et Oust., Ois. Chine, p. 316.]

Scully, Ibis 1881, p. 581.—Seebohm, Ibis 1884, p. 184—188.—Dresser, Ibis 1884, p. 116—118.

Размѣры:

? Дл. 190. Разм. 325. Кр. 102. Кл. 13. Пл. 19,5. Хв. 79. (a).
juv. » — » — » 101. » 14. » 21. » 81. (b).

Экземпляры: (a), городъ Синнинъ, конецъ апрѣля;—(b), перевалъ Рдонсукъ (въ Нань-шанѣ), начало мая.

Одинъ изъ нашихъ экземпляровъ (a), по сравнительно короткому клюву и узости бѣлой полоски между черными щеками и зобомъ, несомнѣнно долженъ быть отнесенъ къ формѣ *O. Brandti*, а не *O. longirostris;* другой же экземпляръ (b) имѣетъ бѣлую полоску пошире и возможно, что принадлежитъ къ послѣдней формѣ. Точное опредѣленіе этого экземпляра трудно, такъ какъ это совсѣмъ молодая птица. У обоихъ клювъ по сравненію съ аральскими и киргизскими экземплярами много тоньше.

Galerita leautungensis, Swinh.

[*Galerida cristata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 317.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 262.

Размѣры:
♂ Дл. 190. Разм. 345. Кр. 104. Кл. 17,5. Пл. 24. Хв. 69.

Экземпляръ: городъ Фушинъ (с. Китай), іюнь.

Calandrella pispoletta (Pall.).

[*Calandrella cheleensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 317.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 275, footn.

Размѣры:
juv. Дл. 165. Разм. 277. Кр. 82.

Экземпляръ: монаст. Шине-суме (Ордосъ), начало сентября.

Нашъ единственный экземпляръ совершенно молодая птица въ гнѣздовомъ перѣ, почему точное опредѣленіе формы, къ которой онъ принадлежитъ,—невозможно. Внутренніе махи 2-го разряда не доходятъ у этого экземпляра до вершины крыла на $^3/_4$ дюйма.

Calandrella brachydactyla (Leisler).

[*Calandrella brachydactyla* David et Oust., Ois. Chine, p. 318.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 274.

Размѣры:
♂ Дл. 165. Разм. 305. Кр. 95—100. Кл. 12—13,5. Пл. 20,7—21,5. Хв. 61—65.
♀ » 157. » 285. » 92. » 12. » 21. » 57.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, 6 апрѣля.

У нашихъ экземпляровъ махи 2-го разряда сильно обиты, почему не достигаютъ до вершины крыла отъ 5 до 12 мм.

Громадныя стада этихъ жаворонковъ появились около г. Хой-сяна въ началѣ апрѣля.

Melanocorypha mongolica (Pall.).

[*Melanocorypha mongolica*, David et Oust., Ois. Chine, p. 319, pl. 88.]

Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 282.

Размѣры:
♂ Дл. 220. Разм. 415. Кр. 130. Кл. 18,5. Пл. 25. Хв. 83.

Экземпляръ: уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), конецъ сентября.

MOTACILLIDAE.

Anthus maculatus, Hodgs.

[*Anthus agilis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 308.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 547.

Размѣры:

♀ Дл. 160. Разм. 270. Кр. 85. Кл. 15. Пл. 21. Хв. 63 (a)
? » 155—175. » 255—270. » 78—83. » 13—14,3. » 20—22. » 59—64. (b)

Экземпляры: (a), уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), 22 сентября;—(b), дер. Дзю-юань, конецъ іюля;—дер. Іо-дзамъ-пу, іюль, августъ;—Амдо.

Изъ всѣхъ нашихъ экземпляровъ (8) только одинъ, изъ Ордоса, совершенно типичная *A. maculatus*. Этотъ экземпляръ совершенно похожъ на экземпляръ изъ Индіи [1]) Музея Императорской Академіи Наукъ и, какъ послѣдній, имѣетъ весь верхъ тѣла почти одноцвѣтно оливково-зеленый, со слабо развитыми черными наствольными пятнами на перьяхъ спины. Всѣ остальные наши экземпляры изъ ю.-з. Ганьсу имѣютъ признаки средніе между *A. maculatus* и *A. trivialis*. По ширинѣ и густотѣ черныхъ пятенъ на груди эти экземпляры совершенно похожи на ордосскій, т. е. на *A. maculatus*; цвѣтъ же верхней стороны тѣла у нихъ сѣрѣе и менѣе одноцвѣтный. Наствольныя пятна на спинѣ болѣе широки и образуютъ довольно рѣзкія черныя полосы, какъ у *A. trivialis*. Эти различія не могутъ быть объяснены отрепанностью лѣтняго оперенія южно-ганьсуйскихъ птицъ. Одна изъ нихъ, добытая 20 іюля, вѣроятно молодая и только-что вылинявшая, отличается отъ ордосскаго экземпляра, оперепіе котораго примѣрно такой же свѣжести, тѣми же особенностями. Эта молодая птица интересна еще тѣмъ, что имѣетъ каймы на большихъ и среднихъ кроющихъ крыла ярко оливково-желтыя, а не бѣлыя, какъ у остальныхъ экземпляровъ.

Anthus rosaceus, Hodgs.

[*Anthus rosaceus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 308.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 589.

Размѣры:

♂ Дл. 170—175. Разм. 295. Кр. 88—91. Кл. 16. Пл. 23—24. Хв. 64—69.
♀ » 170. » 275. » 85. » 16,5. » 23. » 63.

Экземпляры: монаст. У-тай (въ горахъ У-тай-шань), іюнь.

Anthus japonicus, Temm. et Schl.

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 598. — Seebohm, Ibis 1879, p. 34; 1884, p. 38;—id., Hist. Brit. B. II. p. 249.

Размѣры:

♂ Дл. 180. Разм. 290. Кр. 90. Кл. 16,5. Пл. 23. Хв. 72.
? » 175. » 295. » 90. » 18. » 24. » 73.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, декабрь, февраль.

---

[1]) Cawnpore, 19. I. 1876, coll. Brooks.

Anthus Richardi, Viell.

[*Corydalla Richardi*, David et Oust., Ois. Chine, p. 309.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 564. — Seebohm, Hist. Brit. B. II, p. 233.

Размѣры:

♂ Кр. 96,5. Кл. 18. Пл. 32. Хв. 78.

Экземпляръ: г. Фоу-пинъ (с. Китай), іюнь.

Anthus striolatus, Blyth.

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 568.—Seebohm, Hist. Brit. B. II, p. 234.

Размѣры:

♂ Дл. 185. Разм. 300. Кр. 89. Кл. 16,5. Пл. 28. Хв. 71.
? » 190—200. » 295—320. » 86—94. » 16—17. » 29,5—30,8. » 69—77,5.

Экземпляры: монаст. У-тай, іюнь; — городъ Гуй-хуа-ченъ (Куку-хото), августъ; — монаст. Шине-суме (Ордосъ), сентябрь.

A. Richardi и *A. striolatus* близкія, но несомнѣнно различныя формы, опредѣлены нами путемъ сравненія съ экземплярами Музея Императорской Академіи Наукъ [1]). Различіе между этими формами довольно рѣзко, но плохо выражается какими либо діагностическими признаками. Разница въ величинѣ вѣроятно наилучшій. Дѣленіе г. Sharpe'а по сравнительной длинѣ задняго пальца и когтя врядъ ли вѣрно.

Colobates melanope (Pall.).

[*Colobates melanope*, David et Oust., Ois. Chine, p. 302.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 497.

Размѣры:

? Дл. 195. Разм. 250. Кр. 81. Кл. 15. Пл. 20. Хв. 93.

Экземпляръ: г. Хой-сянъ, начало апрѣля.

Budytes citreola (Pall.).

[*Budytes citreolus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 304.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 503.

Размѣры:

♂ ad. Дл. 185. Разм. 280. Кр. 88—89. Кл. 16,2—17,5. Пл. 25,5—26,8. Хв. 79—84.
♂ imm. » 175. » 260. » 82. » 15. » 24. » 71.
♀ » 180. » 260. » 82. » 15,5. » 25. » 75.

Экземпляры: уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), сентябрь;—г. Хой-сянъ, апрѣль;—дер. Лотани, сентябрь.

Budytes taivana, Swinh.

[*Budytes taivanus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 303.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 514.

Размѣры:

? Кр. 79. Кл. 14,5, Пл. 24. Хв. 71.

Экземпляръ: единственный нашъ экземпляръ потерялъ этикетку, но вѣроятно онъ съ Пекинской равнины.

---

[1]) Экз. *A. Richardi* сбора г. Padde, Tunka 23. V. 1859; экз. *A. striolatus* отъ г. Seebohm'a, Dinapore, 7. X. 1873, coll. Brooks.

Budytes cinereicapilla (Savi).

[*Budytes cinereocapillus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 303.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 522.

Размѣры:

♀ Дл. 160. Разм. 260. Кр. 75. Кл. 16,5. Пл. 24. Хв. 68.

Экземпляръ: р. Хуанъ-хе, близъ мѣст. Хе-коу, августъ.

Motacilla leucopsis, Gould.

[*Motacilla alboides*, *M. paradoxa* et *M. frontata*, David et Oust., Ois. Chine, pp. 298, 299 et 301.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 482.

Размѣры:

♂ ad. Дл. 187—200. Разм. 270—290. Кр. 84—88. Кл. 16—16,3. Пл. 24. Хв. 87—91.
♀ » 180—185. » 265—270. » 82—83,5. » 16. » 21,5—23 » 80—84.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, конецъ февраля;—дер. Лото-пинъ, іюль.

Motacilla lugens, Kittlitz.

[*Motacilla japonica*, David et Oust., Ois. Chine, p. 300.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 474.

Размѣры:

? Дл. 190—200. Разм. 280. Кр. 85—86. Кл. 15—16. Пл. 23—24. Хв. 83—92.

Экземпляры: уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), сентябрь; дер. Лотани, конецъ октября.

Опредѣленія видовъ *Budytes* и *Motacilla*, въ особенности трудныя относительно молодыхъ птицъ, провѣрены нами сравненіемъ по богатому матеріалу Музея Императорской Академіи Наукъ, любезно предоставленному намъ ученымъ хранителемъ Музея Ѳ. Д. Плеске.

HENICURIDAE.

Henicurus sinensis, Gould.

[*Henicurus Leschenaulti*, David et Oust., Ois. Chine, p. 295, pl. 37.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 313.

Размѣры:

♂ Дл. 300—310. Разм. 360—375. Кр. 110—117. Кл. 26—27,5. Пл. 32—34. Хв. 154—164.
♀ » 260—295. » 325—350. » 101—110. » 24—24,5. » 31,5—33. » 136—158.

Экземпляры: окр. г. Хой-сяна, январь, мартъ;—дер. Лапъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ;—дер. Іо-дзамъ-пу, май;—дер. Лотани, сентябрь.

Въ Хойсянскомъ округѣ этотъ видъ встрѣчается въ небольшомъ количествѣ по ключикамъ предгорій, среди населенныхъ мѣстностей и, кажется, осѣдлый. Въ ю.-з. Гань-су встрѣченъ весной всего раза два и только лѣтомъ.

Microcichla Scouleri (Vigors).

[*Henicurus Scouleri*, David et Oust., Ois. Chine, p. 297.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 323.

Размѣры:

♂ Дл. 140. Разм. 215—250. Кр. 76—80. Кл. 15—15,5. Пл. 24,5—25. Хв. 52—55.
♀ » 135—140. » 230—235. » 72—74. » 13,3—14,2 » 23,5—24. » 49—50.

Экземпляры: дер. Сàтани, декабрь, январь, февраль;—дер. Лотани, октябрь.

Этотъ видъ встрѣченъ осѣдлымъ, но въ небольшомъ количествѣ по горнымъ ручьямъ Сигученскаго и Минджеускаго округовъ. Въ Хойсянскомъ я видѣлъ его лишь однажды, но не добылъ.

TIMELIIDAE.

Pycnonotus xanthorrhous, Anderson.

[*Ixus xanthorrhous*, David et Oust., Ois. Chine, p. 141, pl. 45.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VI, p. 139.

Размѣры:

♂ Дл. 210. Разм. 280. Кр. 86—91. Кл. 16—18. Пл. 20—22. Хв. 89—94.
♀ » 200. » 280. » 86—89. » 15—16. » 20—22. » 86—90.

Экземпляры: окр. г. Хой-сянъ, ноябрь, декабрь, апрѣль.

Этотъ видъ весьма обыкновенъ въ Хойсянскомъ округѣ. Живетъ въ горахъ средней высоты по кустарнымъ чащамъ береговыхъ уваловъ рѣкъ и особливо въ мелкихъ лѣсныхъ зарослях на уступахъ скалъ. Встрѣчается болѣе или менѣе многочисленными обществами и часто вмѣстѣ со слѣдующимъ видомъ.

Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ не найденъ.

Spizixus semitorques, Swinh.

[*Spizixus semitorques*, David et Oust., Ois. Chine, p. 143, pl. 47.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VI, p. 173.

Размѣры:

♂ Дл. 210—220. Разм. 285—300. Кр. 90—95. Кл. 14—16. Пл. 20—22. Хв. 91—99.
♀ » 215. » 285. » 90. » 15. » 20. » 95.

Экземпляры: окр. г. Хой-сянъ, ноябрь, январь, февраль, мартъ, апрѣль.

Всѣ наши экземпляры совершенно схожи съ рисункомъ «Oiseaux de la Chine» и имѣютъ рѣзкій сплошной бѣлый полуошейникъ, который на серединѣ груди слегка сѣроватъ, но не прерванъ, какъ описано въ Каталогѣ Британскаго Музея и какъ изображено на рисункѣ Gould'a (B. of Asia, III, pl. 10). Въ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ есть одинъ экземпляръ схожій съ описаніемъ Каталога Британскаго Музея и съ рисункомъ Gould'a. Онъ имѣетъ полуошейникъ очень узкій и почти прерванный на серединѣ груди. Экземпляръ этотъ отъ д-ра Пясецкаго и добытъ на р. Хань-дзянъ.

Въ Хойсянскомъ округѣ *S. semitorques* также обыкновенен, какъ и предыдущій видъ и часто встрѣчается вмѣстѣ. Кажется впрочемъ онъ предпочитаетъ болѣе низкія мѣста, особенно бамбуковыя заросли по оврагамъ горныхъ долинъ, вблизи жилищъ.

Въ Сигученскомъ округѣ видъ этотъ не встрѣченъ.

Babax lanceolatus (J. Verr.).

[*Babax lanceolatus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 188, pl. 51.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 352.

Размѣры:

♂ Дл. 240—275. Разм. 285—305. Кр. 93—97. Кл. 24—25. Пл. 33—37. Хв. 107—120.
♀ » 240—275. » 300. » 95—98. » 22—25. » 33—34. » 103—117.

Экземпляры: дер. Сатани, декабрь, январь.

B. lanceolatus встрѣченъ мною лишь въ одномъ мѣстѣ,—около дер. Сàтани, Сигученскаго округа. Небольшіе табунки штукъ въ 5 — 6 изрѣдка попадались въ продолженіи всей зимы 1885—86 года въ кустарныхъ и бамбуковыхъ зарослях, вблизи пашенъ, около самой деревни. Днемъ птицы держались молча въ кустарныхъ чащахъ, на землѣ, передъ закатомъ же солнца нѣкоторыя изъ нихъ, забравшись на небольшой кустикъ, подымали пронзительные крики. Испытавши разъ преслѣдованіе, птицы становились чрезвычайно осторожны, такъ что мнѣ ни разу не удалось изъ одного табунка добыть болѣе одной штуки.

Pterorhinus Davidi, Swinh.

[*Pterorhinus Davidi*, David et Oust., Ois. Chine, p. 187, pl. 50.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 353.

Размѣры:

♂ Дл. 265—285. Разм. 285—305. Кр. 89—97. Кл. 25—27. Пл. 32—33. Хв. 121—131.
♀ » 250—267. » 280—285. » 90—91. » 23—26,5. » 31,5—32. » 117—127.

Экземпляры: р. Уланъ-Муренъ (Ордосъ), августъ;—монаст. Шине-суме (Ордосъ), сентябрь;—дер. Ней-вондза (близъ г. Лань-джеу), октябрь;—южн. склонъ хребта Цинъ-линъ (по пути отъ г. Гунъ-чанъ-фу въ г. Хой-сянъ), ноябрь;—дер. Сàтани, февраль;—р. Ташиту (въ Нань-шанѣ), май;—р. Тао-хэ выше г. Минъ-джеу, іюнь;—дер. Лóто-пинъ, іюль;—дер. Іо-дзамъ-пу, августъ.

Видъ этотъ весьма обыкновенен въ сѣверной Гань-су, въ южной же, къ югу отъ хребта Цинъ-лина, сравнительно рѣдокъ. Въ западной части Миньджеускаго округа онъ опять весьма обиленъ въ долинѣ р. Тао-хэ. Такъ какъ *P. Davidi* не найденъ Давидомъ въ сѣверной Сы-чуани, то вѣроятно южная граница Гань-су есть вмѣстѣ съ тѣмъ и южная граница распространенія этого вида.

Въ Сигученскомъ округѣ *P. Davidi* встрѣчается исключительно въ самой нижней культурной полосѣ горъ, не спускаясь въ глубокія долины и не заходя въ горные лѣса. Держится главнымъ образомъ въ зарослях колючихъ кустарниковъ по пашеннымъ межамъ и террасамъ.

Trochalopteron Ellioti, J. Verr.

[*Trochalopteron Ellioti*, David et Oust., Ois. Chine p. 202, pl. 57.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 370. — *Trochalopteron Przevalskii*, Menzbier, Ibis, 1887, p. 300.

Размѣры:

♂ Дл. 250—265. Разм. 280—305. Кр. 91—100. Кл. 19—20,5. Пл. 35—37. Хв. 121—137.
♀ » 240—265. » 285—290. » 93—98. » 19. » 35. » 120—127.

Экземпляры: окр. г. Хой-сянъ, декабрь; — уроч. Кванъ-дзя-коу (на границѣ Шенси), декабрь;—дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), апрѣль;—дер. Лото-пинъ, іюль;—дер. Сатани, ноябрь, декабрь; — дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, августъ.

Trochalopteron Przewalskii[1]), описанный г. Мензбиромъ по экземплярамъ, полученнымъ отъ Пржевальскаго (май, Гань-су), есть ни что иное какъ *T. Ellioti* въ сильно обношенномъ и выцвѣтшемъ опереніи. Всѣ наши лѣтніе экземпляры, а также подобные экземпляры Пржевальскаго (изъ перваго путешествія), хранящіеся въ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ, цвѣтомъ вполнѣ подходятъ подъ діагнозъ г. Мензбира. Что же касается бо̀льшихъ размѣровъ и бо̀льшей величины клюва, приписываемыхъ новому виду, а именно:

♂ Кр. 103. Хв. 130. Кл. 9[2]). Пл. 35
♀ » 98. » 125. » 9. » 33,

то размѣры эти тѣ же, что и нашихъ птицъ. Размѣры, приведенные въ «Oiseaux de la Chine»—Кр. 95. Хв. 130. Кл. 15. Пл. 38—также не указываютъ на меньшую величину птицъ изъ ю.-з. Китая; немного же меньшая длина клюва вѣроятно зависитъ только отъ способа измѣренія.

Tr. Ellioti весьма обыкновененъ во всей южной Гань-су. Живетъ въ среднемъ, кустарномъ и лѣсномъ поясѣ горъ. Лѣтомъ заходитъ довольно высоко въ горы, зимой же спускается ниже до дна второстепенныхъ долинъ и въ это время года соединяется обыкновенно въ очень большія общества. Лѣтомъ 1886 я встрѣчалъ выводки, имѣвшіе уже видъ взрослыхъ, въ концѣ іюня.

Trochalopteron cinereiceps, Styan.

Styan, Ibis 1887, p. 166, pl. VI. — Id, Ibis 1889, p. 444.

Размѣры:

♂ Дл. 235—255. Разм. 275—295. Кр. 86—95. Кл. 21—23. Пл. 35—38. Хв. 104—115.
♀ » 215—250. » 270—280. » 86—90. » 20—22. » 32—35. » 100—111.

Радужина желтовато-бѣлая. Клювъ: верхняя челюсть розовато-сѣрая, къ основанію темнѣе; нижняя — розовато-желтая. Плюсны спереди розовато-сѣрыя, какъ клювъ, сзади — грязно-желтыя. Когти свѣтлые.

Экземпляры: дер. Сàтани, декабрь; — дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль, августъ; — дер. Лотàни, сентябрь; — дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ.

Г. Styan, описавшій *T. cinereiceps* по 2-мъ живымъ экземплярамъ, купленнымъ

[1]) Вотъ діагнозъ г. Мензбира: Tr. Ellioti similis, sed major, rostro validiore, colore toto brunneo grisescente, capite pallidiore, alarum colore cinerascente nec ferrugineo praedominante, rectricibus duabus medianis cinereis, albo terminatis.

[2]) Вѣроятно опечатка,—не 9, а 19.

въ 1885 г. въ Хань-коу, отличаетъ его отъ близкаго вида *T. cinereiceps*, Godv. Aust. изъ Мипеероог'а слѣдующими признаками: болѣе оливковымъ и менѣе сѣрымъ цвѣтомъ верхней стороны тѣла, темно буро-сѣрымъ верхомъ головы, рыжими ушными перьями и бѣлыми щеками. Самое названіе *T. cinereiceps* показываетъ, что наибольшее діагностическое значеніе придано сѣрому цвѣту головы новаго вида, вмѣсто чернаго у *T. cinereaceum*. Это врядъ ли вѣрно.

Мы имѣемъ 15 экземпляровъ (8 ♂, 7 ♀), которыхъ всѣхъ относимъ къ виду *T. cinereiceps*, хотя по цвѣту головы они представляютъ большія различія. У всѣхъ ноздревыя перья и узкая лобная полоска глубоко-чернаго цвѣта, верхъ же головы у большинства (5 ♂, 1 ♀) сѣрый, съ большею или меньшею примѣсью оливково-рыжаго, а у трехъ самцовъ (добытыхъ въ іюнѣ и августѣ)—буро-черный, только со слабымъ сѣроватымъ налетомъ, который рѣзче на затылкѣ. Черноголовыя птицы добыты въ обществѣ сѣроголовыхъ и совершенно сходны съ ними, кромѣ цвѣта головы, какъ по общей окраскѣ, такъ по узору и окраскѣ бровей и щекъ. Всѣ наши экземпляры имѣютъ около глаза очень рѣзкое бѣлое пятно, которое занимаетъ переднюю половину надбровной полосы, уздечки (lores) и окружаетъ глазъ снизу, захватывая основную половину ушныхъ перьевъ. Конечная часть послѣднихъ и задняя половина надбровной полосы — рыжія. Рыжій цвѣтъ не рѣзко ограниченъ и постепенно переходитъ въ оливковый на шеѣ. Этотъ узоръ и окраска совершенно тѣ же, какъ на рисункѣ *T. cinereiceps* г. Styan'a и отличны отъ узора и окраски соотвѣтствующихъ частей у *T. cinereaceum*[1]).

Верхъ головы становится чернымъ, вѣроятно, только у старыхъ самцовъ и, во всякомъ случаѣ, не раньше какъ на второй годъ, такъ какъ мы имѣемъ сѣроголоваго самца, добытаго въ мартѣ.

У большинства нашихъ птицъ, какъ мы уже сказали, верхъ головы сѣрый съ большей или меньшей примѣсью оливково-рыжаго. Это зависитъ оттого, что каждое сѣрое перо имѣетъ широкую оливково-рыжую оторочку, которая обнашивается. У птицъ въ отрепанномъ перѣ едва видны слѣды этой оторочки, у птицъ же въ очень свѣжемъ опереніи наоборотъ сѣрый цвѣтъ едва просвѣчиваетъ изъ за оливково-рыжаго.

Кромѣ цвѣта головы, бровей и щекъ, г. Styan отличаетъ *T. cinereiceps* еще тѣмъ, что цвѣтъ верхней стороны тѣла этого вида болѣе оливковый и менѣе сѣрый, чѣмъ у *T. cinereaceum*. Этотъ признакъ вѣроятно также не состоятеленъ. Всѣ наши самцы, которыхъ мы считаемъ за взрослыхъ (всѣ черноголовые и нѣсколько сѣроголовыхъ), отличаются отъ молодыхъ самцовъ и самокъ тѣмъ, что первые сверху сѣро-оливковые, вторые же болѣе рыжеваты. Вѣроятно птицы, послужившіе типомъ для описанія г. Styan'a, были молодые самцы и самки.

---

[1]) Судимъ по рисунку Gould'a въ B. of Asia, Vol. III, pl. 39; — экземпляровъ этого вида мы не имѣли.

T. cinereiceps найденъ мною въ порядочномъ количествѣ въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ и два экземпляра (♂ и ♀) добыты въ провинціи Шенси, близъ восточной границы Гань-су. Замѣчательно, что за зиму 188 4/5 г., проведенную мной въ пограничномъ съ Шенси Хойсянскомъ округѣ, видъ этотъ не былъ ни разу встрѣченъ. Распространеніе этого вида въ ю.-з. Гань-су также представляетъ нѣкоторую особенность. За три зимнихъ мѣсяца 1885 года я встрѣтилъ его около дер. Сатани лишь однажды въ компаніи *J. máxima*, зимовавшихъ въ большомъ количествѣ въ заповѣдной рощѣ близъ деревни. Птичекъ кажется была только парочка, изъ которой я добылъ одну. Лѣтомъ 1886 г. я встрѣчалъ *T. cinereiceps* раза три, небольшими обществами въ пять или шесть штукъ, въ долинѣ р. Іо-дзамъ-пу. Осенью того же года я нашелъ, наконецъ, этотъ видъ въ большомъ количествѣ близъ дер. Лотани. Но и тутъ птицы были обыкновенны въ кустарныхъ зарослях праваго увала Сигученской рѣки, на которой стоитъ деревня, и ни разу не были наблюдаемы въ горахъ лѣваго берега.

По образу жизни *T. cinereiceps* подобенъ другимъ *Garrulax*'амъ. Онъ держится обыкновенно на землѣ, отыскивая пищу въ сухихъ листьяхъ и травѣ и не выходя изъ чащи; на деревья впрочемъ садится охотно. Призывный крикъ напоминаетъ голосъ пестраго дятла, а пѣніе, которое мнѣ пришлось слышать раза два, очень мелодично. Птичка поетъ сидя на невысокомъ кустѣ или деревцѣ, совершенно скрытая вѣтвями. Молодыя птицы, битыя въ началѣ августа, въ большинствѣ случаевъ выливяли и совершенно походили на взрослыхъ, но попадались также особи, бывшія въ полной линькѣ.

Trochalopteron Sukatschewi, sp. nov.

Табл. I, фиг. 1.

Размѣры:

♂ Дл. 280—310. Разм. 312—320. Кр. 99—108. Кл. 23—28. Пл. 37—39.
Задн. пал. съ когт. 19,5—22. Хв. 143—160.
♀ » 270—293. » 305—320. » 97—106. » 22—26. » 38—39.
» 20—21. » 132—158.

5-й, 6-й, 7-й и 8-й махи почти равны и образуютъ вершину крыла; 4-й махъ не достигаетъ до вершины крыла на 3—6 мм.; 3-й на 10—14 мм.; 2-й на 21—36 мм.; 1-й на 38—40 мм.,—примѣрно равенъ, на сложномъ крылѣ, предпослѣднему маху 3-го порядка; 9-й махъ слегка короче 8-го. Хвостъ ступенчатый: боковые рули короче среднихъ у самцовъ на 42—54 мм., у самокъ на 41—49 мм.

Экземпляры: Дер. Сатани, октябрь, ноябрь, декабрь; — дер. Чаго, ноябрь. декабрь; — дер. Іодзамъ-пу, іюль.

Описаніе. Нарядъ самца и самки одинаковъ.

Ноздревыя перья черныя. *Уздечки* (lores) черновато-сѣрыя. *Верхъ головы* оливково-бурый съ винным оттѣнкомъ. Надъ глазомъ и ушными перьями не рѣзкая *надбровная* полоса мутнаго винного цвѣта. Пространство *около зѣвковъ*, *щеки* и *основная половина ушныхъ перьевъ* бѣлыя, бѣлый цвѣтъ образуетъ *подъ глазомъ* рѣзкое бѣлое пятно. *Конечная половина ушныхъ перьевъ* буро-винная. Отъ задняго угла глаза, вдоль верхней гра-

ницы ушныхъ перьевъ, тянется узкая *полоска* буро-чернаго цвѣта. Отъ основаній вѣтвей нижней челюсти, вдоль нижней границы бѣлаго пятна, до задняго края послѣдняго, идутъ широкіе черные *усы*. *Затылокъ*, *верхняя сторона шеи*, *плечевыя* и *передняя часть спины* оливково-бурые съ вишнымъ оттѣнкомъ. *Задняя часть спины* оливково-бурая съ рыжеватымъ оттѣнкомъ. *Надхвостье* рыжее. *Верхнія кроющія хвоста* темно-рыжія. *Верхнія малыя кроющія крыла* оливково-рыжія. *Среднія кроющія* оливково-рыжія по наружному опахалу, буроватыя по внутреннему, иногда съ неясными бѣлыми конечными пятнышками около стержней. *Перья крылышка* (alula) по наружнымъ опахаламъ пепельно-сѣрыя; внутреннія опахала темно-сѣрыя къ концу и черныя въ серединѣ. *Кроющія главныхъ маховъ* по наружнымъ опахаламъ сѣрыя съ рыжеватымъ оттѣнкомъ; внутреннія опахала буро-черныя. *Махи перваго порядка* (1—9) по наружнымъ опахаламъ пепельно-сѣрые, внутреннія опахала сѣро-черныя съ сѣрыми краями; на концѣ каждаго маха по маленькому бѣлому трехугольному пятнышку. *Махи втораго порядка* по наружнымъ опахаламъ оливково-рыжіе, по внутреннимъ сѣро-черные съ сѣрыми краями; всѣ махи съ бѣлыми конечными пятнышками, которыя крупнѣе по направленію къ махамъ третьяго порядка. *Махи третьяго порядка* по наружнымъ опахаламъ оливково-рыжіе, по внутреннимъ черно-сѣрые, съ большими бѣлыми конечными пятнами. Пятна эти на двухъ самыхъ внутреннихъ махахъ занимаютъ весь конецъ внутренняго опахала и стержневую часть внѣшняго, у третьяго же съ краю маха только трехугольное конечное пятно около стержня, какъ у маховъ 1-го и 2-го порядковъ. *Нижнія кроющія крыла* и *подмышечныя* рыжеватыя. *Нижнія кроющія главныхъ маховъ* сѣрыя. *Нижняя сторона маховъ* сѣрая, къ серединѣ крыла свѣтлѣе и со слабымъ вишнымъ оттѣнкомъ. *Нижняя сторона тѣла* отъ подбородка до живота свѣтло-шоколадная съ вишнымъ оттѣнкомъ, который гуще на подбородкѣ и бокахъ шеи. *Животъ* и *бока* его рыжіе. *Подхвостье* темно-рыжее. Хвостъ: *три боковыхъ руля* съ каждой стороны въ основной части сѣрые, въ средней черные, на концѣ съ широкимъ бѣлымъ пятномъ и предконечной сѣрой полосой, которая на внѣшнемъ опахалѣ шире, чѣмъ на внутреннемъ. *Четыре среднихъ руля* оливково-рыжіе въ серединѣ, къ концу и по краямъ сѣроваты, на концѣ съ бѣлымъ трехугольнымъ пятномъ

Клювъ слегка загнутъ. *Верхняя челюсть* темно-роговаго цвѣта съ болѣе свѣтлыми краями; послѣдніе у основанія челюсти зеленовато-желтые. *Нижняя челюсть* у основанія и по краямъ зеленовато-желтая, въ средней части буроватая. *Ноздревыя щетинки* очень густы и длинны (въ $^1/_2$ длины клюва) и приподняты вверхъ. *Щетинки* на *зѣвахъ* также очень длинны. *Ноздревыя впадины* округло-овальныя, почти скрыты щетинками. *Ноздревыя отверстія* длинно-овальной, слегка бобовидной формы; вогнутый край обращенъ къ operculum'у. Они занимаютъ всю длину ноздревой впадины и расположены немного наискось, передній край ближе къ коньку, задній—къ краю челюсти. *Operculum* помѣщенъ въ глубинѣ ноздревой впадины; край его безъ утолщенія.

Радужина темно-коричневая. *Плюсны* розовато-сѣрыя.

По общей окраскѣ и цвѣторасположенію *T. Sukatschewi* очень напоминаетъ

T. cinereiceps, но сразу отъ него отличается отсутствіемъ предконечныхъ черныхъ полосъ на махахъ и рулях. Общее сходство окраски этихъ двухъ птицъ есть, собственно, главное основаніе, почему мы относимъ нашъ новый видъ къ роду *Trochalopteron*, а не *Janthocincla*, къ которому онъ приближается по habitus'у. За недостаткомъ матеріала мы не могли разобраться въ родовыхъ признакахъ самостоятельно, сдѣлать же это по литературнымъ даннымъ невозможно [1]).

T. Sukatschewi названъ нами именемъ многоуважаемаго В. П. Сукачева, Почет-

---

[1]) Мы пробовали руководствоваться ключемъ для опредѣленія родовъ г. Sharpe'a (Cat. B. Brit. Mus., VII, pag. 324), но ни къ какому положительному результату придти не могли. Рода *Trochalopteron* и *Janthocincla* различены, главнымъ образомъ, формой и положеніемъ ноздреваго отверстія и характеризованы такъ (l. c., pp. 326–327.):

e⁷ Nostrils nearly covered with bristls, nasal opening longitudinal, with a large operculum. Rictal bristls soft and long.
g⁸ Feathers of head ordinary, without stiffened shafts. .... *Trochalopterum.*
f⁷ Nostrils nearly hidden by bristls, rounded and exposed in front; bill long, exceeding the hind toe and claw..... *Janthocincla.*

Изъ двухъ ранѣе извѣстныхъ видовъ рода *Trochalopteron*, которые мы имѣли въ рукахъ, по вышеприведенному діагнозу опредѣляется только *T. Ellioti*; другой же видъ—*T. cinereiceps*—долженъ быть отнесенъ къ роду *Janthocincla*. По формѣ и положенію ноздревыхъ отверстій этотъ видъ невозможно отдѣлить отъ *J. maxima* и *J. lunulata*. У всѣхъ трехъ видовъ ноздревыя отверстія коротко-овальныя, открываются въ передней части ноздревой впадины слегка наискось и окружены operculum'омъ со стороны конька и лба. Край operculum'а безъ утолщенія, но у всѣхъ трехъ видовъ съ болѣе или менѣе рѣзкимъ, но вообще слабымъ, выступомъ, который придаетъ ноздревымъ отверстіямъ слегка бобовидную форму. Кромѣ того *T. cinereiceps* удовлетворяетъ и добавочному признаку рода *Janthocincla*, имѣя клювъ болѣе длинный, чѣмъ задній палецъ съ когтемъ. По формѣ и положенію ноздревыхъ отверстій, нашъ новый видъ нельзя отнести ни къ роду *Janthocincla*, ни къ роду *Trochalopteron*, по крайней мѣрѣ если принимать за типичныхъ представителей перваго *J. maxima* и *J. lunulata*, а втораго—*T. Ellioti*. У *T. Ellioti* ноздревыя отверстія узки, расположены вдоль клюва и занимаютъ всю длину ноздревой впадины. Operculum имѣетъ широкій выступъ, который придаетъ ноздревымъ отверстіямъ полулунную форму и край котораго сильно утолщенъ. У *T. Sukatschewi* ноздревыя отверстія также занимаютъ всю длину ноздревой впадины, какъ у *T. Ellioti*, но уже, расположены болѣе наискось и operculum не имѣетъ выдающагося утолщеннаго края, а только слабый выступъ, какъ у *J. maxima* и *J. lunulata*. Что касается до различія родовъ по степени прикрытія ноздрей щетинками, даваемаго въ ключѣ, то признакъ этотъ также не разрѣшаетъ нашего недоразумѣнія. Изъ 5 видовъ, которые мы упоминали здѣсь, ноздревыя щетинки наиболѣе обильны и болѣе прикрываютъ ноздри у *J. maxima* и *T. Sukatschewi*; менѣе обильны и меньше прикрываютъ ноздри—у *T. cinereiceps*, *T. Ellioti* и *J. lunulata*, въ особенности у двухъ послѣднихъ. Изъ всего вышесказаннаго намъ кажется несомнѣннымъ, что либо форма и положеніе ноздревыхъ отверстій не можетъ служить признакомъ для различія родовъ *Trochalopteron* и *Janthocincla*, либо родъ *Trochalopteron*, въ томъ объемѣ, какъ онъ принятъ въ Каталогѣ Британскаго Музея, родъ не естественный и нѣкоторые виды должны быть выдѣлены изъ него въ родъ *Janthocincla*, либо въ самостоятельный родъ.

Считаемъ еще не лишнимъ сказать о затрудненіи, какое мы встрѣтили при опредѣленіи по ключу г. Sharpe'a рода *aanthocincla*. Въ группѣ *Crateropodes* рода *Trochalopteron*, *Acanthoptila*, *Janthocincla* и *Gampsorhynchus* выдѣлены тѣмъ, что имѣютъ на клювѣ выемку (notch). Изъ 5 видовъ, которые мы упоминали, выемка эта рѣзка только у *T. Ellioti*—клювъ этого вида на концѣ съ зазубриной. У *T. cinereiceps* и *J. maxima* только не рѣзкое съуженіе конца верхней челюсти съ слабымъ изгибомъ линіи ея краевъ въ этомъ мѣстѣ. У *T. Sukatschewi* тоже самое, но еще въ менѣе рѣзкой формѣ, а у *J. lunulata* даже изгибъ линіи краевъ челюсти до того незначителенъ, что разсматривая клювъ десятки разъ, вы все таки остаетесь въ сомнѣніи, съ выемкой онъ или безъ выемки. Опредѣлить принадлежность *J. lunulata* къ роду *Janthocincla* по ключу даже съ приблизительной увѣренностью невозможно.

наго Члена Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, пожертвовавшаго послѣднему средства на предметъ присоединенія къ экспедиціи Г. Н. Потанина двухъ лицъ, А. И. Скасси, для топографической съемки, и М. Березовскаго, для составленія орнитологической коллекціи. Обработка этой коллекціи передъ читателемъ.

T. Sukatschewi найденъ мною въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ. Повсюду рѣдокъ. Живетъ высоко въ горахъ, главнымъ образомъ въ еловыхъ лѣсахъ, въ особенности тамъ, гдѣ они поросли бамбукомъ. Держится всегда, зимой и лѣтомъ, парами. Только разъ мнѣ пришлось наблюдать компанію штукъ въ 8, но и тутъ каждая пара держалась отдѣльно и сейчасъ же склпкалась, если случайно разошлась. Супруги необыкновенно привязаны другъ къ другу. Нѣсколько разъ, застрѣливъ одного, мнѣ случалось видѣть, какъ другой прибѣгалъ на помощь, не отходилъ отъ убитаго не смотря на мое приближеніе, бѣгалъ кругомъ и теребилъ его клювомъ, стараясь приподнять и поставить на ноги. Образъ жизни этотъ видъ ведетъ почти исключительно пѣшій, постоянно копаясь во мху и сухихъ листьяхъ и не выходя изъ чащи. Ночуетъ на деревьяхъ. На закатѣ солнца, собираясь заночевать, пары склпкаются чрезвычайно громко.

Janthocincla maxima, (J. Verr.)

[*Cinclosoma maximum*, David et Oust., Ois. Chine, p. 196, pl. 55.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 383.

Размѣры:

♂ Дл. 370—400. Разм. 420—445. Кр. 137—144. Кл. 29,5—35. Пл. 46—49. Хв. 183—200.
♀ » 365—375. » 415—425. » 133—140. » 30—33. » 45—47. » 173—190.

Экземпляры: дер. Дзю-юань, іюль, августъ; — гора Кунгала (по дорогѣ отъ г. Си-гу въ г. Сумпанъ), іюль;—дер. Сатани, ноябрь, декабрь, январь.

Зимой 1885 г. я встрѣтилъ этотъ видъ въ большомъ количествѣ въ заповѣдномъ лѣсу близъ дер. Сатани. Весь этотъ лѣсъ занимаетъ пространство не болѣе $^1/_4$ квадр. версты и въ немъ зимовало не менѣе нѣсколькихъ сотъ штукъ *C. maxima*, составлявшихъ одну колонію. Птицы держались обыкновенно на землѣ, табунками отъ десяти до нѣсколькихъ десятковъ вмѣстѣ, постоянно копаясь въ землѣ и сухихъ листьяхъ. Спугнутыя, онѣ съ крикомъ разлетались по деревьямъ и затѣмъ снова собирались вмѣстѣ въ сотнѣ шаговъ разстоянія. Замѣчательно, что въ другихъ ближайшихъ окрестностяхъ дер. Сатани я встрѣтилъ *J. maxima*, за три зимнихъ мѣсяца, всего только разъ—и лишь небольшое общество штукъ въ 5, — какъ будто въ сатанинскую заповѣдную рощу собрались зимовать птицы со всей округи. Въ другихъ частяхъ Сигученскаго и Минджеускаго округовъ я встрѣчалъ *J. maxima* крайне рѣдко, всего раза два или три, притомъ всегда только парами или выводками (осенью) высоко въ горахъ (11—12000 ф.). Молодая птица, добытая 10 августа близъ дер. Дзю-юань, была ростомъ уже со взрослую, но имѣла еще неотросшій хвостъ.

Janthocincla lunulata, J. Verr.

[*Cinclosoma lunulatum*, David et Oust., Ois. Chine, p. 195, pl. 53.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 385.

Размѣры:

♂ Дл. 280—300. Разм. 315—330. Кр. 102—111. Кл. 29—32. Пл. 39—42,5. Хв. 128—138.
♀ » 280—290. » 325—330. » 103—106. » 29—31,5. » 39—43,5. » 128—137.

Экземпляры: дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль, августъ; — дер. Чаго, декабрь;—дер. Сàтани, январь;—дер. Лянъ-дзя-коу (въ Шенси), апрѣль.

Этотъ видъ въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ не рѣдокъ, хотя его отнюдь нельзя назвать обыкновеннымъ. Одинъ экземпляръ добытъ мною въ провинціи Шенси, но въ пограничномъ Хойсянскомъ округѣ за цѣлую зиму ни разу не встрѣченъ. *J. lunulata* держится большею частью по опушкамъ лѣсовъ, въ особенности въ бамбуковыхъ зарослях, но въ горы высоко не заходитъ. Встрѣчается обыкновенно парами, рѣдко небольшими обществами. Молодыя птицы, найденныя 8 августа, еще плохо летали, но уже совершенно походили на взрослыхъ.

Pomatorhinus Styani, Seebohm.

[*Pomatorhinus ruficollis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 186, partim.]

Seebohm, Ibis 1884, p. 264.

Размѣры:

♂ Дл. 180—200. Разм. 240—245. Кр. 77—80. Кл. 20—22. Пл. 20—21. Хв. 81—86.
♀ » 170—195. » 230—235. » 76—77. » 20—22. » 19—20,5 » 78—85.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, ноябрь, февраль, мартъ;—дер. Сàтани, декабрь.

Г. Seebohm различаетъ три близкіе вида рода *Pomatorhinus*, которые большинство систематиковъ соединяло до сихъ поръ подъ однимъ общимъ названіемъ *P. ruficollis*, а именно: *P. ruficollis*, Hodgs., *P. stridulus*, Swinh. и, вновь отличенный авторомъ, *P. Styani*. Всѣ три вида имѣютъ горло и края перьевъ груди бѣлые и различаются, главнымъ образомъ, слѣдующимъ:

у *P. ruficollis* полоски на груди и нижняя сторона тѣла къ низу отъ груди рыжевато-бурыя.

у *P. stridulus* полоски на груди ярко каштановыя, въ рѣзкомъ контрастѣ съ цвѣтомъ нижней стороны тѣла къ низу отъ груди, которая рыжевато-бурая.

у *P. Styani* полоски на груди и нижняя сторона тѣла къ низу отъ груди одноцвѣтны—оливково-бурыя.

По цвѣту верхней стороны тѣла виды почти не различаются, кромѣ *P. Styani*, у котораго верхъ слегка болѣе оливковый и менѣе рыжій, чѣмъ у другихъ.

Всѣ наши экземпляры (9) какъ изъ юго-восточной, такъ и ю.-з. Гань-су по окраскѣ одинаковы. Всѣ они имѣютъ нижнюю сторону тѣла къ низу отъ груди и по-

лоски на послѣдней оливково-бурыя и, по вышеприведеннымъ діагнозамъ, должны быть отнесены къ виду *P. Styani*. За это говоритъ и сравненіе съ двумя экземплярами Музея Императорской Академіи Наукъ, полученными отъ г. Elwes'a и происходящими вѣроятно изъ Индіи, хотя мѣстонахожденіе, къ сожалѣнію, не обозначено. Нижняя сторона тѣла къ низу отъ груди и полоски на послѣдней у этихъ экземпляровъ рыжевато-бурыя, т. е. по діагнозамъ г. Seebohm'a это типичные *P. ruficollis*. Рыжій цвѣтъ у этихъ птицъ, кромѣ названныхъ частей, также довольно рѣзокъ на крыльяхъ, хвостѣ и на внутреннемъ краѣ нижней стороны внутренняго опахала маховъ,—чего у нашихъ экземпляровъ не замѣчается.

P. Styani довольно обыкновенъ въ гористыхъ частяхъ Хойсянскаго округа, встрѣчаясь въ мелкихъ кустарныхъ зарослях по увалам горныхъ долинъ. Въ Сигучепскомъ и Минджеускомъ округахъ рѣдокъ. За все время я встрѣтилъ его здѣсь только два раза. Пара, встрѣченная 16 іюня около дер. Іо-дзамъ-пу, была съ выводкомъ и молодыя, хотя плохо, но уже летали.

Pomatorhinus gravivox, A. David.

[*Pomatorhinus gravivox*, David et Oust., Ois. Chine, p. 183, pl. 49.]

David et Oustalet, Ois. Chine, p 183, pl. 49.

Размѣры:

♂ Дл. 240—270. Разм. 280—305. Кр. 89—97. Кл. 32—40. Пл. 32,5—35. Хв. 100—108.
♀ » 235—260. » 270—290. » 84—92. » 31—37,5. » 31—34. » 83—104.

Экземпляры: Округъ г. Хой-сяна, январь, февраль, мартъ;—дер. Сатани, декабрь, январь;—дер. Іо-дзамъ-пу, май, іюнь, іюль;—дер. Джоза-паза, октябрь;—дер. Чаго, декабрь.

Въ Каталогѣ птицъ Британскаго Музея *P. gravivox* приведенъ какъ синонимъ *P. Macclellandi*, Jerd.[1]). На основаніи значительной разницы въ величинѣ этихъ птицъ, мы сильно сомнѣваемся въ правильности такого отождествленія.

По Г. Hume'у[2]) у *P. Macclellandi* крыло ♂ (3 экз.) 3,25—3,4″=82,6—86,4 мм.; ♀ (3 экз.) 3—3,3″=76,2—83,8 мм.

У нашихъ экз. *P. gravivox* крыло ♂ (14 экз.) 89 — 97. мм., ♀ (10 экз., 84—92 мм.

Различіе въ величинѣ довольно рѣзкое, въ особенности, если принять во вниманіе количество измѣренныхъ экземпляровъ. Весьма вѣроятно, что кромѣ величины найдутся и другія различія, но судить объ этомъ по описаніямъ, безъ сравненія экземпляровъ, невозможно [3]).

Г. David говоритъ въ «Oiseaux de la Chine», что на 6-ти добытыхъ имъ экземплярахъ *P. gravivox*, онъ не могъ констатировать никакого различія въ цвѣтѣ опере-

---

[1]) Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 431.

[2]) Str. Feath., XI, p. 150.

[3]) Г. Hume (l. c.) высказываетъ предположеніе, что подъ описаніемъ *P. Macclellandi* у Godwin-Austen'a скрывается другой видъ; — не будетъ ли это *P. gravivox?*

нія половъ. Различіе однако есть, хотя и не особенно рѣзкое. Самецъ отличается отъ самки, кромѣ величины, яркостью и чистотою цвѣтовъ. Онъ имѣетъ темныя полоски на груди ярко-черныя, середину живота чисто бѣлую, бока тѣла ярко и чисто-рыжія. У самки всѣ цвѣта грязноваты и кромѣ того бока тѣла съ оливковымъ оттѣнкомъ.

Считаемъ не лишнимъ упомянуть о замѣчательной уродливости. У одного изъ нашихъ экземпляровъ 12-й махъ праваго крыла какъ бы перенесенъ съ лѣвой стороны: выпуклость пера направлена не къ верху, а къ низу и окраска обратная (верхъ свѣтло сѣрый, низъ оливковый), положеніе же широкаго и узкаго опахала — нормальное.

P. gravivox встрѣченъ мной какъ въ Хойсянскомъ, такъ и въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ, но повсюду въ небольшомъ количествѣ. Этотъ видъ живетъ, главнымъ образомъ, въ культурномъ поясѣ горъ въ мелкихъ и густыхъ кустарныхъ зарослях, въ особенности по пашеннымъ межамъ и террасамъ. Выше въ горы заходитъ рѣдко. Держится всегда парами и супруги очень привязаны другъ къ другу. Кромѣ дѣйствительно очень громкаго и страннаго голоса этого вида, о которомъ упоминаетъ David и который слышится только въ сумерки, мнѣ случалось слышать еще крикъ тревоги, очень напоминающій трещаніе дрозда. Такъ кричатъ лишь птицы, застигнутыя совершенно въ расплохъ. *P. gravivox* очень умная и осторожная птица, добыть которую довольно трудно, что впрочемъ зависитъ главнымъ образомъ отъ образа ея жизни. Она живетъ въ строго опредѣленной мѣстности, за границы которой не переходитъ, держится всегда въ кустарной чащѣ и летаетъ лишь въ крайнемъ случаѣ и на самое ничтожное разстояніе. Замѣтивъ опасность, она уходитъ не торопясь по землѣ, либо перебираясь съ вѣтки на вѣтку. Можно прожить въ данной мѣстности мѣсяцы и не подозрѣвать ея присутствія, пока его не откроетъ случай.

Dryonastes sannio (Swinhoe).

[*Garrulax sannio*, David et Oust., Ois. Chine, p. 192.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 459.

Размѣры:

♂ Дл. 255—265. Разм. 305—315. Кр. 98—101. Кл. 23—24. Пл. 34—35. Хв. 107—112.
♀ » 220—240. » 300—305. » 93—95. » 23—24. » 33—34. » 102—107.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, ноябрь, февраль, мартъ.

Въ Хойсянскомъ округѣ, въ особенности вблизи г. Хой-сяна, этотъ видъ чрезвычайно многочисленъ. Нѣтъ буквально ни одной заросли колючихъ кустарниковъ на кладбищахъ, ни одной живой изгороди около огородовъ и садовъ, гдѣ бы не копошилось по нѣсколько штукъ этихъ птицъ. Встрѣчается и въ гористой части округа, но тамъ сравнительно рѣже и высоко въ горы не заходитъ. Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ этотъ видъ не найденъ.

Conostoma aemodium, Hodgs.

[*Conostoma aemodium*, David et Oust., Ois. Chine, p. 207.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 485.

Размѣры:

♂ Дл. 285—295. Разм. 380—385. Кр. 126—129. Кл. 25. Пл. 40. Хв. 135—140.
♀ » 270—290. » 350—375. » 116—120. » 22,5—24. » 37—40. » 126—134.

Радужина сѣро-желтая, иногда съ коричневымъ оттѣнкомъ. Клювъ оранжево-желтый.

Экземпляры: дер. Сàтани, январь, ноябрь, декабрь; — дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь.

Этотъ видъ найденъ въ Сигученскомъ округѣ и смежныхъ частяхъ Минджеускаго, но повсюду очень рѣдокъ. Встрѣчается парами въ самыхъ густыхъ бамбуковыхъ зарослях на высотѣ не менѣе 9000 футъ.

Suthora webbiana, Gray.

[*Suthora webbiana*, David et Oust., Ois. Chine, p. 208.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 490.

Размѣры:

Дл. 120—140. Разм. 150—165. Кр. 49—56. Кл. 7—9. Пл. 19—21,5. Хв. 60—73.

Экземпляры: г. Хой-сянъ, ноябрь, декабрь; — дер. Лапъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ; — дер. Іо-дзамъ-пу, августъ.

Этотъ видъ весьма обыкновенен какъ въ Хойсянскомъ, такъ и въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ, впрочемъ въ двухъ послѣднихъ округахъ встрѣчается сравнительно рѣже. Держится всегда болѣе или менѣе многочисленными табунками по кустарнымъ зарослямъ долинъ и предгорій и высоко въ горы не проникаетъ.

Suthora conspicillata, David.

[*Suthora conspicillata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 211, pl. 65.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 489.

Размѣры:

Дл. 120—150. Разм. 165—170. Кр. 51—56. Кл. 7,5—9. Пл. 18—20,5. Хв. 69—79.

Экземпляры: уроч. Кванъ-дзя-коу (50 верстъ на востокъ отъ г. Хой-сяна), декабрь, январь; — дер. Сàтани, январь; — дер. Чаго, январь; — дер. Іо-дзамъ-пу, іюль.

Этотъ видъ не рѣдокъ какъ въ гористыхъ частяхъ Хойсянскаго, такъ и въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ; — въ послѣднихъ двухъ болѣе обыкновенен. Держится небольшими табунками по кустарнымъ опушкамъ горныхъ лѣсовъ и въ глубокія долины не спускается.

Suthora Przewalskii, sp. nov.

Табл. II, фиг. 1.

Размѣры:

♂ Дл. 130. Разм. 160. Кр. 55. Кл. 8. Пл. 19. Задн. пал. съ когт. 11. Хв. 70.
♀ » 145. » 160. » 56. » 8. » 18. » 11. » 80.
? » 137. » 165. » 56,5. » 7. » 20. » 11. » 78.

Экземпляры: дер. Іо-дзамъ-пу, іюль, августъ; — дер. Сатани, декабрь.

Описаніе. Нарядъ самца и самки одинаковъ.

Верхъ головы и затылокъ пепельно-сѣрые. *Поздревыя перья, уздечки и лобъ* коричнево-черные. Ото лба идетъ надъ глазомъ и вдоль верхней границы ушныхъ перьевъ черно-коричневая *надбровная полоса*, которая у̀же и свѣтлѣе надъ глазомъ и шире и темнѣе къ затылку. *Передняя часть спины* оливково-сѣрая. *Задняя часть спины, плечевыя, надхвостье и верхнія кроющія* хвоста оливково-буланыя, цвѣтъ этотъ болѣе ярокъ на плечевыхъ и надхвостьи. *Пространство около глазъ, зьяки, подбородокъ, зобъ и верхняя часть груди* коричневаго цвѣта, который на груди слегка ярче въ серединѣ ея и блѣднѣе къ низу. *Бока груди* сѣрые съ коричневымъ оттѣнкомъ. *Бока шеи и ушныя перья* дымчато-сѣрыя, основная часть послѣднихъ съ коричневымъ оттѣнкомъ. *Бока тѣла, животъ, подхвостье и нижнія кроющія хвоста* буланаго цвѣта, болѣе яркаго на нижней части боковъ тѣла. *Всѣ верхнія кроющія крыла и маховъ* буланыя съ оливковымъ оттѣнкомъ; внутреннія опахала среднихъ кроющихъ черноваты. *Внѣшнія опахала всѣхъ маховъ* буланыя, у главныхъ въ основной части съ рыжеватымъ оттѣнкомъ. *Внутреннія опахала* у маховъ 1-го и 2-го порядковъ сѣро-черныя, у маховъ 3-го порядка оливково-бурыя, — у всѣхъ маховъ, кромѣ перваго, съ свѣтлой буланой оторочкой, которая у главныхъ маховъ только въ основной и средней части, а у маховъ 2-го и 3-го порядковъ по всему внутреннему опахалу и переходитъ на внѣшнее. *Всѣ нижнія кроющія крыла* свѣтло-буланыя. *Подмышечныя* бѣловато-сѣрыя. *Рули* сѣро-оливковые, съ болѣе яркими, такого же цвѣта, оторочками по наружнымъ опахаламъ.

Радужина у старой самки, добытой въ іюлѣ, кирпично-красная, у молодого самца, добытаго въ августѣ, охристо-желтая. *Клювъ* розоватый съ бѣлымъ концомъ верхней челюсти и желтоватымъ оттѣнкомъ на нижней. *Плюсны* синевато-сѣрыя.

Крыло закругленное: 6-й махъ самый длинный; 1-й махъ, занимающій по длинѣ (на сложенномъ крылѣ) мѣсто между предпослѣднимъ и послѣднимъ махами 3-го порядка, не доходитъ до вершины крыла на 22—26 мм.; 2-й на 12—15; 3-й на 6—7; 4-й на 2—3; 5-й на 1 мм. *Хвостъ* сильно ступенчатый. Первый (внѣшній) руль не доходитъ до конца хвоста на 48—51 мм., 2-й на 26, 3-й на 10—15 мм. Четыре среднихъ руля почти одинаковой длины.

Видъ этотъ мы посвящаемъ памяти Николая Михайловича Пржевальскаго.

S. Przewalskii рѣдкая птичка въ южной Гань-су. Я встрѣтилъ ее всего три раза. Первый разъ въ началѣ іюля 1886 г. близъ дер. Іо-дзамъ-пу, Миньжеускаго округа, высоко въ горахъ, въ рѣдкомъ лиственномъ лѣсу по крутой каменной розсыпи. Пти-

чекъ было только пара. Они держались на деревьяхъ и вели себя какъ синицы, подвѣшиваясь къ вѣтвямъ и тщательно ихъ изслѣдуя. Добыта только самка. Затѣмъ въ окрестностяхъ той же деревни былъ встрѣченъ въ серединѣ августа небольшой табунокъ, вѣроятно выводокъ. Онъ держался на покати крутаго увала быстро перелетая отъ куста къ кусту и почти не останавливаясь. Добытъ молодой самецъ, еще не вполнѣ перелинявшій. Наконецъ, въ декабрѣ того же года небольшой табунокъ этихъ птичекъ попался, въ ущельи р. Та-хей-гоу, лежащемъ къ югу отъ дер. Сатани, Сингученскаго округа. Птички держались въ бамбуковой заросли на высотѣ примѣрно 9—10000 футъ. Добытый экземпляръ, въ очень хорошемъ свѣжемъ оперенiи, но полъ котораго къ сожалѣнiю не опредѣленъ, послужилъ типомъ для прилагаемаго рисунка.

Cholornis paradoxa, J. Verr.

[*Cholornis paradoxa*, David et Oust., Ois. Chine, p. 205, pl. 62.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 498.

Размѣры:

♂ Дл. 220—235. Разм. 270—290. Кр. 95—100. Кл. 14—14,5. Пл. 26—27,5. Хв. 113—120.
♀ » 210—225. » 270—280. » 90—99. » 14—14,5. » 26—27,5. » 109—120.

Экземпляры: Дер. Сатани, октябрь, ноябрь, декабрь;—дер. Іо-дзамъ-пу, май, іюнь, іюль.

Этотъ видъ не рѣдокъ въ Сингученскомъ и Минджеускомъ округахъ, въ Хойсянскомъ же не встрѣченъ. Держится преимущественно въ бамбуковыхъ зарослях съ высоты 8—9000 футъ, обыкновенно небольшими табунками въ 5—10 штукъ. Птички постоянно въ движенiи. Они лазятъ по бамбуковымъ стволамъ, тщательно ихъ изслѣдуя, перебираются по вѣтвямъ на сосѣднiя или перелетаютъ немного подальше, такимъ образомъ весь табунокъ постепенно подвигается впередъ. Замѣтивъ человѣка, табунокъ непремѣнно пріостановится или даже свернетъ съ дороги и приблизится, чтобы полюбопытствовать. Табунки я встрѣчалъ до конца іюня, въ началѣ же іюля попадались только отдѣльныя пары.

Paradoxornis guttaticollis, A. David.

[*Paradoxornis guttaticollis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 203, pl. 64.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 497.

Размѣры:

♂ Дл. 195—200. Разм. 270—275. Кр. 86—91. Кл. 16—17. Пл. 26,5—27. Хв. 100—108.
♀ » 200. » 265. » 86. » 16,5. » 26,6. » 105.

Экземпляры: Дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ.

Этотъ видъ добытъ мной въ провинцiи Шенси близъ ю.-в. границы Гань су. Птички попадались парами въ густыхъ, но не высокихъ кустарныхъ зарослях, въ мѣстности гористой, но сравнительно не высокой (примѣрно 4 — 5000 футъ). Въ Гань-су *P. guttaticollis* не встрѣченъ.

Fulvetta cinereiceps (J. Verr.)

[*Fulvetta cinereiceps*, David et Oust., Ois. Chine, p. 220, pl. 73.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 628.

Размѣры:

♂ Дл. 125—135. Разм. 175—182. Кр. 56—61. Кл. 10—10,7. Пл. 21—22. Хв. 59—64.
♀ » 125—130. » 175—180. » 57. » 10,5—11. » 20,5—21. » 59—63.

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, іюль;—дер. Сатани, октябрь, ноябрь, декабрь;—дер. Іо-дзамъ-пу, іюль.

Этотъ видъ довольно обыкновенень въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ съ 6—7000 футъ высоты и заходитъ, въ особенности лѣтомъ, до 10000 и даже выше. Найденъ также въ ю.-з. Гань-су, въ горахъ, на границѣ Шенси, но здѣсь сравнительно рѣдокъ. *F. cinereiceps* встрѣчается обыкновенно, табунками въ 10—15 штукъ, по опушкамъ лѣсовъ и даже въ сплошныхъ лѣсахъ, хотя рѣдко. Птички держатся большею частью около земли, въ кучахъ хвороста, у корней кустарниковъ и на нижнихъ вѣтвяхъ послѣднихъ. Подобно нѣкоторымъ видамъ синицъ, крайне довѣрчивы и любопытны. Замѣтивъ человѣка, непремѣнно подберутся поближе, чтобы его разсмотрѣть и, если застрѣлить одну, остальныя не разлетаются а, собравшись въ кучку, жалобно пищатъ.

Fulvetta ruficapilla (J. Verr.)

[*Fulvetta ruficapilla*, David et Oust, Ois. Chine, p. 221, pl. 72.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 629.

Размѣры:

♂ Дл. 120. Разм. 165. Кр. 57. Кл. 10. Пл. 19,5. Хв. 56.
♀ » 110. » 155. » 51. » 10. » 19. » 53.

Экземпляры: Уроч. Кванъ-дзя-коу (къ востоку отъ г. Хой-сяна), декабрь, мартъ;—дер. Сатани, январь;—дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь;—дер. Лотани, сентябрь, октябрь;—дер. Чаго, декабрь.

Этотъ видъ найденъ какъ въ ю.-в., такъ и въ ю.-з. Гань-су, но нигдѣ особенно не многочисленъ. Встрѣчается, небольшими табунками въ 5—10 штукъ, въ мелкихъ кустарныхъ зарослях культурнаго пояса горъ до высоты 7—7500 футъ, выше въ горы не заходитъ. По образу жизни похожъ на предъидущій видъ.

Yuhina diademata, J. Verr.

[*Yuhina diademata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 138, pl. 69.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 632.

Размѣры:

♂ Дл. 172. Разм. 247. Кр. 79. Кл. 14. Пл. 21. Хв. 81.
♀ » 175. » 225—237. » 73—74. » 14—15. » 20—21. » 76—79.

Экземпляры: Окр. г. Хой-сянъ, январь, мартъ, апрѣль.

Этотъ видъ найденъ въ небольшомъ числѣ въ восточной гористой части Хойсянскаго округа и на границѣ Гань-су съ Шенси. Держится по кустарнымъ зарослямъ вблизи скалъ, нерѣдко въ компаніи съ *Pycnonotus xanthorrhous*. Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ не встрѣченъ.

Suya crinigera, Hodgs.

[*Suya striata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 258, pl. 18.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 177.

Размѣры:

♂ Дл. 170. Разм. 160. Кр. 49. Кл. 13. Пл. 19. Хв. 94.
♀ » 150—165. » 150—160. » 47—49. » 12—13. » 18. » 85—94.

Экземпляры: Окр. г. Хой-сянъ, мартъ.

Этотъ видъ встрѣченъ мной всего три раза, ранней весной, и только въ Хойсянскомъ округѣ. Всѣ раза птички держались парами на покатяхъ безлѣсныхъ горъ, въ густыхъ травянистыхъ зарослях около скалъ.

MUSCICAPIDAE.

Hemichelidon fuliginosa, Hodgs.

[*Butalis sibirica*, David et Oust., Ois. Chine, p. 122, partim.]

Henderson and Hume, Lahore to Yark., p. 181, pl. IV.—*Hemichelidon sibirica*, Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV p. 120, partim.

Размѣры:

♂ Дл. 125—135. Разм. 230. Кр. 76. Кл. 11,5—12. Пл. 10—11. Хв. 50—51.
♀ » —— » — » 75. » 12. » 11. » 51.

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, іюль, августъ;—дер. Іо дзамъ-пу, май;—дер. Лотапи, сентябрь.

Наши экземпляры всѣ (6) очень темно окрашены и подобны птицѣ, изображенной въ «Lahore to Yarkend». Она рѣзко отличаются отъ амурскихъ и сибирскихъ экземпляровъ *H. sibirica* Музея Императорской Академіи Наукъ, которые всѣ безъ исключенія гораздо свѣтлѣе. Различіе очень рѣзко даже на молодыхъ птицахъ въ гнѣздовомъ пятнистомъ перѣ. Мы не рѣшаемся, поэтому, считать *H. fuliginosa* за синонимъ *H. sibirica*, какъ это дѣлаетъ большинство авторовъ.

Этотъ видъ найденъ въ небольшомъ количествѣ гнѣздующимъ въ Сигученскомъ и Миндзеускомъ округахъ. Встрѣчается на высотѣ до 9000 футъ. Птички держатся въ долинахъ—на отдѣльно стоящихъ высокихъ деревьяхъ, на увалахъ—по опушкамъ лѣсовъ. Молодая птица, добытая въ концѣ сентября, была еще въ гнѣздовомъ пятнистомъ перѣ.

Hemichelidon ferruginea, Hodgs.

[*Butalis ferruginea*, David et Oust., Ois. Chine, p. 121.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 122.

Размѣры:

♂ Дл. 130. Разм. 220. Кр. 69—72. Кл. 13,5—14. Пл. 11. Хв. 49—52.
♀ » 130. » 220. » 71. » 14. » 11. » 50.

Экземпляры: дер. Іо-дзамъ-пу, май, іюль.

Этотъ видъ найденъ, подобно предъидущему, гнѣздующимъ въ небольшомъ количествѣ въ Сигученскомъ и Миндзеускомъ округахъ. Оба вида часто встрѣчаются вмѣстѣ, но *H. ferruginea* предпочитаетъ, кажется, опушки лиственныхъ лѣсовъ въ долинахъ и рѣже встрѣчается въ горахъ.

Alseonax latirostris (Raffl.).

[*Butalis latirostris*, David et Oust., Ois. Chine, p. 123.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 127.

Размѣры:

♂ Дл. 140. Разм. 235. Кр. 75. Кл. 13. Шир. Кл. 6. Пл. 13. Хв. 54.
♀ » 135. » 217. » 76. » 14. » 4. » 13. » 52.

Экземпляры: монаст. Шине-суме (Ордосъ), сентябрь.

Два наши экземпляра, оба добытые въ одной и той же мѣстности, въ одно и то же время и сходные по окраскѣ, рѣзко различаются клювомъ. У нашего самца клювъ въ полтора раза шире, чѣмъ у самки и по формѣ похожъ на клювъ рода *Hemichelidon*. Онъ съуживается не постепенно, а рѣзкимъ уступомъ къ концу, такъ что линія краевъ челюстей (если смотрѣть сверху) изъ выпуклой переходитъ передъ концомъ клюва въ вогнутую, а самый кончикъ послѣдняго заостренъ. У нашей самки клювъ съуживается постепенно и линія краевъ челюстей по всему протяженію слегка выпуклая. Многочисленная коллекція экземпляровъ этого вида Музея Императорской Академіи Наукъ, которую, благодаря любезности Ѳ. Д. Плеске, мы имѣли случай видѣть, также представляетъ большое разнообразіе по формѣ и ширинѣ клюва. Нашъ экземпляръ принадлежитъ къ числу самыхъ ширококлювыхъ.

Въ южной Гань-су *A. latirostris* не встрѣченъ.

Erythrosterna albicilla (Pall.).

[*Erythrosterna albicilla*, David et Oust., Ois. Chine, p. 120, pl. 79.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 162.

Размѣры:

Дл. 120—140. Разм. 205—217. Кр. 67—70. Кл. 12—13,5. Пл. 16. Хв. 53.

Экземпляры: уроч. Боро-балгасунъ (Ордосъ), сентябрь; — дер. Лотани, сентябрь.

Г. Seebohm[1]), вѣроятно совершенно правильно, соединяетъ *E. albicilla* съ *E. parva* и подробно мотивируетъ свое мнѣніе. Всѣ наши экземпляры не имѣютъ никакихъ признаковъ оранжеваго цвѣта на груди, т. е. это самки или молодые самцы, которые по словамъ всѣхъ авторовъ въ обоихъ видахъ не различимы. Не будучи, такимъ образомъ, въ состояніи самостоятельно разобраться въ этомъ вопросѣ, мы называемъ нашихъ птицъ *E. albicilla* только на основаніи географическаго положенія мѣстъ, гдѣ они добыты.

---

[1]) Hist. Brit. B., I, p. 333—336.

Poliomyas Hodgsoni (J. Verr.).

[*Siphia Hodgsoni*, David et Oust., Ois. Chine, p. 115.]

Sharpe, Cat B. Brit. Mus., IV, p. 203.

Размѣры:

♂ Дл. 130—140. Разм. 205—215. Кр. 68—73. Кл. 11—12. Пл. 14—15. Хв. 54—57.
♀ » 130. » 215. » 70. » 12. » 15. » 56.

Радужина темно-бурая. Клювъ: верхняя челюсть черная, нижняя черно-бурая. Плюсны рыжевато-черныя.

Экземпляры: дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль; — дер. Джазà-пазà, сентябрь, начало октября.

Даемъ описаніе нарядовъ самки и птицы въ гнѣздовомъ опереніи, которые еще не были извѣстны.

Самка въ поношенномъ лѣтнемъ опереніи (начало іюля):

Верхъ головы оливково-бурый [1]), на лбу съ рыжеватымъ оттѣнкомъ. Надъ глазомъ неясная сѣро-оливковая *надбровная полоса*. *Вокругъ глазъ колечко* грязно-бѣлаго цвѣта. *Уздечки, щеки и ушныя перья* оливково-желтоватыя; середина перьевъ болѣе яркаго цвѣта, что придаетъ этимъ частямъ чешуйчатый видъ. *Спина и плечевыя* перья оливково-бурыя, какъ верхъ головы. *Надхвостье и верхнія кроющія хвоста* оливково-рыжія. *Подбородокъ, горло, грудь и бока ея* оливково-желтоватаго цвѣта, болѣе свѣтлаго на первыхъ двухъ и болѣе густаго на вторыхъ. *Бока тѣла и подхвостье* буланые [2]). *Середина живота* бѣловатая. *Всѣ верхнія кроющія крыла* бурые, съ оливково-бурыми (цвѣта спины) оторочками по наружнымъ опахаламъ; оторочки концовъ среднихъ кроющихъ бѣловаты. *Махи* бурые, съ оливково-бурыми (цвѣта спины) оторочками по наружнымъ опахаламъ; внутреннія опахала маховъ 1-го и 2-го порядковъ съ грязно-бѣлой оторочкой въ основной части. *Всѣ нижнія кроющія крыла и подмышечныя* буланыя, подобно подхвостью. *Рули* бурые, съ рыжеватой оторочкой по наружному опахалу, которая въ основной части рулей становится ярко-рыжею. Никакихъ слѣдовъ бѣлаго цвѣта у основанія рулей, который рѣзокъ у самца въ полномъ нарядѣ.

Птица въ гнѣздовомъ нарядѣ (20 іюля):

Верхъ головы и спина буро-черныя съ оливково-желтымъ оттѣнкомъ и желтовато-бѣлыми узкими и рѣзкими наствольными полосками, которыя на спинѣ шире. *Надхвостье и верхнія кроющія хвоста* оливково-рыжія съ неясными черными поперечными полосками. *Нижняя сторона тѣла* свѣтлѣе верхней и пятнистая: каждое перо имѣетъ желтовато-бѣлую середину, сѣрую основную часть и сѣровато-черный ободокъ по краямъ. *Рули и махи* — какъ у самки, только оторочки среднихъ кроющихъ крыла шире и желтѣе.

---

[1]) Ridgway, Nomencl. Colors, pl. III, n° 9.
[2]) Ibid., pl. V, n° 13.

Молодые самцы, добытые поздней осенью (въ началѣ декабря), похожи на вышеописанную самку, но имѣютъ оливково-зеленый оттѣнокъ въ оперенiи болѣе яркiй, что зависитъ, повидимому, исключительно только отъ свѣжести пера.

Полный нарядъ, съ рыжей грудью и бѣлыми основанiями рулей, самецъ получаетъ, вѣроятно, только послѣ второй линьки, такъ какъ начинаетъ гнѣздовать еще въ нарядѣ самки. Самецъ, добытый въ одно время съ вышеописанной самкой и составлявшiй съ ней пару, которая собиралась, судя по ея поведенiю, гнѣздовать, отличается отъ самки только тѣмъ, что имѣетъ на зобу слабые слѣды мутно-оранжеваго цвѣта.

Этотъ видъ встрѣченъ мною только въ Минджеускомъ округѣ и въ небольшомъ количествѣ, въ густыхъ лиственныхъ лѣсахъ на высотѣ отъ 7000 футъ и выше. *P. Hodgsoni* очень пугливая и осторожная птичка, которая держится притомъ всегда молчаливо на вершинахъ деревьевъ. Открыть ее трудно, въ особенности самку, такъ какъ по скромной одѣждѣ ее нельзя отличать издалека отъ пѣночки. На десятокъ самцовъ мнѣ удалось добыть только одну самку и то только благодаря особенности поведенiя этого вида въ перiодъ гнѣздованiя. Пара выбираетъ для гнѣздованiя довольно обширный лѣсной участокъ, въ которомъ съ криками преслѣдуетъ всякаго, кто тамъ появится. Крики эти очень громки и могутъ быть переданы словами «де-витъ, . . . де-витъ, ... дэ», за которыми немного спустя слѣдуетъ слабый трескучiй звукъ въ родѣ «крр . . .». Другаго голоса мнѣ слышать не приходилось.

Terpsiphone Incei (Gould.).

[*Thitrea Incei*, David et Oust., Ois. Chine, p. 112, pl. 82.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 330.

Размѣры:

♂ Кр. 98. Кл. 21,5. Пл. 13,5. Хв. 350.

Экземпляръ: Г. Бао-динъ-фу (Чжилiйской провинцiи), iюнь.

Мы имѣемъ лишь одинъ экземпляръ этого вида, добытый на Пекинской равнинѣ. Это старый самецъ каштанового цвѣта и съ длинными рулями.

Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ этотъ видъ не встрѣченъ, но возможно, что онъ гнѣздится въ восточной части Ганьсу. Въ Хойсянскомъ округѣ я слышалъ разсказы о какой то длиннохвостой птичкѣ, прилетающей туда лѣтомъ. Судя по описанiямъ, она очень похожа на *T. Incei*.

Cryptolopha tephrocephala (Anderson).

[*Cryptolopha tephrocephala*, David et Oust., Ois. Chine, p. 272.]

Culicipeta tephrocephala: Anderson, Proc. Zool. Soc. 1871, p. 213.—Blyth et Walden, Journ. Asiat. Soc. Beng. 1875, extra-№, p. 107 (partim: ex Karen hills). — Anderson, West. Yunnan Exp., p. 626, pl. L (1878).

Culicipeta Burkii: A. David, Nouv. Arch. du Mus., Bull. VII, p. 51 (1871).

Cryptolopha tephrocephala: Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond 1871, p. 358.—David et Oustalet, Ois. Chine, p. 272 (1877).

Cryptolopha affinis: Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 398 (1879, partim).

Cryptolopha Burkii: Hume, Str. Feath., XI, p. 224 (1888).

? Neornis strigiceps: Hodgson in Gray's Zool. Misc. p 82 (1844);—id. Icon. Ined. Brit. Mus., teste Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 395; cf. footn. ibid.

Размѣры:

♂ Дл. 125–130. Разм. 170–180. Кр. 56–58. кл. 12,5. Шир. кл. 5–5,2. Пл. 18. Хв. 49–50. } (a)
♀ Дл. 115– Разм. —— Кр. 53,5–54,5. Кл. 12,5–13. Шир. кл. 5. Пл. 18. Хв. 46–47. }
? Дл. —— Разм. —— Кр. 56–62. Кл. 12,5–13,5. Ш. кл. 5–5,3. Пл. 18. Хв. 47–54. (b)

Экземпляры: a. Дер. Io-дзамъ-пу, іюнь, іюль;—b. дер. Лотани, сентябрь, середина октября.

Въ вышеприведенной синониміи исключены цитаты, относящіяся до Бирмы, такъ какъ по нашему мнѣнію бирманскія птицы принадлежатъ къ отличному отъ *C. tephrocephala*, Anderson'a. виду. Мы пришли къ этому заключенію на основаніи сравненія нашихъ экземпляровъ, съ одной стороны—съ описаніемъ и рисункомъ Anderson'a и съ экземплярами изъ Муппина David'a [1]), съ другой стороны—съ описаніями «*C. tephrocephala*» индійскихъ орнитологовъ и съ экземпляромъ этого вида, хранящимся въ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ [2]).

Наши птицы очень похожи въ общемъ на *C. Burkii*, Burt., но отличаются отъ этого вида бо̀льшимъ развитіемъ сѣраго цвѣта на головѣ. У *C. Burkii* верхъ головы и затылокъ, въ промежуткѣ между черными полосами по бокамъ ихъ,—зеленые съ самой незначительной примѣсью сѣраго цвѣта; надглазная и надъушная области оливково-зеленыя, совершенно одноцвѣтныя. У нашихъ птицъ верхъ головы и затылокъ—сѣрые съ небольшой примѣсью зеленаго цвѣта; надглазная же и надъушная области двуцвѣтныя—оливково-зеленыя съ примѣсью сѣраго цвѣта по внѣшнему краю черныхъ головныхъ полосъ. Эта примѣсь едва замѣтна надъ глазомъ и увеличивается

---

[1]) Экземпляры David'a хранятся въ Музеѣ Jardin des Plantes въ Парижѣ. Приносимъ благодарность г. Oustalet, показавшему намъ ихъ

[2]) Экземпляры индійскихъ птицъ, послужившіе главнымъ образомъ для выясненія этого вопроса, были любезно предоставлены намъ ученымъ хранителемъ Музея О. Д. Плеске. Вотъ эти экземпляры.

C. Burkii ♂ Darjeeling, 22 V 1875.
» ? Darjeeling, Mandelli.
C. affinis ? Darjeeling, Mandelli.
C. tephrocephala, Lower Pegu, Oates, 5 XI 1879, (*burmanica*, nobis).

къ задп отъ него. Надъ ушами образуются по бокамъ затылка уже довольно ясныя, хотя не рѣзко ограниченныя и не совсѣмъ чистаго цвѣта, сѣрыя полосы, которыя, окружая концы черныхъ головныхъ полосъ, сливаются съ сѣрымъ пространствомъ между послѣдними. Цвѣтъ надглазной и надъушной областей есть кажется лучшій, хотя не бросающійся въ глаза, признакъ для различія двухъ видовъ. Нѣкоторые изъ нашихъ экземпляровъ (осенніе) имѣютъ на верху головы сравнительно значительную примѣсь зеленаго цвѣта къ сѣрому и ихъ легко принять за *C. Burkii*. Примѣсь сѣраго цвѣта по внѣшнему краю головныхъ полосъ однако съ разу отличаетъ ихъ отъ послѣдней. Другихъ отличій отъ *C. Burkii*, кромѣ выше поименованныхъ, наши птицы повидимому не имѣютъ [1]).

Всѣ наши экземпляры (11) очень однообразны и мало между собою разнятся. Осенніе, какъ мы уже замѣтили, имѣютъ немного большую примѣсь зеленаго цвѣта на верху головы и, кромѣ того, отличаются отъ лѣтнихъ болѣе яркимъ лимонно-желтымъ цвѣтомъ нижней стороны тѣла. Обѣ эти особенности очевидно зависятъ только отъ свѣжести оперенія.

Наши птицы совершенно сходны съ рисункомъ *C. tephrocephala* въ «Yunnan Expedition» и соотвѣтствуютъ діагнозу и размѣрамъ этого вида, даннымъ Anderson'омъ. Кромѣ того они также совершенно сходны съ экземплярами David'a, изъ Муппина Послѣднее обстоятельство, указывая на существованіе по западной границѣ Китая одного совершенно однороднаго и близкаго къ *C. Burkii* вида, дѣлаетъ тождество этого вида съ *C. tephrocephala*, Anders. несомнѣннымъ.

Бирманскія птицы, извѣстныя у индійскихъ орнитологовъ также подъ названіемъ *C. tephrocephala*, рѣзко отличаются отъ китайскихъ. Мы имѣли въ рукахъ только одинъ экземпляръ изъ Бирмы, но онъ сбора г. Oates'a и вполнѣ соотвѣтствуетъ его же описанію *C. tephrocephala* въ «Birds of British Burmah». Этотъ экземпляръ отличается отъ нашихъ слѣдующимъ:

Болѣе длиннымъ и въ $1^1/_2$ раза болѣе широкимъ клювомъ (длина его ото лба 14, отъ зѣвковъ 16, а ширина 7 мм.).

Бо́льшимъ развитіемъ сѣраго цвѣта на головѣ. Верхъ головы и затылокъ чисто сѣрые, а рядомъ съ внѣшнимъ краемъ черныхъ головныхъ полосъ идутъ совершенно рѣзкія и широкія сѣрыя полосы.

---

[1]) Можетъ быть наши птицы имѣютъ немного болѣе крупный клювъ, но различіе настолько невелико, что при маломъ матеріалѣ его съ увѣренностью нельзя даже констатировать. У двухъ, бывшихъ у насъ въ рукахъ, экземпляровъ *C. Burkii* длина клюва ото лба = 12 — 12,5 мм., ширина 5 мм. У нашихъ 11 экземпляровъ длина клюва=12—13,5, ширина=5—5,3 мм. Кромѣ того мы пробовали сравнивать длину клюва отъ зѣвковъ. У одного экземпляра *C. Burkii* (у другаго нижняя челюсть попорчена) она оказалась = 13 мм., у нашихъ же 14 — 15 мм. Разница довольно значительная, указывающая какъ будто на другое устройство клюва. Впрочемъ, размѣръ клюва отъ зѣвковъ берется на шкуркахъ съ трудомъ и зависитъ отъ способа приготовки послѣднихъ. Обращаемъ, во всякомъ случаѣ, на это различіе вниманіе.

Ярко желтымъ [1]) цвѣтомъ нижней стороны тѣла, который притомъ почти одинаковъ на подбородкѣ, груди и животѣ. У нашихъ птицъ низъ тѣла желтовато зеленый [2]) у лѣтнихъ, лимонно-желтый [3]) у осенних, подбородокъ же замѣтно свѣтлѣе остальнаго низа.

Различіе въ клювѣ особенно велико. Мы считаемъ потому не лишнимъ приложить изображеніе въ натуральную величину клювовъ бирманскаго и одного изъ нашихъ ганьсуйскихъ экземпляровъ.

Двѣ лѣвыя фигуры изображаютъ клювъ экземпляра г. Oates'а сбоку и снизу; двѣ правыя — тоже самое одного изъ нашихъ ганьсуйскихъ экземпляровъ.

Всѣ вышеприведенные признаки, въ особенности величина клюва, о которой упоминаютъ всѣ индійскіе орнитологи [4]), настолько рѣзко отличаютъ бирманскихъ птицъ отъ китайскихъ, что мы предлагаемъ выдѣлить первыхъ въ особую форму и назвать ее *Cryptolopha birmanica* [5]).

C. tephrocephala довольно обыкновенна лѣтомъ въ лѣсистыхъ горахъ ю.-з. Ганьсу. Встрѣчается на высотѣ въ 7—8000 футъ главнымъ образомъ въ кустарныхъ зарослях по опушкамъ лиственныхъ лѣсовъ, но попадается также, хотя рѣже, въ хвойныхъ лѣсахъ и бамбуковыхъ чащахъ.

---

[1]) Galston yellow, Ridgway, Nomencl. of Colors, pl. V. n^{o} 6.

[2]) Cambodge yellow, ibid., pl. VI, n^{o} 10.

[3]) Lemon yellow, ibid., pl. VI, n^{o} 11.

[4]) Первый обратилъ на это вниманіе г. Hume (Str. Feath, III, p. 140). Относя единственный экземпляръ изъ Upper Pegu сбора г. Oates'а къ виду *C. tephrocephala*, авторъ замѣтилъ, что этотъ видъ отличается отъ *C. Burkii*, кромѣ цвѣта головы, еще величиной клюва, на что Anderson не обратилъ вниманія. При этомъ г. Hume описался и вмѣсто большей величиной написалъ меньшей. Эта замѣтка, не смотря на ее ошибочность, перешла безъ оговорки въ «Yunnan Expedition». Безъ сомнѣнія Anderson замѣтилъ бы ошибку, если бы его типъ *C. tephrocephala* имѣлъ клювъ подобный клюву, изображеніе котораго мы помѣстили!

[5]) Вотъ предполагаемая синонимія этого вида:

Culicipeta tephrocephala: Hume et Davison, Str. Feath., II, p. 479 (1874). — Blyth et Walden, Journ. Asiat. Soc. Beng. 1875, extra-№, p. 107 (partim: ex Paphoon). — Hume, Str. Feath., III, p. 140 (1875).

Cryptolopha tephrocephala: Hume, Str. Feath., V, p. 113 (1877). — Hume et Davison, Str. Feath., VI, p. 358 (1878, partim: exclus. specim. ex Karenee Hills.).—Hume, Str. Feath., VIII, p. 102 (1879).—Bingham, Str. Feath., IX, p. 188 (1880). — Oates, Str. Feath., X, p. 223. — Id., B. Brit. Burmah., I, p. 271 (1883).

Cryptolopha affinis: Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 398 (1879, partim.).

Siphia strophiata, Hodgson.

[*Siphia strophiata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 115].

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 455.

Размѣры:

♂ Дл. 120—130. Разм. 205—220. Кр. 69—71. Кл. 12—14. Пл. 16—17. Хв. 56—59.

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, май, августъ.

Этотъ видъ, обыкновенный по словамъ David'a въ Муппнѣ, въ ю.-з. Гань-су рѣдокъ. Я встрѣтилъ его всего два раза. Разъ въ густомъ лиственномъ лѣсу на увалѣ, другой — въ кустахъ близъ воды на днѣ долины. Оба раза на высотѣ 7 — 8000 футъ.

Digenea cerviniventris, Sharpe.

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 460.

Размѣры:

♂ ad.	Дл.	125—132.	Разм.	180—190.	Кр.	60—61.	Кл.	11—12.	Пл.	17.	Хв. 55—59.
♂ juv.	»	125.	»	180—185.	»	59—60.	»	11—12.	»	17.	» 52—57.
♀ ad.	»	110.	»	175.	»	55.	»	11.	»	15.	» 53.

Радужина очень темная; клювъ черный; плюсны темно-розоваго цвѣта, когти черные.

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль, августъ;—дер. Джоза-паза, конецъ сентября.

Наша единственная самка, добытая въ концѣ іюля и еще не выпнявшая, совершенно схожа съ описанною г. Godwin-Austen'омъ[1]). Молодые самцы (конецъ іюля и сентябрь) похожи на самку, но отличаются болѣе яркимъ оливково-рыжимъ тономъ оперенія, зависящимъ, вѣроятно, только отъ свѣжести пера. Молодой самецъ, не смѣнившій еще гнѣздоваго наряда, рыже-пятнистый по оливково-рыжему фону. Наствольныя полоски, образующія пятна, рѣзче и свѣтлѣе на головѣ и едва замѣтны на спинѣ. На нижней сторонѣ тѣла пятна больше и круглѣе, но менѣе рѣзки; шея грязно-желтовато-бѣлая, почти безъ пятенъ.

Этотъ видъ найденъ въ небольшомъ количествѣ въ Минджеускомъ округѣ. Встрѣчается, на высотѣ съ 7 — 8000 футъ, во влажныхъ и густыхъ кустарныхъ и бамбуковыхъ зарослях по уваламъ и, въ особенности, на днѣ горныхъ ущелій, близъ воды. Птички держатся, парами или по одиночкѣ, всегда внизу — въ хворостѣ, сухой травѣ или на самыхъ нижнихъ вѣтвяхъ кустарниковъ. Они очень осторожны и вмѣстѣ съ тѣмъ любопытны. Замѣтивъ человѣка, птичка непремѣнно подберется чуть не вплотную и молча сядитъ и смотритъ, но лишь только замѣтитъ, что она открыта, — сейчасъ же падаетъ въ траву или хворостъ.

---

[1]) Journ. Asiat. Soc. Beng. 1878, p. 15, — *Siphia leucomelanura*.

Xanthopygia cyanomelaena (Temm.).

[*Cyanoptila cyanomelaena*, David et Oust., Ois. Chine, p. 116, pl. 81].

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 252.—Seebohm, Ibis 1884, p. 180.

Размѣры:

♂ Дл. — Разм. — Кр. 90. Кл. 15. Пл. 16. Хв. 69.
♀ » 170. » 285. » 90. » 15. » 17. » 65.

У самки радужина темная; клювъ темно-бурый; плюсны черныя съ синеватымъ оттѣнкомъ. У самца клювъ темнѣе, почти черный; основная часть хвоста бѣлая, бѣлый цвѣтъ занимаетъ 0,4 длины хвоста (по наружному опахалу крайнихъ рулей).

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, самецъ начала августа, самка 9 іюля.

Мы имѣемъ только два экземпляра этого вида — самца и самку. Самецъ, добытый въ началѣ августа, началъ линять. Большая часть оперенія и хвостъ старые, сильно поношенные, свѣжее же оперепіе пробивается только на головѣ. Очевидно это взрослая птица, линяющая послѣ гнѣздованія. Самка, добытая мѣсяцемъ раньше (9 іюня), имѣетъ оперепіе также сильно поношенное, но линять еще не начинала.

Нашъ самецъ похожъ на нижнюю фигуру на pl. XVII. D въ «Fauna Japonica» и на рисунокъ въ «Oiseaux de la Chine». Онъ отличается отъ типичныхъ японскихъ птицъ тѣмъ, что имѣетъ весь передъ нижней стороны тѣла не черный, а мутно-синевато-зеленый. Черны только уздечки, но и на тѣхъ кончики перьевъ синеватые. Цвѣтъ верхней стороны тѣла у нашей птицы болѣе зеленоватый, а малыя и среднія кроющія крыла менѣе яркаго синяго цвѣта, чѣмъ у типичныхъ. Основная треть хвоста, какъ у типичныхъ — бѣлая.

Подобныхъ птицъ, которыхъ извѣстно не много[1]), Temminck и г. Sharpe принимаютъ за невполнѣ взрослыхъ самцовъ *X. cyanomelaena*, но ни тотъ ни другой авторъ не мотивируютъ своего мнѣнія[2]) и не опредѣляютъ болѣе точно какому возрасту соотвѣтствуетъ этотъ нарядъ.

---

[1]) Экземпляръ совершенно подобный нашему, но въ менѣе обношенномъ оперепіи, хранится въ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ. Онъ происходитъ изъ Китая (Базилевскій, 1842 г.), но къ сожалѣнію ни точнаго мѣстонахожденія, ни времени добычи не извѣстно. Подобенъ же нашему, вѣроятно, экземпляръ Лейденскаго Музея, упоминаемый Blyth'омъ (Ibis 1870, p. 164) и г. Sharpe'омъ (Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 252); впрочемъ, это можетъ быть и два отдѣльныхъ экземпляра. Blyth приводитъ экземпляръ Лейденскаго Музея подъ названіемъ *C. cyanomelanura* и говоритъ, что онъ помѣченъ ошибочно изъ Непала а происходитъ вѣроятно изъ Японіи. Экземпляръ же, упоминаемый г. Sharpe'омъ, помѣченъ, по его словамъ, *C. cyanothorax* и категорически названъ авторомъ японскимъ. Кромѣ этихъ трехъ или четырехъ экземпляровъ другихъ намъ не извѣстно.

[2]) Про птицу, изображенную на вышеупомянутой таблицѣ въ «Fauna Japonica» Temminck говоритъ, что чернота хвоста доходитъ у ней до основанія послѣдняго, тогда какъ у взрослой птицы вся основная половина хвоста бѣлая. Сильное развитіе чернаго цвѣта на хвостѣ не можетъ служить признакомъ молодости. Молодой самецъ, хранящійся въ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ (Максимовичъ, Хакодате, 10 сент. 1861 г.), похожій на птицу ошибочно описанную въ Каталогѣ Британскаго Музея за самку, имѣетъ хвостъ уже рѣзко двуцвѣтный и черный цвѣтъ занимаетъ, какъ у взрослыхъ птицъ, $^2/_3$ хвоста. Основная часть послѣдняго однако не бѣлая, а сѣрая. Птица описанная de Hay (Tweeddale's Ornitholog. Works, p. 10) подъ названіемъ *Muscicapa bella*, имѣетъ вѣроятно такой же хвостъ, какъ у экземпляра Temminck'а. Въ описаніи онъ названъ черпымъ. Что значитъ эта особенность?

Нашъ самецъ, какъ мы уже замѣтили, несомнѣнно гнѣздовавшая птица и, во всякомъ случаѣ, не моложе года. Между тѣмъ г. Seebohm[1]) о японскихъ птицахъ говоритъ, что весной молодые самцы (т. е. еще до года) отличаются отъ старыхъ только блѣдными концами большихъ кроющихъ и самыхъ внутреннихъ маховъ 2-го порядка. Это подтверждается, повидимому, и краткимъ описаніемъ г. Sharpe'a[2]) молодаго самца съ острова Борнео. Этотъ самецъ, добытый въ мартѣ, почти вылинялъ, но сохранилъ еще нѣсколько перьевъ бураго оперенія. Про его нарядъ авторъ замѣчаетъ, что синій цвѣтъ менѣе роскошенъ, чѣмъ у взрослыхъ, и съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, но ничего не упоминаетъ о цвѣтѣ груди и ушныхъ перьевъ, изъ этого можно заключить, что части эти такого же цвѣта, какъ у взрослыхъ птицъ, т. е. черныя. Если послѣднее предположеніе вѣрно, этотъ экземпляръ подтверждаетъ вышеприведенное замѣчаніе г. Seebohm'a т. е., что самцы изъ перваго наряда (кромѣ гнѣздоваго), который ошибочно описанъ въ Каталогѣ Британскаго Музея (l. c.) какъ нарядъ самки, въ тотъ же годъ переливаютъ на зимовкѣ въ нарядъ мало отличный отъ наряда совершенно взрослой птицы. Если смѣна нарядовъ у *X. cyanomelaena* совершается въ изложенномъ порядкѣ, то нарядъ нашей и подобной ей птицъ совершенно необъяснимъ. Не принадлежатъ ли они къ другому, близкому, но отличному отъ *X. cyanomelaena* виду?

Наша самка похожа въ общемъ на рисунокъ *Muscicapa gularis* въ «Fauna Japonica» (Pl. XV), но немного сѣрѣе и имѣетъ довольно рѣзкое бѣловатое пятно не на подбородкѣ, какъ на рисункѣ, а на серединѣ зоба. Мы не имѣли въ рукахъ самокъ *X. cyanomelaena* изъ Японіи и не беремся судить насколько это отличіе заслуживаетъ вниманія.

Этотъ видъ найденъ только близъ дер. Іо-дзамъ-пу Миджеускаго округа и здѣсь рѣдокъ. За три лѣтнихъ мѣсяца я встрѣтилъ только двѣ пары. Изъ одной добытъ самецъ, изъ другой—самка. Одна пара держалась въ мелкихъ кустахъ близъ самой деревни, другая—тоже въ недалекомъ разстояніи, въ молодомъ высокомъ лиственномъ лѣсу.

Rhyacornis fuliginosa, (Vigors).

[*Rhyacornis fuliginosa*, David et Oust., Ois. Chine, p 171].

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 253.

Размѣры:

♂ Дл. 135—150. Разм. 240—250. Кр. 75—81. Кл. 13—13,5. Пл. 23—24. Хв. 52—58.
♀ » 125—140. » 225—230. » 70—75. » 12,5—13. » 22—23. » 44—55.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, февраль, мартъ, апрѣль.

Видъ этотъ совершенно осѣдлъ и довольно обыкновенъ по всей южной Гань-су. Держится повсюду близъ воды въ каменистыхъ долинахъ рѣкъ и ручьевъ и поды-

[1]) Ibis 1884, p. 180.
[2]) Ibis 1889, p. 196.

мается въ горы до 8000 футъ высоты, — выше же рѣдокъ. Птички не избѣгаютъ близкаго сосѣдства человѣка и не пугливы, но разъ испытавши преслѣдованіе, становятся крайне осторожными, выказывая при этомъ замѣчательную наблюдательность и умъ. Въ началѣ моего пребыванія въ Гань-су я встрѣтилъ *R. fuliginosa* въ первый разъ около г. Хой-сяна. Птичка держалась на камняхъ на берегу рѣчки вблизи прохожей дороги. Я стрѣлялъ и промахнулся. Неизвѣстная мнѣ тогда птичка крайне заинтересовала меня и я пошелъ отыскивать ее на другой день. Птичка была на томъ же мѣстѣ, но на этотъ разъ не подпустила на выстрѣлъ и скрылась въ кучу береговыхъ валуновъ, выгнать откуда ее не было никакой возможности. Я сталъ посѣщать это мѣсто почти ежедневно, побывалъ разъ двадцать, каждый разъ видѣлъ птичку, но добыть такъ и не могъ. Иногда, не доходя шаговъ 200, я видѣлъ, наблюдая въ бинокль, какъ вблизи ея проходила вереница прохожихъ, на которыхъ она не обращала, повидимому, никакого вниманія. Но лишь только приближался я — тотчасъ же скрывалась въ камни. Я пробовалъ перемѣнить шапку и платье, пряталъ подъ одежду ружье, но ничто не помогало: я бывалъ всегда узнанъ болѣе чѣмъ за 100 шаговъ разстоянія.

Tarsiger cyanurus (Pall.).

[*Janthia cyanura*, David et Oust., Ois. Chine, p. 231, pl. 28.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 255.

Размѣры:

♂ ad. Дл. 137. Разм. 235. Кр. 77. Кл. 12,5. Пл. 21—22 Хв. 57—58.
♂ imm. » 130—150. » 225—240. » 76—77. » 12—13. » 21—22. » 57—61.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, январь, февраль, мартъ;—дер. Лотани, середина октября.

Этотъ видъ найденъ зимующимъ въ округѣ г. Хой-сяна. Взрослые самцы рѣдки, молодые же, въ нарядѣ самокъ, довольно обыкновенны. Держатся въ горныхъ долинахъ по кустамъ вблизи воды. Въ ю.-з. Гань-су этотъ видъ рѣдокъ и замѣщенъ слѣдующимъ. Оттуда у насъ только одинъ экземпляръ, добытый въ серединѣ октября, полъ котораго не опредѣленъ, но въ нарядѣ самки.

Tarsiger rufilatus (Hodgs.).

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 256.—Scully, Ibis 1881, p. 446 et Str. Feath., X, 116.—Плеске, Научн. Результ. Путеш. Пржевальскаго, т. II, Птицы, стр. 77.

Размѣры:

♂ ad. Дл. 150. Разм. 240—260. Кр. 79—84. Кл. 13—14. Пл. 25—26,5. Хв. 68—71.
? ♀ » 150. » 235. » 81. » 12,5. » 24. » 64.
juv. » 150. » 240. » 78. » 13,5. » 25. » 61.

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, іюль;—дер. Іо-дзамъ-пу, августъ;—дер. Лотани, сентябрь.

Самка *T. rufilatus* отличается отъ самки *T. cyanurus* слѣдующимъ:

Ярко синимъ цвѣтомъ у основанія рулей, вмѣсто голубаго.

Болѣе яркимъ оливковымъ тономъ на спинѣ и груди, въ особенности на послѣдней, которая у *T. cyanurus* буроватая.

Яркимъ буро-рыжимъ цвѣтомъ у основанія наружныхъ опахалъ маховъ втораго порядка.

Болѣе узкимъ бѣлымъ пятномъ на подбородкѣ и зобу.

Молодая птица, добытая въ началѣ августа, величиной уже съ взрослую и съ синеватымъ хвостомъ, оперение имѣетъ пятнистое: верхъ рыжевато-оливковый съ желтоватыми наствольными пятнами, которыя окружены чернымъ; послѣдній цвѣтъ рѣзче на спинѣ. Низъ свѣтлѣе спины и пятна крупнѣе. На подбородкѣ и зобу нѣтъ рѣзко-ограниченнаго бѣлаго пятна.

Нѣкоторые изъ нашихъ взрослыхъ самцовъ имѣютъ на основаніяхъ голубыхъ перьевъ бровей бѣлыя пятна, которыя видны только, когда приподнять перья.

Этотъ видъ найденъ только въ ю.-з. Гань-су, рѣдокъ и, вѣроятно, только гнѣздится. Встрѣчается въ горныхъ хвойныхъ лѣсахъ.

Pratincola maura (Pall.)

[*Pratincola indica*, David et Oust., Ois. Chine, p. 167. (partim ?)]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 188.—Плеске, Научн. Результ. Пут. Пржевальскаго, т. II, Птицы, стр. 45.

Размѣры:

♂ Дл. 137—140. Разм. 220. Кр. 68—73. Кл. 13,5—14. Пл. 22. Хв. 50—55.
♀ » 135. » 215. » 67. » 14. » 21,5. » 47.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, апрѣль.

Всѣ наши экземпляры принадлежатъ къ болѣе мелкой типичной формѣ, а не къ крупной разновидности—*P. Przevalskii*, хотя одинъ изъ нихъ не отличимъ отъ послѣдней по величинѣ. Видъ этотъ встрѣченъ только въ округѣ г. Хой-сяна. Первыя прилетныя птицы появились въ началѣ апрѣля.

TURDIDAE.

Sylvia curruca minuscula, Hume.

[*Sylvia curruca*, David et Oust., Ois. Chine, p. 240 (partim ? [1])]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 20, pl. I.—Плеске, Ornithogr. Rossica, т. II, стр. 102, табл. I, фиг. 5—7.

Размѣры:

Дл. 145. Разм. 200. Кр. 61—64. Кл. 11. Пл. 19,5—20,5. Хв. 60—61.
» 150. » 212. » 70. » 11. » 20,5. » 64. (a)

Экземпляры: Уроч. Терминъ-байшинъ и (a) р. Уланъ-Муренъ (Ордосъ), августъ;—монаст. Джинъ-та-сы и городъ Ли-юань (у сѣверной подошвы Нань-шаня), іюнь.

Хотя по длинѣ клюва наши экземпляры должны быть отнесены къ *S. mi-*

[1]) Въ Каталогѣ Британскаго Музея (V, p. 19.) *S. curruca* у David et Oustalet, приведена въ синонимии *S. affinis*.

nuscula, однако они не изъ типичныхъ, въ особенности одинъ, который по крупной величинѣ выходитъ изъ предѣльныхъ размѣровъ, приводимыхъ авторами. Эта птица, добытая 24 августа, въ свѣжемъ оперенiи, но еще не закончившая линьки, имѣетъ дл. крыла 70, а хвоста 64 мм. По г. Плеске длина крыла этого вида 60—64 мм., хвоста—55—60 мм. Кромѣ того у всѣхъ нашихъ экземпляровъ второй махъ очень длиненъ,—онъ больше 6-го и почти равенъ 7-му, что по г. Плеске хотя бываетъ, но рѣдко.

Въ южной Гань-су этотъ видъ не встрѣченъ.

Phylloscopus plumbeitarsus, Swinh. [1]).

[*Phyllopneuste plumbeitarsa*, David et Oust., Ois. Chine, p. 270.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 45.—Плеске, Ornithogr. Rossica, т. II, стр. 183, табл. II, фиг. 4.

Размѣры:

♂ Дл. 115—120. Разм. 185—187. Кр. 60—63. Кл. 12. Пл. 19. Хв. 48—52.
? » —— » —— » 55. » 11,5. » 17. » 43.

Клювъ: верхняя челюсть черная, нижняя челюсть и зѣвки желтые. Плюсны темно-бурыя, подошвы желтыя.

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ и дер. Io-дзамъ-пу, iюль;—дер. Лотани, сентябрь.

Эта пѣночка лѣтомъ весьма обыкновенна въ лѣсныхъ ущельяхъ ю.-з. Гань-су.

Phylloscopus magnirostris, Blyth.

[*Phyllopneuste xanthodryas*, David et Oust., Ois. Chine, p. 268, partim.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 47.

Размѣры:

♂ Дл. 125—142. Разм. 210. Кр. 70. Кл. 14. Пл. 18. Хв. 51—54.
♀ » 130—135. » 205—215. » 66—70. » 14. » 18. » 50—53.

Экземпляры: дер. Io-дзамъ-пу, май, iюнь, iюль.

Пѣніе этой пѣночки, состоящее изъ трехъ двойныхъ нотъ, пропѣтыхъ съ разстановкой, настолько оригинально, что услышавъ его, я не сомнѣвался что слышу *Phyllopneuste trinotaria*, голосъ которой описанъ въ «Oiseaux de la Chine». Эта пѣночка, встрѣченная David'омъ въ Муниѣ и только названная, но не описанная, отождествляется имъ въ названномъ сочиненiи съ *Ph. xanthodryas*, Swinh. Такъ какъ единственный экземпляръ *Ph. trinotaria*, по словамъ автора, утерянъ, это отождествленiе вѣроятно основано только на сходствѣ птичекъ по крупному росту. Сходство муниской пѣночки съ нашей ганьсуйской по голосу, о которомъ мы сказали, дѣлаетъ болѣе вѣроятнымъ, что *Ph. trinotaria*, A. David = *Ph. magnirostris*, Blyth.

Этотъ видъ въ ю.-з. Гань-су сравнительно рѣдокъ. Птички встрѣчаются по одн-

[1]) За опредѣленiе какъ этого, такъ и остальныхъ видовъ рода *Phylloscopus* мы приносимъ благодарность О. Д. Плеске, работавшему въ то время надъ монографiей русскихъ пѣночекъ.

почкѣ, весной — на опушкахъ лѣсовъ и по отдѣльно разбросаннымъ кустамъ, въ лугахъ; лѣтомъ же — въ глубинѣ густыхъ лиственныхъ лѣсовъ, гдѣ вѣроятно и гнѣздятся. Кромѣ вышеупомянутаго пѣнія самцовъ, птичка имѣетъ другой, не менѣе оригинальный, крикъ, который можетъ быть переданъ словомъ «метискъ», повтореннымъ нѣсколько разъ. Это, кажется, крикъ тревоги самки.

Phylloscopus reguloides, Blyth.

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 51. [1]).

Размѣры:

♂ Дл. 125. Разм. 195. Кр. 63. Кл. 12—13. Пл. 17—18. Хв. 47—48.
♀ » — » — » 59. » 12. » 17,5. » 44.

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, іюль;—дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль.

Этотъ видъ въ ю.-з. Гань-су наиболѣе обыкновенная изъ всѣхъ пѣночекъ.

Phylloscopus proregulus (Pall.).

[*Reguloides proregulus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 274.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 71.—Плеске, Ornithogr. Rossica, т. II, стр. 313.

Размѣры:

♂ Дл. 95. Разм. 165. Кр. 52. Кл. 11. Пл. 11,5. Хв. 39. (a)
? » — » — » 55. » 10. » 11,5. » 42. (b)

Экземпляры: (a) Дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь;—(b), р. Ташиту (въ Нань-шанѣ), май.

Недавно г. Gätke [2]) различилъ двѣ формы *Ph. proregulus*,—сибирскую, типичную и—гималайскую, которую онъ назвалъ *Ph. Newtoni*. Послѣдняя форма отличается:

Болѣе тусклымъ, буроватымъ, оттѣнкомъ оливково-желтаго цвѣта оперенія, вмѣсто яркаго, лимонно-желтаго, у сибирскихъ птицъ.

Болѣе короткимъ вторымъ махомъ, который равенъ 10-му, равенъ самому длинному изъ трехъ заднихъ маховъ и не достигаетъ до вершины крыла на 10 мм.; у сибирскихъ же птицъ второй махъ равенъ 8-му, меньше самаго длиннаго изъ заднихъ маховъ на 6 — 7 мм. и не достигаетъ до вершины крыла на 6 мм.

---

[1]) Въ синониміи *Ph. reguloides* г. Seebohm приводитъ *Reguloides viridipennis*, Blyth *apud* Jerdon (B. of India, II, p. 198), а также *Reguloides viridipennis* въ «Oiseaux de la Chine». Послѣднее отождествленіе врядъ ли вѣрно. *R. viridipennis* приведенъ въ названномъ сочиненіи не на основаніи литературныхъ данныхъ, а по единственному экземпляру, добытому близъ Пекина и хотя—съ одной стороны, сказано, что этотъ экземпляръ представляетъ всѣ дифференціальные признаки, упомянутые Jerdon'омъ, съ другой стороны—онъ отнесенъ въ подродъ *Reguloides* и сравнивается по величинѣ съ *R. proregulus*. Послѣднее обстоятельство сильно говоритъ противъ отождествленія г. Seebohm'а, такъ какъ *Ph. reguloides* рѣзко отличается отъ *R. proregulus* величиной. Кромѣ того отождествленіе пекинскаго экземпляра съ *Ph. reguloides* находится въ противорѣчіи съ тѣмъ, что извѣстно о географическомъ распространеніи этого вида. Онъ не былъ до сихъ поръ приводимъ съ побережья Китая ни однимъ авторомъ, и по г. Seebohm'у гнѣздится въ Гималайяхъ къ востоку отъ Непала, а зимуетъ въ Индіи и на Бирманскомъ полуостровѣ.

[2]) Ibis 1889, p. 578.

Инымъ образованіемъ вершины крыла. Самые длинные махи 4-й=5-му=6-му, 3-й же на 3 мм. короче; тогда какъ у сибирскихъ птицъ вершина крыла образована 3-мъ, 4-мъ, 5-мъ махами, которые равны.

Къ сожалѣнію, мы имѣемъ только два экземпляра *Ph. proregulus*, изъ которыхъ одинъ, наньшаньскій, притомъ настолько попорченъ дробью, что судить о формулѣ крыла невозможно. Ганьсуйскій же экземпляръ имѣетъ признаки промежуточные между двумя формами г-на Gätke. Второй махъ у него равенъ 10-му, больше самаго длиннаго изъ трехъ заднихъ маховъ на 3 мм. и не достигаетъ до вершины крыла на 7,5 мм.; послѣдняя образована 4-мъ и 5-мъ махами, которые равны, 3-й же короче ихъ на 1 мм. и равенъ 6-му.

Что касается цвѣта оперенія, то судить объ немъ, не имѣя серіи экземпляровъ, трудно. Кажется, наши наньшаньскія птички ярче, т. е. ближе къ типичной формѣ, ганьсуйскія же—темнѣе, т. е. ближе къ *Ph. Newtoni*.

Phylloscopus superciliosus (Gmel.).

[*Reguloides superciliosus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 273.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 68.—Плеске, Ornithogr. Rossia, т. II, стр. 302.

Размѣры:

Дл. 105. Разм. 170. Кр. 56. Кл. 11. Пл. 17,5. Хв. 40.

Экземпляръ: Дер. Лотани, конецъ сентября.

Phylloscopus Mandellii, Brooks.

Brooks, Str. Feath., VIII, pp. 390 et 481.—Hume, Str. Feath., XI, p. 222.

Размѣры:

♂ Дл. 105. Разм. 172. Кр. 56. Кл. 11. Пл. 17,5. Хв. 43.
? » 105. » 170. » 56. » 11. » 17,5—18. » 44.

Экземпляры: Дер. Сы-дзы-пинъ (близъ монаст. У-тай-шань въ с. Китаѣ), іюнь;—дер. Лотани, конецъ сентября.

Lusciniola Armandi (Milne-Edw.).

[*Oreopneuste Armandi*, David et Oust., Ois. Chine, p. 265, pl. 22.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 130.

Размѣры:

♂ Дл. 140. Разм. 190. Кр. 63. Кл. 13. Пл. 21,5. Хв. 59.
♀ » 130—140. » 175—195. » 57—63. » 11—13. » 20—21. » 52—60.
? » 115. » 172. » 55. » 11. » 20. » 52.

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь;—дер. Лотани, конецъ сентября.

Acrocephalus orientalis (Temm. et Schleg.).

[*Calamodyta orientalis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 252.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 97.

Размѣры:

♂ Дл. 185. Разм. 250. Кр. 79. Кл. 21. Пл. 27. Хв. 71.

Экземпляры: Г. Фоу-пинъ (Пекинская равнина), іюнь; — уроч. Терминъ-бойшинъ (Ордосъ) августъ.

Locustella certhiola (Pall.).

[*Locustella certhiola*, David et Oust., Ois. Chine, p. 248.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 114.

Размѣры:

♂ Дл. 147. Разм. 195. Кр. 61. Кл. 14. Пл. 21. Хв. 49.

Экземпляры: Г. Гуй-хуа-ченъ (сѣв. Китай), августъ.

Cettia davidiana (J. Verr.).

[*Arundinax davidianus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 255, pl. 20.]

Arundinax davidiana, J. Verreaux, Nouv. Arch. du Mus. 1870, Bull., p. 37 et 1871, Bull., p. 46. — Swinhoe, Ibis 1874, p. 438.

Размѣры:

♂ Дл. 122—130. Разм. 165—180. Кр. 54—56. Кл. 12—13. Пл. 22. Хв. 51—55.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, конецъ февраля, начало марта.

Мы не можемъ согласиться съ г. Seebohm'омъ, который приводитъ *Arundinax davidianus*, J. Verr. въ синонимiи *Cettia fortipes* (Hodgs.) [1]. Мы имѣли случай видѣть единственный экземпляръ David'a изъ Муппина, послужившій типомъ для описанiя Verreaux и сравнить его какъ съ нашими, такъ и съ экземплярами *C. fortipes*, опредѣленными г. Seebohm'омъ [2]. Наши экземпляры совершенно сходны съ типомъ и отличаются отъ *C. fortipes*. По цвѣту верхней стороны оба вида схожи, низъ же у *C. davidiana* свѣтло-сѣровато-бурый, а у *C. fortipes*, съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ. Кромѣ того первый видъ имѣетъ менѣе рѣзко выраженную надбровную полосу и, кажется, крупнѣе ростомъ чѣмъ второй.

Этотъ видъ встрѣченъ мною только въ Хойсянскомъ округѣ и всего раза два — три; во всѣхъ случаяхъ въ кустарныхъ зарослях по пашеннымъ межамъ. По времени добычи я склоненъ думать, что нѣкоторыя птички зимовали здѣсь или гдѣ нибудь по близости.

---

[1]) Cat. B. Brit. Mus., V, p. 136.

[2]) Благодаря любезности г. Oustalet. Типъ *Arundinax davidianus* хранится въ музеѣ Jardin des Plantes въ Парижѣ; тамъ же есть и экземпляры *Cettia fortipes*, происходящіе изъ коллекціи г. Seebohm'a.

Cettia canturians (Swinh.)

[*Homochlamys canturiens*, David et Oust., Ois. Chine, p. 243.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 141.

Размѣры:

♂ Дл. 175. Разм. 240. Кр. 75. Кл. 17. Пл. 28. Хв. 77.

Формула крыла $5 > 4$ почти $= 6$ (составляютъ вершину) > 7 почти $= 3$ много < 2; первый махъ немного $> {}^1/_2$ 2-го; вообще крыло сильно закруглено и тупо.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, начало мая.

Нашъ экземпляръ настолько поврежденъ, что рулей не достаетъ. Экземпляровъ для сравненія мы не имѣли. Это заставляетъ насъ подробно мотивировать наше опредѣленіе. Мы имѣемъ дѣло несомнѣнно съ видомъ рода *Cettia*, поелику роды, съ которыми можно было-бы его смѣшать, всѣ легко выдѣлить путемъ исключенія. У *Arundinax* крыло остро и формула его: $3 > 4 > 5$ (составляютъ вершину) > 2 почти $= 6 > 7$; абортивное немного $> {}^1/_2$ 2-го маха. У *Luscinіola* — «rictal bristles small», у *Dumeticola* — «rictal bristles nearly obsolete», тогда какъ у нашей птицы они хорошо развиты. Виды рода *Herbivocula* всѣ малы и всѣ типа *Phylloscopus*'овъ. Съ другими родами смѣшать нашу птицу нельзя. Остается рѣшить только, къ какому виду рода *Cettia* она относится. Это очень легко, такъ какъ всѣ остальные виды значительно меньше и крыло у нихъ значительно короче.

Этотъ видъ встрѣченъ только въ Хойсянскомъ округѣ. Птички появились въ началѣ мая и держались въ зарослях колючихъ кустарниковъ по пашеннымъ межамъ и на кладбищахъ.

Rhopophilus pekinensis (Swinh.).

[*Rhopophilus pekinensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 260, pl. 19.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 117.

Размѣры:

♂ Дл. 175—187. Разм. 190—202. Кр. 59—63. Кл. 13—14. Пл. 21—22. Хв. 88—100.
♀ » 175—180. » 185—187. » 59—60. » 13—13,5. » 21—22. » 94—96.

Экземпляры: Р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), августъ;—монаст. Шине-суме (Ордосъ), сентябрь;—г. Дзинь-юань (сѣв. Гань-су), октябрь;—г. Хой-сянъ, январь, февраль.

Этотъ видъ весьма обыкновенъ въ Ордосѣ и въ сѣверной Гань-су, въ южной-же части этой провинціи встрѣченъ только въ округѣ города Хой-сяна и очень рѣдокъ. Держится повсюду въ мелкихъ кустарныхъ зарослях и въ травѣ.

Accentor erythropygius, Swinh.

[*Accentor erythropygius*, David et Oust., Ois. Chine, p. 178.] [1]).

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 663.

Размѣры:

♂ Дл. 180—195. Разм. 305—330. Кр. 98—109. Кл. 16,3—17. Пл. 25—26,5. Хв. 72—79.
♀ » 170. » 305. » 97. » 16,3. » 25. » 73.

Радужина темно-рыжевато-красная. Клювъ: верхняя челюсть черная, края ея у основанія клюва желтые; нижняя челюсть желтая съ чернымъ концомъ. Плюсны черныя.

Экземпляры: Дер. Джоза-паза, сентябрь;—дер. Сатани, ноябрь.

Этотъ видъ встрѣчается въ ю.-з. Гань-су только на самыхъ высокихъ горныхъ хребтахъ, возвышающихся выше предѣла древесной растительности. Я нашелъ его въ хребтѣ, отдѣляющемъ Сигученскій округъ отъ Сы-чуани и въ хребтѣ лѣваго берега Сигученской рѣки. Птички держатся, по одиночкѣ или небольшими обществами, въ альпійскихъ лугахъ около скалъ. Отдѣльныя особи попадаются въ серединѣ зимы въ горныхъ ущельяхъ, но въ населенныя долины не проникаютъ.

Accentor strophiatus, Hodgs.

[*Accentor multistriatus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 179.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 658.

Размѣры:

♂ Дл. 150. Разм. 200—212. Кр. 63—68. Кл. 13. Пл. 20—21. Хв. 58—63.
♀ » 147—150. » 200—210 » 62—66. » 14. » 20. » 57—63.

Радужина свѣтло-коричневая. Вокругъ глаза, кромѣ верхней передней его четверти узкая полоска бѣлыхъ перышекъ. Клювъ черный, нижняя челюсть въ серединѣ рыжеватая. У осеннихъ птицъ радужина буро-рыжая; клювъ темно-розоваго цвѣта съ болѣе свѣтлыми основными краями верхней челюсти и небольшимъ свѣтлымъ пятномъ у основанія нижней.

Экземпляры: Уроч. Кванъ-дзя-коу (на границѣ Шенси), январь;—дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Сатани, декабрь, январь, февраль, октябрь; — дер. Джоза-паза, декабрь; — дер. Чаго, декабрь.

Этотъ видъ найденъ какъ въ юго-западной, такъ и въ юго-восточной части Гань-су, но вездѣ сравнительно рѣдокъ и встрѣчается только по одиночкѣ или парами. Лѣтомъ держится въ альпійскихъ лугахъ, зимой же спускается въ долины и попадается тогда въ кустарныхъ зарослякъ и по опушкамъ лѣсовъ. Птичка, добытая въ началѣ августа, была очень отрепана, но линять еще не начинала; битыя же въ серединѣ октября имѣли свѣжее, но еще не вполнѣ отросшее, оперенiе.

---

[1]) Этотъ видъ приведенъ въ «Oiseaux de la Chine» по литературнымъ даннымъ и по одному сильно попорченному экземпляру, полученному г. David'омъ въ Пекинѣ. Такъ какъ птицы изъ Мупина и Гань-су отнесены въ названномъ сочиненiи къ виду *A. nipalensis*, наши же, изъ послѣдней мѣстности, оказались всѣ принадлежащими къ виду *A. erythropygius*, то мы склонны думать, что и подъ *A. nipalensis* у David и Oustalet скрывается отчасти *A. erythropygius*.

Accentor rubeculoides, Hodgs.

[*Accentor rubeculoides*, David et Oust., Ois. Chine, p. 543.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 657.

Размѣры:

♂ Дл. 167. Разм. 260. Кр. 81. Кл. 16. Пл. 24. Хв. 68. (a)
? » 160. » 225. » 72. » 14. » 23,5. » 60. (b)

Радужина свѣтло-коричневая; клювъ черный; плюсны рыжевато-бурыя, почти черныя (самецъ).

Экземпляры: (a) Дер. Та-хей-гоу, середина ноября;—(b) дер. Лянъ-дзя-коу (въ Шенси), середина марта.

Мы имѣемъ только два экземпляра этого вида, которые въ общемъ схожи съ рисункомъ Gould'a (B. of Asia, IV, pl. 46.), но отличаются отъ него тѣмъ, что имѣютъ зобъ не одноцвѣтно-сѣрый, а съ примѣсью чернаго цвѣта по границѣ съ рыжей грудью. Эта примѣсь особенно рѣзка у экземпляра (a). Между собой наши экземпляры различаются тѣмъ, что у (a) верхъ головы одноцвѣтный, буро-сѣрый, а у (b)—съ неяснымп болѣе темными продольными полосками.

Экземпляръ (a) добытъ въ хребтѣ отдѣляющемъ Гань-су отъ Сы-чуани, въ альпійскихъ лугахъ на высотѣ около 14000 футъ; экземпляръ (b) въ Шенси, въ горахъ близъ границы Гань-су, на высотѣ вѣроятно не болѣе 5—6000 ф.

Saxicola isabellina, Cretzschm.

[*Saxicola isabellina*, David et Oust., Ois. Chine, p. 164.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 399.

Размѣры:
Дл. 180. Разм. 315. Кр. 94,5. Кл. 19. Пл. 28,5. Хв. 59.

Экземпляръ: Г. Синнинъ, конецъ апрѣля.

Saxicola morio, Hempr. et Ehr.

[*Saxicola morio*, David et Oust., Ois. Chine, p. 166.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 372.

Размѣры:
♂ Дл. 160. Разм. 295. Кр. 95 Кл. 15. Пл. 22. Хв. 66.

Экземпляръ: Ворота Я-мынь-гуань (близъ монаст. У-тай, въ с. Китаѣ), іюнь.

Saxicola vittata, Hempr. et Ehr.

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 396.

Размѣры:
♂ Дл. 170. Разм. 300. Кр. 99. Кл. 15. Пл. 24. Хв. 66. (a)
? » 165. » 225. » 93. » 15,5. » 23. » 61. (b)

Экземпляры: (a) Р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), августъ;—(b) р. Ша-хэ въ горахъ У-тай-шань, іюнь.

Saxicola deserti, Temm.

[*Saxicola deserti*, David et Oust., Ois. Chine, p. 540.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 383.

Размѣры:

Кр. 89. Кл. 15. Пл. 28. Хв. 65.

Экземпляръ: Уроч. Котель-усу (въ средней Гоби), середина августа.

У нашего экземпляра (совершенно молодой птицы) бѣлый цвѣтъ внутреннихъ опахалъ главныхъ маховъ и ближайшихъ маховъ втораго порядка далеко не доходитъ до стержней перьевъ; т. е. этотъ экземпляръ несомнѣнно принадлежитъ къ типичной формѣ *S. deserti*, а не къ *S. montana*, у которой бѣлизна доходитъ до самыхъ стержней.

Hodgsonius phoenicuroides (Hodgs.).

[*Hodgsonius phoenicuroides*, David et Oust., Ois. Chine, p. 234, pl. 30.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 81.

Размѣры:

♂ ad.	Дл.	177—185.	Разм.	220—225.	Кр.	70—75.	Кл.	16—18.	Пл.	29—30,5.	Хв.	77—83.		
♀ ad.	»	175—180.	»	215—220.	»	60—71.	»	16,5—17,5.	»	27—29	»	76—78.		
♂ imm.	»	180—185.	»	215—225.	»	70.	»	16,5—17.	»	29—30.	»	75—79.	(c)	
♂ juv.	»	——	»	——	»	70.	»	17.	»	28.	»	80.	(b)	
Pull.	»	160.	»	——	»	69.	»	15.	»	29.	»	54.	(a)	

Клювъ у взрослыхъ птицъ: у самца—черный, у самки—буро-черный.

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, іюль;—дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль, августъ;—дер. Джоза-паза, начало октября.

Такъ какъ возрастные наряды этого вида еще мало извѣстны, даемъ ихъ описаніе по нашимъ экземплярамъ.

Гнѣздовое оперенiе (экз. (a) величиной почти со взрослую птицу, но имѣетъ еще не вполнѣ отросшій хвостъ; птичка добыта 30 іюля и уже летала). Голова темно-бурая съ болѣе свѣтлыми, рыжевато бурыми, узкими наствольными полосками на всѣхъ перьяхъ. Спина рыжевато-бурая, пятнистая, — всѣ перья съ болѣе свѣтлыми серединами и черноватыми оторочками по краямъ. Надхвостье пятнистое какъ спина, но рыжеватый тонъ ярче. Верхнія кроющія хвоста буро-рыжія, одноцвѣтныя. Крылья и хвостъ такого же цвѣта какъ у взрослой самки, только оторочки кроющихъ крыла болѣе ярко рыжія, а плечевыя съ рыжеватыми наствольными пятнами. Подбородокъ, зобъ, грудь и бока тѣла свѣтло рыжевато-бурые, пятнистые, — середины перьевъ грязно желтовато-бѣлыя, края буроватые. Животъ грязно желтовато-бѣлый, почти одноцвѣтный—

перья безъ серединныхъ пятенъ, но имѣютъ бурые кончики. Клювъ: верхняя челюсть свѣтло-бурая, нижняя—желтая.

Самецъ линяющій изъ гнѣздоваго оперенія (экземпляръ (b), добытый 18 августа). Сверху похожъ на вышеописаннаго гнѣздовпка, но имѣетъ спину болѣе одноцвѣтную, почти безъ пятенъ и основанія рулей уже рыжеватыя. На подбородкѣ, зобу, груди и верхней части боковъ тѣла еще сохранилось гнѣздовое оперенiе, остальной же низъ— какъ у взрослой самки, т. е. бока живота рыжевато-оливковые, а середина — бѣловатая. Клювъ буро-черный—какъ у самки.

Самцы въ переходномъ нарядѣ (два экземпляра (c)). Одинъ экземпляръ, добытый 20 іюля, сверху похожъ на самку, но имѣетъ лобъ и тѣмя синіе, почти такого же цвѣта какъ у самца въ полномъ нарядѣ, только всѣ синія перья съ рыжеватыми оторочками. Середины нѣкоторыхъ плечевыхъ и верхнихъ кроющихъ крыла также слегка сиреваты. Кромѣ того перья крылышка (alula) имѣютъ довольно рѣзкія свѣтло-рыжія оторочки, чего у самки нѣтъ, а основанія рулей (кромѣ двухъ среднихъ) ярко-рыжія, какъ у самца въ полномъ нарядѣ, но рыжій цвѣтъ ограниченъ менѣе рѣзко. Щеки, ушныя перья и середина груди синія съ рыжеватыми оторочками перьевъ. Подбородокъ и горло бѣловатые; всѣ перья съ сиреватыми основаніями и рыжеватыми оторочками. Нижняя часть груди, бока тѣла и вообще весь остальной низъ тѣла — какъ у самки. Другой экземпляръ, добытый 8 іюля, похожъ на предъидущій, но отличается еще большимъ развитіемъ синяго цвѣта. На верхней сторонѣ этотъ цвѣтъ занимаетъ, кромѣ лба и темени, еще затылокъ и верхнюю часть спины, зашеекъ, однако, оливково-сѣрый. Отдѣльныя сиреватыя перышки разбросаны также по нижней части спины и по надхвостью. Снизу синій цвѣтъ также болѣе развитъ и занимаетъ, кромѣ середины груди, еще бока послѣдней и верхнюю часть боковъ туловища. Подобные самцы не моложе года, такъ какъ въ этомъ нарядѣ гнѣздуютъ. Обѣ наши птицы были добыты вмѣстѣ съ самками, съ которыми летали попарно и, очевидно, собирались гнѣздовать.

Старая (птухоперая?) самка. Одна изъ нашихъ самокъ имѣетъ верхнія малыя кроющія и сгибъ крыла синяго, какъ у самца, но менѣе яркаго цвѣта. Синій цвѣтъ замѣтенъ у ней также на лбу, надъ глазомъ и на нѣкоторыхъ перышкахъ надхвостья,—остальное же оперенiе какъ у другихъ самокъ. Эта птица, добытая 1-го августа, либо сидѣла на яйцахъ, либо только что вывела: кожа живота была инфильтрирована серозной жидкостью и гладкая, а не морщинистая, какъ бываетъ у совершенно отгнѣздовавшихъ самокъ, когда кожа начинаетъ подсыхать.

H. phoenicuroides гнѣздуетъ въ порядочномъ количествѣ въ лѣсныхъ ущельяхъ ю.-з. Ганьсу, но благодаря скрытому образу жизни, видъ этотъ кажется болѣе рѣдкимъ, чѣмъ на самомъ дѣлѣ и добыть его трудно. Поселившись лѣтомъ 1886 года въ лѣсномъ ущельи рѣчки Іо-дзамъ-пу, я съ первыхъ же дней заинтересовался однимъ страннымъ пѣніемъ, которое слышалъ ежедневно, но прошло около мѣсяца, пока я добылъ пѣвца и убѣдился, что это былъ *H. phoenicuroides*. Объ оригинальности и стран-

ности этого пѣнія можетъ дать понятіе фраза «ку..у...куецп, пиджеджрп», которую птичка какъ-бы произноситъ. Иногда она, протянувъ первый слогъ «ку..у», остановится, затѣмъ снова начнетъ и докончитъ фразу, иногда же повторитъ два раза конецъ; самый куплетъ остается всегда одинъ и тотъ-же. Такъ поютъ, кажется, самцы лишь въ началѣ лѣта, примѣрно до середины іюня. Въ это время пѣніе слышалось въ самыхъ разнообразныхъ мѣстностяхъ начиная отъ зарослей колючихъ кустарниковъ по пашеннымъ межамъ близъ дна долины и до сплошныхъ бамбуковыхъ чащъ на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ. Много разъ услыхавъ пѣніе, я старался отыскать птичку или же садился и ждалъ, чтобы она налетѣла, но въ большинствѣ случаевъ это ни къ чему не приводило. Пѣніе слышится черезъ небольшіе промежутки времени все ближе и ближе, вотъ оно раздается всего въ 20 шагахъ, но замѣтить птичку въ кустарной или бамбуковой чащѣ невозможно, а черезъ нѣсколько минутъ она поетъ уже далеко впереди. Съ конца іюня я этого пѣнія больше не слыхалъ. Очевидно, птицы приступили къ гнѣздованію, такъ какъ встрѣчались только попарно. Пары держались по пологимъ скатамъ горъ въ мѣстностяхъ, гдѣ лужайки чередовались съ кустарными зарослями и молодыми хвойными перелѣсками и были гораздо менѣе осторожны, чѣмъ одиночныя птицы. Замѣтивъ человѣка, самецъ издавалъ протяжный свистъ сопровождающійся щелканьемъ, въ родѣ «кр..кр.» и пара старалась скрыться, но обыкновенно перелетала не далеко. Я застрѣлилъ 27 іюня въ хвойномъ перелѣскѣ самца, который бѣжалъ по землѣ и тащилъ что то въ клювѣ, очевидно для постройки гнѣзда. Самка, добытая вмѣстѣ съ самцомъ 8 іюля имѣла отдѣльные пузырьки въ яичникахъ, не болѣе конопляпаго зерна, такъ что нестись очевидно еще не начинала. Молодыя въ гнѣздовомъ опереніи добыты 30 іюля и 18 августа, а послѣдняя птица осенью встрѣчена въ началѣ октября.

Chimarrhornis leucocephala (Vig.).

[*Chaemarrornis leucocephala*, David et Oust., Ois. Chine, p. 173, pl. 24.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 47.

Размѣры:

♂	Дл.	200—205.	Разм.	305—310.	Кр.	93—98,5.	Кл.	17,5—18.	Пл.	30,5—31,5.	Хв.	80—83.
♀	»	190.	»	290.	»	92—95.	»	17,5—18,5.	»	31,5.	»	76—78.
?	»	—	»	—	»	89—103.	»	17—19.	»	30,5—32.	»	73—85.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, февраль;—Амдо.

Этотъ видъ найденъ въ южной Гань-су повсюду, но нигдѣ особенно не многочисленъ. Держится исключительно около воды и встрѣчается отъ глубокихъ долинъ до горныхъ ручьевъ подальпійской области.

Ruticilla erythrogastra Sewertzowi, Lorenz.

[*Ruticilla erythrogastra*, David et Oust., Ois. Chine, p. 542.]

Lorenz, Beitrag z. Kenntniss d. Ornith. Faun. Kaukas. p. 23. (1887.).—Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 347, partim.—Плеске, Научн. результ. Путеш. Пржевальскаго, т. II, Птицы, стр. 58.

Размѣры:

♂ Дл. 175. Разм. 300. Кр. 102—104. Кл. 15—17. Пл. 26,5—28. Хв. 79.
♀ » 185. » 310. » 101. » 16. » 27. » 78

Экземпляры: Дер. Пинъ-янъ-ся (с. Гань-су, между гг. Линъ-джеу и Дзинь-юань), октябрь;—монаст. Гумбумъ (около г. Синина), май.

Эта восточная форма, отличающаяся отъ типичной *R. erythrogastra* болѣе свѣтлымъ тономъ рыжихъ частей тѣла и хвоста, встрѣчена только въ сѣверной Гань-су, въ мѣстностяхъ степнаго характера.

Ruticilla aurorea (Gm.).

[*Ruticilla aurorea*, David et Oust., Ois. Chine, p. 170, pl. 26.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 345.

Размѣры:

♂ Дл. 150—155. Разм. 225—240. Кр. 71—77. Кл. 14—15. Пл. 22. Хв. 61—69.
♀ » 150—160. » 215. » 68—74. » 14,5—15. » 22—23. » 60—68.

Экземпляры: Монаст. У-тай-шань, іюнь; — р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), августъ; — г. Хой-сянъ, февраль; — дер. Іо-дзамъ-пу, августъ.

Этотъ видъ встрѣченъ по всему пути отъ Пекина до южной Гань-су включительно. Въ Хойсянскомъ округѣ весьма обыкновенъ, въ ю.-з. Гань-су сравнительно рѣдокъ и встрѣчается только въ долинахъ и предгорьяхъ.

Ruticilla Hodgsoni, Moore.

[*Ruticilla Hodgsoni*, David et Oust., Ois. Chine, p. 171.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 344.

Размѣры:

♂ Дл. 160—165. Разм. 240—260. Кр. 79—85. Кл. 15—15,5. Пл. 24—25. Хв. 67—72.
♀ » 160—165. » 250. » 79—82. » 15. » 24—25. » 64—69.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, январь, февраль; — дер. Лотани, начало октября; — гора Кунгала (близъ г. Сумъ-пана), іюль; — Амдо; — г. Сининъ, апрѣль; — р. Солома (въ Нань-шанѣ), май; — г. Ли-юань-шиъ (у сѣверной подошвы Нань-шаня), іюнь.

Этотъ видъ встрѣченъ въ порядочномъ количествѣ зимой въ Хойсянскомъ округѣ, въ предгорьяхъ на высотѣ 3—5000 футъ и лѣтомъ въ ю.-з. Гань-су, на высотѣ до 10—12000 футъ. Вѣроятно птички, гнѣздуя въ горахъ, зимой далеко не улетаютъ, а спускаются только въ болѣе теплыя долины.

Ruticilla rufiventris (Vieill.).

[*Ruticilla rufiventris*, David et Oust., Ois. Chine, p. 169.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 342.—Hume, Str. Feath., V, p. 36.—Плеске, Научн. Результ. Путеш. Пржевальскаго, т. II, Птицы, стр. 54.

Размѣры:

♂ Дл. 160. Разм. 270. Кр. 85. Кл. 14. Пл. 23,5. Хв. 63.

Экземпляры: Г. Дань-гэръ (=Донкыръ, с. Гань-су), 14 апрѣля.

Нашъ экземпляръ вполнѣ похожъ на рисунокъ Dresser'a въ «Birds of Europe», II, pl. 43.

Этотъ видъ встрѣченъ въ Гань-су только въ безлѣсныхъ степяхъ около городовъ Синина и Дань-гэра.

Ruticilla schisticeps (Hodgs.).

[*Ruticilla schisticeps et* (?) *Ruticilla nigrogularis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 541 et 557.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 351.

Размѣры:

♂	Дл.	150—175.	Разм.	240—260.	Кр.	79—85.	Кл.	14—15,5.	Пл.	23—24.	Хв.	70—77.
♀	»	150—165.	»	240—250.	»	78—81.	»	14—15.	»	23—23,5.	»	68—72.
♂ juv.	»	165.	»	260.	»	84.	»	14,5.	»	24,5.	»	74.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, февраль; — дер. Сатани, ноябрь, декабрь, январь, февраль; — дер. Лотани, октябрь; — дер. Чунъ-дзя (къ югу отъ г. Синина), апрѣль; — Амдо.

Половыя различія въ опереніи замѣтны у этого вида уже въ гнѣздовомъ нарядѣ. Мы имѣемъ одинъ экземпляръ молодой совершенно пятнистой птицы, который можетъ быть однако признаннымъ за самца по черному хвосту и по обозначившейся уже бѣлизнѣ на груди.

Эта горихвостка встрѣчена какъ въ Хойсянскомъ, такъ и въ Сигученскомъ и Миндже-ускомъ округахъ, въ первомъ сравнительно рѣдка, во вторыхъ двухъ болѣе обыкновенна. Держится зимой въ кустарныхъ зарослях предгорій, лѣтомъ же — въ верхнихъ частяхъ горныхъ ущелій, вблизи альпійскихъ луговъ.

Ruticilla frontalis (Vig.).

[*Ruticilla frontalis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 168.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V. p. 349.

Размѣры:

♂	Дл. 160—165.	Разм. 255—275.	Кр. 82—89.	Кл. 15—15,5.	Пл. 23—24.	Хв. 68—73.			
♀	» 150—160.	» 245—255.	» 80—84.	» 15.	» 23—24.	» 65—66.			
♂ juv.	» ——	» ——	» 82—84.	» 13,5—14.	» 23—24.	» 68—70.	(a)		
♀ juv.	» ——	» ——	» 79—82.	» 15,5.	» 23,5.	» 64—67.	(b)		

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, февраль, мартъ; — дер. Дзю-юань, августъ; — дер. Іодзамъ-пу, (b) 20 августа; — дер. Джоза̀-паза̀, (a) конецъ сентября и начало октября; — р. Солома̀ (въ Нань-шанѣ), май.

Наряды этого вида значительно мѣняются по временамъ года, въ зависимости отъ степени обношенности оперенія. Осенью, только что перелинявшіе самцы (въ началѣ октября) имѣютъ на наружныхъ опахалахъ задніхъ маховъ втораго порядка и большихъ верхнихъ кроющихъ крыла рѣзкія рыжія каймы, а на всѣхъ спинхъ перьяхъ груди и спины широкія и рѣдкія рыжія оторочки. Послѣднія придаютъ спинамъ частямъ оперенія сильный рыжій оттѣнокъ. Зимой (декабрь — февраль), каймы на махахъ и кроющихъ становятся у́же, а рыжія оторочки спинхъ перьевъ остаются только на затылкѣ и спинѣ и почти совершенно изчезаютъ на груди. Лѣтомъ, каймы и оторочки совершенно обнашиваются; спній цвѣтъ оперенія становится при этомъ темнѣе, въ особенности на груди по границѣ съ животомъ и на спинѣ по границѣ съ надхвостьемъ, гдѣ онъ переходитъ въ черно-спній.—У самокъ различіе въ сезонныхъ нарядахъ также довольно рѣзко. У осенніхъ общій цвѣтъ оперенія оливково-желтый, у лѣтнихъ — голова, спина, задъ и грудь грязно-сѣрые (цвѣта основной части перьевъ) только со слабымъ желтоватымъ налетомъ, а оливковый цвѣтъ сохраняется лишь на бокахъ тѣла и на животѣ.

Въ числѣ нашихъ экземпляровъ есть четыре молодыя птицы, между которыми уже можно различить самцовъ и самокъ, не смотря на то, что всѣ онѣ еще въ пятнистомъ гнѣздовомъ оперенін. У самцовъ свѣтлыя середины перьевъ головы и спины желтоватаго цвѣта, а хвостъ, рыжій въ основной части, имѣетъ рѣзко ограниченныя черныя каймы на концахъ рулей, подобно какъ у взрослаго самца.—У самокъ середины перьевъ головы и спины бѣловаты, а черный и рыжій цвѣта на рулях разграничены не рѣзко, а переходятъ постепенно одинъ въ другой, — какъ у взрослой самки.

Этотъ видъ найденъ, подобно *R. schisticeps*, какъ въ восточной, такъ и въ западной части южной Гань-су, но въ меньшемъ количествѣ. Въ Сигученскомъ и Миндзеускомъ округахъ я встрѣчалъ лѣтомъ оба вида въ однѣхъ и тѣхъ же мѣстностяхъ—въ вершинахъ горныхъ ущелій, вблизи альпійскихъ луговъ; зимой же *R. schisticeps* была не рѣдка въ предгорьяхъ на высотѣ 7—8000 футъ, а *R. frontalis* не встрѣчена здѣсь ни разу.

Grandala coelicolor, Hodgs.

[*Grandala coelicolor*, David et Oust., Ois. Chine, p. 176, pl. 31.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 328.

Размѣры:

♂	Дл. 217—230.	Разм. 390—410.	Кр. 138—145.	Кл. 19,5—20,2.	Пл. 28—29.	Хв. 87—92.
♀	» 202—220.	» 380—395.	» 129—136.	» 20—20,2.	» 27—28.	» 80—86.
♂ imm.	» ——	» ——	» 137.	» 19,5.	» 27.	» 81.

Экземпляры: Дер. Сàтани, декабрь, январь, ноябрь; — дер. Чагò, декабрь, январь.

Самцы этого вида получаютъ свой роскошный синій нарядъ, вѣроятно, только на второй годъ. Одинъ изъ нашихъ экземпляровъ, молодой самецъ, добытый въ началѣ января и полъ котораго опредѣленъ вскрытіемъ, почти совершенно еще похожъ на самку, отличаясь отъ послѣдней только слабыми слѣдами синяго цвѣта на нѣкоторыхъ перьяхъ головы и шеи.

Всѣ наши самцы, битые поздней осенью и зимой, имѣютъ опереніе матоваго темно-ультрамаринноваго цвѣта со слѣдами рыжихъ оторочекъ на нѣкоторыхъ перьяхъ; самецъ же добытый въ сентябрѣ [1]) и сильно линявшій, имѣлъ старое опереніе гораздо болѣе свѣтлаго синяго цвѣта, чѣмъ у зимнихъ и не матовое, а съ сильнымъ блескомъ. Послѣднее обстоятельство объясняется стираніемъ рыхлыхъ оторочекъ перьевъ, но болѣе свѣтлый синій цвѣтъ зависитъ, вѣроятно, отъ другой причины, такъ какъ у зимнихъ птицъ основныя части перьевъ отнюдь не свѣтлѣе концовъ.

Эта красивая птичка встрѣчена въ ю.-з. Гань-су только на самыхъ высокихъ горныхъ хребтахъ, гдѣ живетъ въ альпійскихъ горахъ и повидимому совершенно осѣдла. Въ продолженіи двухъ зимъ я наблюдалъ ее въ хребтѣ, отдѣляющемъ Гань-су отъ Сы-чуани, противъ деревень Сàтани и Чагò и добылъ одну линявшую птицу въ сентябрѣ, въ горномъ хребтѣ лѣваго берега Сигученской рѣки около дер. Джозà-пазà. Зимой птички держатся всегда болѣе или менѣе многочисленными табунами отъ 30 до 100 штукъ и болѣе. Интересно что сотенные табуны состоятъ иногда почти изъ однихъ сѣрыхъ птицъ, т. е. самокъ и молодыхъ самцовъ, иногда же попадаются табунки въ 50 штукъ и болѣе, состоящіе только изъ однихъ синихъ самцовъ. Даже зимой, какъ я уже сказалъ, этотъ видъ живетъ исключительно въ альпійскихъ лугахъ, ниже, въ подальпійскомъ кустарномъ и лѣсномъ поясѣ, я наблюдалъ его всего два раза, въ обоихъ случаяхъ послѣ нѣсколькихъ дней ненастной снѣжной погоды.

---

[1]) Этотъ экземпляръ былъ настолько попорченъ, что не сохраненъ.

Calliope kamtschatkensis (Gm.).

[*Calliope kamtschatkensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 235.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 305.

Размѣры:

♂ Кр. 77. Кл. 16,5. Пл. 29. Хв. 61. (a)
♀ » 75. » 16. » 28. » 62. (b)

Экземпляры: a. Амдо;—b. дер. Дзю-юань, іюль.

Въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ камчатскій соловей крайне рѣдокъ,—я встрѣтилъ его только однажды около дер. Дзю-юань. Другой экземпляръ нашей коллекціи добытъ г. Потанинымъ по пути отъ города Гуй-дэ въ городъ Минджеу.

Larvivora brunnea (Hodgs.).

[*Janthia indica*, David et Oust., Ois. Chine, p. 232.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 302.

Размѣры:

♂ Дл. 150. Разм. 230—245. Кр. 77—79. Кл. 15. Пл. 27. Хв. 54—56.
♀ » 145. » 240. » 73—75. » 15. » 27. » 50—51.
♂ juv. 145. » 240. » 73. » 14,5. » 27,5. » 51.

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, май, іюнь, іюль, августъ.

Такъ какъ гнѣздовой нарядъ этого вида, кажется, еще не извѣстенъ, даемъ краткое описаніе молодаго самца, добытаго 21 іюля, который мѣняетъ гнѣздовое оперенiе на полный нарядъ.

Голова рыжевато-бурая съ узкими рыжими наствольными полосками на всѣхъ перьяхъ; бѣлыхъ надбровныхъ полосъ нѣтъ. Спина подобна головѣ, только наствольныя полоски менѣе рѣзки. Надхвостье буро-рыжее, одноцвѣтное. Хвостъ сиреватый, какъ у взрослаго самца. На нижней сторонѣ пятнистость рѣзче. Всѣ перья зоба и груди съ большими рыжими трехугольными пятнами въ серединѣ и широкой рѣзкой черновато-бурой каймой по краямъ. Подбородокъ и шея такія же, только цвѣта блѣднѣе. Бока тѣла бурые, безъ пятенъ; на нихъ пробивается уже островками новое, ярко рыжее, оперенiе полнаго наряда. Середина живота грязно-бѣлая. Радужина очень темная, почти черная; клювъ: верхняя челюсть черная, нижняя—розовато-бурая; плюсны розовато-бурыя.

Этотъ видъ встрѣченъ только въ ущельи рѣки Іо-дзамъ-пу и въ небольшомъ количествѣ. Птички попадались изрѣдка въ продолженіи всего лѣта, по одиночкѣ или парами, въ густыхъ влажныхъ лиственныхъ лѣсахъ средней части ущелья, на высотѣ около 8000 футъ. Замѣтивъ человѣка, самецъ съ крикомъ преслѣдуетъ его, летая кругомъ и садясь на нижнія выдающіяся вѣтви деревьевъ. Голосъ его—протяжный рѣзкій свистъ, сопровождающійся щелканьемъ, вродѣ «кр... кр...» Самка держится молчаливо въ кустарномъ лѣсномъ подсѣдѣ и добыть ее трудно.

Larvivora obscura, sp. nov.

Табл. I, фиг. 2.

Размѣры:

♂ Дл. 140—150. Разм. 210—240. Кр. 66—71. Кл. 15,5—16. Пл. 26—29. Хв. 51—53.

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, май, іюнь, іюль, августъ.

Описаніе:

Самецъ. *Ноздревыя перья* и *уздечки* черныя, черный цвѣтъ заходитъ узкой полоской надъ глазомъ до половины длины послѣдняго. *Остальной верхъ головы, затылокъ, верхъ* и *бока шеи* и *спина*—темно аспидно-синіе; у птицъ въ свѣжемъ опереніи свѣтлѣе, — въ обношенномъ опереніи темнѣе. *Надхвостье* почти такого же цвѣта какъ спина, слегка сѣрѣе. *Верхнія кроющія хвоста* черныя. *Щеки, ушныя перья, подбородокъ, зобъ и грудь*—блестяще-черные. *Бока тѣла* дымчато сѣрые съ рыжеватымъ оттѣнкомъ. *Середина живота* бѣлая. *Подхвостье* и *нижнія кроющія хвоста* грязно-бѣлыя съ рыжеватымъ оттѣнкомъ. *Плечевыя* и *верхнія малыя кроющія крыла* темно аспидно-синіе, подобно спинѣ. *Большія* и *среднія кроющія* бурыя. *Главные махи* бурые съ сѣроватой оторочкой по наружному опахалу, которая у основанія маховъ становится бѣловатой. *Махи втораго* и *третьяго порядковъ* бурые съ темно синевато-сѣрымъ налетомъ на наружныхъ опахалахъ и съ неясной свѣтлой каймой на внутреннихъ. *Всѣ нижнія кроющія крыла* свѣтло-рыжеватыя. *Два среднихъ руля* черные, стержни ихъ у основанія бѣлые. *Остальные рули* бѣлые въ основной части и черные въ конечной. На самомъ внѣшнемъ рулѣ бѣлый цвѣтъ занимаетъ немного болѣе $^1/_3$, а на второмъ рулѣ $^1/_2$ длины пера; на томъ и на другомъ онъ вдается въ черный цвѣтъ конечной части рулей узкимъ клиномъ, вершина котораго лежитъ на стержнѣ пера. На третьемъ рулѣ бѣлый цвѣтъ занимаетъ $^2/_3$ его длины и также вдается клиномъ въ черный, но вершина клина закруглена и лежитъ не на стержнѣ пера, а на внѣшнемъ опахалѣ. На четвертомъ рулѣ бѣлый цвѣтъ занимаетъ $^3/_4$ и на пятомъ $^5/_6$ ихъ длины, на томъ и на другомъ вершина бѣлаго клина не только закруглена, а раздѣлена на двѣ вѣтви чернымъ цвѣтомъ, который узкимъ клинышкомъ проникаетъ по стержню; кромѣ того на пятомъ рулѣ бѣлый цвѣтъ заходитъ дальше по внѣшнему опахалу, чѣмъ по внутреннему.

Крыло закругленное. 4-й и 5-й махи равны и образуютъ вершину крыла; 3-й махъ примѣрно равенъ 6-му, иногда немного больше, иногда меньше, не доходитъ до вершины крыла на $1^1/_2$—3 мм.; 2-й махъ больше 8-го меньше 7-го не доходитъ до вершины крыла на 10—11 мм.; 1-й махъ немного длиннѣе половины 2-го, короче 4-го и 5-го на 29—32 мм. *Хвостъ* закругленный и состоитъ изъ 12 рулей. Крайніе рули короче среднихъ на $6^1/_2$—$8^1/_2$ мм. Верхнія кроющія хвоста закрываютъ хвостъ на $^3/_5$ его длины.

Радужина очень темная. *Клювъ* черный, по формѣ совершенно такой же какъ у *L. brunea* и безъ щетинокъ на зѣвкахъ. *Плюсны* синевато-сѣрыя.

Самка не извѣстна.

За все время моего пребыванія въ Гань-су я встрѣтилъ этотъ видъ только въ восточной части Минджеускаго округа въ ущельи рѣчки Іо-дзамъ-пу и добылъ только четырехъ самцовъ—всѣхъ, которыхъ видѣлъ. Во всѣхъ случаяхъ птички встрѣчены въ сплошныхъ бамбуковыхъ чащахъ на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ, на высотѣ 10—11000 футъ. Я нашелъ 2 августа въ бамбуковой чащѣ на землѣ 4-хъ совершенно голыхъ, вѣроятно вывалившихся изъ гнѣзда птенцовъ и тутъ же застрѣлилъ самца, который уже началъ линять. Къ сожалѣнію, дѣло было на закатѣ солнца и я не могъ скараулить самки. Вѣроятно этому виду принадлежитъ чрезвычайно мелодичное пѣніе, напоминающее звуки флейты, которое я много разъ слышалъ въ бамбуковыхъ чащахъ и въ глухихъ еловыхъ съ бамбуковою порослью лѣсахъ, но ни разу не могъ прослѣдить пѣвца.

Myiophoneus coeruleus (Scop.).

[*Myiophoneus coeruleus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 176, pl. 43.]

Sharpe, Cat B. Brit. Mus., VII, p. 9.

Размѣры:

♂ Дл. 330. Разм. 540. Кр. 170—174. Кл. 30,5—31. Пл. 52—53. Хв. 119—131.
juv. » — » — » 127. » 25. » 52. » 73. (a)

Экземпляры: Городъ Си-хо (ю. Гань-су), начало мая;—дер. Іо-дзамъ-пу, конецъ мая, (a) 1 августа.

Молодая птица, добытая 1 августа и уже летавшая, но съ неотросшимъ хвостомъ, имѣетъ всю верхнюю сторону темно-индигово-синюю, низъ же матово-бурочерный, безъ слѣдовъ блестящихъ пятенъ на концахъ перьевъ, но уже съ нѣкоторыми перышками груди синеватаго цвѣта. Клювъ—темный, къ концу свѣтлѣе; зѣвки и основныя края челюстей—желтыя.

Этотъ видъ гнѣздится въ небольшомъ количествѣ въ южной Гань-су, на зиму же улетаетъ. Встрѣчается въ лѣсныхъ долинахъ, въ кустарныхъ чащахъ около воды.

Monticola cyaneus (Linn.).

[*Monticola cyanea*, David et Oust., Ois. Chine, p. 163.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 316.

Размѣры:

♂ Дл. 225—230. Разм. 350—365. Кр. 116—119. Кл. 24—25. Пл. 27,5—28. Хв. 84—86.
♀ » 220—230. » 340—360. » 110—119. » 25—26,5. » 28—29,5. » 84—88.

Экземпляры: Г. Си-гу, іюль;—дер. Лотани, конецъ сентября.

Каменный дроздъ встрѣченъ въ небольшомъ количествѣ только по береговымъ утесамъ Сигуенской рѣки отъ г. Си-гу до деревни Лотани и вѣроятно, что подымается и выше; по второстепеннымъ же рѣчкамъ Сигуенскаго и Минджеускаго округовъ его нигдѣ нѣтъ.

Monticola gularis (Swinhoe).

[*Monticola gularis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 161, pl. 42.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 326.

Размѣры:

♂ juv. Кр. 98. Кл. 20. Пл. 23,5. Хв. 72.

Экземпляръ: Дер. Лотани, конецъ сентября.

Единственный экземпляръ этого вида добытъ въ концѣ сентября въ долинѣ Сигученской рѣки, въ саду дер. Лотани, это молодой самецъ сильно линяющій, частью еще въ гнѣздовомъ перѣ, частью въ нарядѣ взрослаго.

Turdus auritus, J. Verr.

[*Turdus auritus*, David et Oust, Ois. Chine, p. 157.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 193.

Размѣры:

♂ Дл. 240—250. Разм. 370. Кр. 116—121. Кл, 23—24. Пл. 35,5—36. Хв. 97—106.
♀ » 245. » 355. » 115. » 24. » 35. » 98.

Радужина почти черная. Клювъ: верхняя челюсть черная, основаніе нижней и зѣвки желтые. Плюсны сѣро-желтоватыя.

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль;—дер. Лотани, конецъ сентября.

Этотъ дроздъ найденъ гнѣздящимся въ восточной части Минджеускаго округа, но въ самомъ небольшомъ количествѣ. За все время я видѣлъ и добылъ всего три штуки, въ томъ числѣ одну самку на гнѣздѣ Послѣдняя встрѣчена 20 іюня въ средней части ущелья рѣчки Іо-дзамъ-пу на высотѣ 7500—8000 футъ, на увалѣ, который былъ когда-то распаханъ и вновь заросъ мелколѣсьемъ. Гнѣздо помѣщалось въ развилинѣ небольшаго дерева на опушкѣ лѣса, на высотѣ въ ростъ человѣка. Лоточекъ, лежащій на толстой подстилкѣ изъ мха, свитъ изъ грубой сухой травы и имѣетъ 80 мм. въ діаметрѣ при значительной глубинѣ. Въ немъ заключалось четыре ненаспженыхъ яйца, совершенно сходныхъ съ изображенными у Пржевальскаго въ «Монголія и страна Тангутовъ» (т. II, табл. XX, фиг. 13.). Я подстрѣлилъ 29-го іюня еще плохо летавшаго птенца, на крикъ котораго явилась взрослая птица, оказавшаяся самцомъ. Съ гнѣвными криками и съ поднятыми дыбомъ перьями затылка, носилась она кругомъ, почти задѣвая меня крыльями. *T. auritus*, весьма близкій къ *T. musicus* по окраскѣ, очевидно сходенъ съ нимъ и по характеру, такъ какъ самецъ послѣдняго вида точно также самоотверженно защищаетъ свое потомство.

Merula sibirica (Pall.).

[*Turdus sibiricus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 149.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 180.

Размѣры:

♂ Дл. 245. Разм. 372. Кр. 120. Кл. 24,5. Пл. 29. Хв. 90.

Экземпляры: Дер. Джоза-паза, начало октября.

Единственный экземпляръ этого вида добытъ въ началѣ октября, въ лѣсномъ

ущельи въ горахъ лѣваго берега Сигученской рѣки, на высотѣ болѣе 10000 футъ. Тамъ же и въ то же время замѣчены еще 2 — 3 штуки и возможно, что это были пролетныя.

Merula merula mandarina, Bp.

[*Merula sinensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 148.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 238.

Размѣры:

♂ Дл. 290—300. Разм. 455—470. Кр. 145—156. Кл. 27. Пл. 36. Хв. 117—123.
♀ » 270—280. » 465—472. » 149—153. » 27. » 34—36. » 115—121.

Экземпляры: Г. Си-гу, 9 февраля.

Изо всѣхъ посѣщенныхъ мною мѣстностей южной Гань-су, китайскій черный дроздъ встрѣченъ только въ садахъ г. Си-гу, гдѣ наблюдался въ порядочномъ количествѣ и зимой и лѣтомъ.

Merula Gouldi, J. Verr.

[*Merula Gouldi*, David et Oust., Ois. Chine, p. 148, pl. 39.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 260. — Плеске, Научн. Результ Путеш. Пржевальскаго, т. II, Птицы, стр. 18.

Размѣры:

♂	Дл.	290—295.	Разм.	440.	Кр.	141—145.	Кл.	26,5—28.	Пл.	35—37.	Хв.	115—125.
♀	»	280—285.	»	425.	»	136.	»	26—27.	»	35,5—36,5.	»	114—117.
♀ juv.	»	260.	»	400.	»	131.	»	23.	»	34.	»	102. (a)
♂ juv.	»	255.	»	420.	»	130.	»	24.	»	34.	»	95. (b)
♀ juv.	»	—	»	—	»	106.	»	23.	»	35.	»	63. (c)

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, іюль, (a) 9-го іюля;—дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, (b) 23-го іюля, (c) 4-го августа;—дер. Чаго, 9-го іюля.

Этотъ дроздъ довольно обыкновенъ въ Сигученскомъ и Миндженскомъ округахъ лѣтомъ, но нигдѣ ни здѣсь, ни въ другихъ извѣстныхъ мнѣ мѣстностяхъ южной Гань-су, не зимуетъ. Встрѣчается въ горныхъ лѣсныхъ долинахъ, на высотѣ приблизительно съ 7500 футъ, обыкновенно вблизи деревень, по опушкамъ лѣсовъ и кустарнымъ зарослямъ береговыхъ уваловъ долинъ,—высоко въ горы и въ сплошные лѣса не проникаетъ. Наши молодыя птицы въ пятнистомъ оперенiи добыты съ промежуткомъ въ цѣлый мѣсяцъ, такъ что этотъ дроздъ выводитъ въ лѣто, вѣроятно, два раза.

Merula Kessleri, Przew.

[*Merula Kessleri*, David et Oust., Ois. Chine, p 540.]

Плеске, Научн. Результ. Путеш. Пржевальскаго, т. II, Птицы, стр. 21.—Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 261.

Размѣры:

Кр. 152. Кл. 26. Пл. 36. Хв. 128.

Экземпляръ: Гора Купчала (по пути отъ города Нань-пинъ въ городъ Сумъ-панъ, въ 3-хъ переходахъ отъ послѣдняго), 24 іюля.

Единственный экземпляръ нашей коллекцiи добытъ экспедицiею Г. Н. Потанина въ высокой лѣсной горной странѣ къ сѣверу и недалеко отъ города Сумъ-пана въ Сычуани. Въ южной Гань-су этотъ видъ нигдѣ не встрѣченъ.

Merula ruficollis (Pall.).

[*Merula ruficollis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 156.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 269.—Плеске, Научн. Результ. Путеш. Пржевальскаго, т. II, Птицы, стр. 7.

Размѣры:

♂ ad.	Дл.	270.	Разм.	440.	Кр.	144.	Кл.	25.	Пл.	33,5.	Хв. 108. (a)
?♀ ad.	»	255.	»	410.	»	134.	»	21.	»	33,5.	» 105. (b)
♂ imm.	»	250–270.	»	395–425.	»	129–138.	»	21–23,5.	»	33–33,5.	» 99–110.
♀ imm.	»	225–265.	»	345–310.	»	130–134.	»	21–24,5.	»	32–34.	» 98–103.

Экземпляры: Уроч. Боро-балгасунъ (ю. Ордосъ), сентябрь;—окр. г. Хой-сянъ, декабрь, январь, апрѣль;—дер. Сатани, январь;—дер. Чунъ-дзя (близъ Желтой рѣки, къ югу отъ г. Синина), (a) 15 апрѣля;—дер. Лотани, (b) ноябрь.

Краснозобый дроздъ найденъ зимующимъ въ довольно большомъ количествѣ въ восточной части Хойсянскаго округа и въ лѣсистыхъ предгорьяхъ на восточной границѣ Гань-су съ Шенси. Въ ю.-з. Гань-су встрѣчены только 2—3 одиночныя птицы зимой и поздней осенью, лѣтомъ же этотъ видъ не наблюдался.

Два изъ нашихъ экземпляровъ, добытыхъ въ Хойсянскомъ округѣ, представляютъ такія особенности въ окраскѣ, что мы склонны считать ихъ за ублюдковъ отъ *M. ruficollis* и *M. fuscata*. По общему блѣдно-сѣрому цвѣту верхней стороны и по отсутствію рыжаго цвѣта на надхвостьи и бокахъ тѣла, оба экземпляра схожи съ *M. ruficollis*, но имѣютъ оторочки маховъ, въ особенности 2-го порядка, рыжеватыя, какъ у *M. fuscata*. У одного экземпляра горло и зобъ буровато-рыжіе, грудь рыжевато черная со свѣтлыми ободками перьевъ; у другаго горло бѣловатое, а зобъ и грудь черновато-бурые и также со свѣтлыми ободками перьевъ груди. Хвостъ у обѣихъ птицъ совершенно такой же, какъ у *M. ruficollis*, т. е. два среднихъ руля бурые съ рыжими основаніями, а остальные — рыжіе съ примѣсью бураго цвѣта по наружнымъ опахаламъ. Темный топъ груднаго щита нашихъ птицъ могъ бы быть объясненъ примѣсью крови *M. atrigularis*, если бы не рыжеватыя оторочки маховъ, свойственныя только *M. Naumani* и *M. fuscata*; тотъ же темный топъ груднаго щита говоритъ въ пользу примѣси крови послѣдняго вида.

Merula Naumanni (Temm.).

[*Merula Naumanni*, David et Oust., Ois. Chine, p. 153.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 264.

Размѣры:

♂	Дл.	240—260.	Разм.	395—415.	Кр.	128—136.	Кл.	22,5—24.	Пл.	32—34.	Хв. 94—96.
? imm.	»	260.	»	——	»	127	»	22.	»	31.	» 86. (a)

Экземпляры: (a) Уроч. Боро-балгасунъ (Ордосъ), сентябрь;—уроч. Кванъ-дзя-коу, декабрь;—г. Хой-сянъ, февраль.

Экземпляръ изъ Ордоса, повидимому, молодая птица, сверху свѣтло сѣрый, какъ *M. ruficollis* и также безъ слѣдовъ рыжаго цвѣта на надхвостьи и на оторочкахъ маховъ, имѣетъ однако бока туловища и подхвостье съ рѣзкими рыжими пятнами.

Этотъ видъ встрѣченъ зимующимъ въ ю.-в. Гань-су, въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и *M. ruficollis*, но въ меньшемъ количествѣ.

Merula fuscata (Pall.).

[*Merula fuscata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 155.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 262.

Размѣры:

♀ Дл. 240. Разм, 395. Кр. 126. Кл. 22. Пл. 32. Хв. 88.

Экземпляръ: Уроч. Кванъ-дзя-коу, февраль.

Этотъ видъ также встрѣченъ зимующимъ въ ю.-в. Гань-су, но въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ два предидущихъ вида. *M. fuscata* крайне осторожная птица и добыть ее трудно.

Merula obscura (Gmel.).

[*Turdus obscurus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 153.]

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 273.

Размѣры:

Дл. 265. Разм. 420. Кр. 121. Кл. 20. Пл. 32. Хв. 86.

Экземпляръ: Уроч. Боро-балгасунъ (Ордосъ), сентябрь.

Нашъ единственный экземпляръ—изъ Ордоса, въ Гань-су же этотъ видъ нигдѣ не встрѣченъ.

CINCLIDAE.

Cinclus cashmeriensis, Gould.

[*Hydrobata cashmeriensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 147.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VI, p. 312.—Плеске, Научн. Результ. Путеш. Пржевальскаго, т. II, Птицы, стр. 32.

Размѣры:

♂ Дл. 197—200. Разм. 305. Кр. 93—96. Кл. 21,5—23. Пл. 28—29,5. Хв. 57—58.

Экземпляры: Г. Си-гу, февраль;—дер. Лотани, октябрь.

Эта оляпка встрѣчена только въ самомъ небольшомъ количествѣ въ долинахъ рѣкъ ю.-з. Гань-су.

Cinclus sordidus, Gould.

[*Hydrobata sordida*, David et Oust., Ois. Chine, p. 539.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VI, p. 317.

Размѣры:

♂ Дл. 190. Разм. 310. Кр. 92. Кл. 22. Пл. 30. Хв. 60.

Экземпляръ: Дер. Лотани, середина октября.

Мы относимъ къ этому виду одинъ экземпляръ, добытый въ серединѣ октября на горномъ ручьѣ близъ деревни Лотани. Сверху птичка совершенно тождественна съ *C. cashmeriensis*, но имѣетъ всю нижнюю сторону тѣла бурую, съ отдѣльно разбросанными сѣровато-бѣлыми перышками на зобу и груди. Кромѣ того бока тѣла у ней слегка сѣрѣе, а перья боковъ, живота и надхвостья безъ бѣлыхъ кончиковъ, которые довольно рѣзки у нашихъ экземпляровъ *C. cashmeriensis*. Бѣловатыя перышки на зобу и груди нашей птицы ставятъ насъ въ нѣкоторое недоумѣніе, такъ какъ у типичной *C. sordidus* вся нижняя сторона тѣла почти одноцвѣтно-бурая. Возможно однако, что это явленіе случайное и бѣлые перышки выросли на когда-то пораненыхъ мѣстахъ, но возможно также, что они указываютъ на примѣсь крови *C. cashmeriensis*.

Cinclus Pallasi, Temm.

[*Hydrobata Pallasii*, David et Oust., Ois. Chine, p. 146.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VI, p. 316.

Размѣры:

♂ Дл. 230. Разм. — Кр. 112. Кл. 27,5. Пл. 35,5. Хв. 69.
? » 245. » 370. » 110. » 26. » 33—34. » 67.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь;—г. Вэнь-сянъ (на самой южной границѣ Гань-су), сентябрь.

Въ восточной, болѣе низкой, части Гань-су эта оляпка встрѣчается повсемѣстно, хотя въ небольшомъ количествѣ, въ Сигученскомъ же и Минджеускомъ округахъ не была наблюдаема.

TROGLODITIDAE.

Spelaeornis Halsueti (David).

[*Spelaeornis Halsueti*, David et Oust., Ois. Chine, p. 228, pl. 16.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VI, p. 264.

Размѣры:

♀ Дл. 115. Разм. 155. Кр. 48. Кл. 12,5. Пл. 19,5. Хв. 53.

Радужина темно карминно-красная. Клювъ: верхняя челюсть свѣтло-бурая, нижняя—буро-розоватая. Плюсны грязно-бѣлыя.

Экземпляры: Дер. Лянъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ.

Этотъ видъ, открытый David'омъ въ Шенси, найденъ мною въ той же провинціи близъ западной ея границы съ Гань-су и Сы-чуанью. Встрѣчено всего двѣ пары, одна—въ вершинахъ небольшой горной долинки, въ зарослях мелкихъ колючихъ кустарниковъ, другая—на междолинномъ хребтикѣ, въ небольшомъ перелѣскѣ. Птички перелетали низомъ въ кустарной чащѣ, напоминая полетомъ крапивника.

Troglodytes nipalensis, Hodgs.

[*Troglodytes nipalensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 226.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VI, p. 277.

Размѣры:

♂ Дл. 102. Разм. 155. Кр. 50. Кл. 13,5. Пл. 18,5. Хв. 32.
♀ » 100. » 150. » 47. » 13,5. » 18. » 31.

Экземпляры: Уроч. Кванъ-дзя-коу (къ востоку отъ г. Хой-сяна, на границѣ Шенси), декабрь;—дер. Сатани, январь;—дер. Іо-дзамъ-пу, августъ.

Мы имѣли возможность сравнить наши экземпляры только съ *T. dauricus* и *T. fumigatus*. Они отличаются отъ обоихъ видовъ и совершенно подобны экземплярамъ Пржевальскаго изъ сѣверной Гань-су. Вѣроятно ганьсуйскія птицы должны быть всѣ отнесены къ *T. nipalensis*, но возможно также, что онѣ принадлежатъ къ той промежуточной расѣ, которую David встрѣтилъ въ Шенси и которая представляетъ, по его словамъ, признаки промежуточные между птицами изъ Муппина и Пекина. Къ сожалѣнію, мы не имѣли для сравненія типичныхъ экземпляровъ *T. nipalensis* изъ Индіи.

Крапивникъ встрѣченъ и въ ю.-в. и въ ю.-з. Гань-су. Птички, какъ и въ Европѣ, зимой нерѣдко живутъ внутри деревень, лѣтомъ же подымаются въ горы и лѣса и встрѣчаются даже въ альпійской области.

CAMPEPHAGIDAE.

Pericrocotus brevirostris. Vigors.

[*Pericrocotus brevirostris*, David et Oust., Ois. Chine, p. 140, pl. 78.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 79.

Размѣры:

♂ Дл. 200—205. Разм. 270—280. Кр. 89—93. Кл. 14—15,5. Пл. 13,5—14. Хв. 101—109.
♀ » 200. » 270. » 87—90. » 15. » 14. » 100—106.
juv.» — » — » 88. » 15. » 14. » 104.

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, май, августъ;—дер. Лотани, середина октября.

Въ числѣ нашихъ экземпляровъ есть одна молодая птица, добытая въ началѣ августа, которая частью сохранила гнѣздовое оперенiе. Въ общемъ она похожа на взрослую самку, но отличается отъ послѣдней тѣмъ, что имѣетъ на сѣрыхъ перьяхъ головы и оливково-зеленыхъ спины узкія бѣловатыя конечныя каемки и широкія черноватыя предконечныя полоски, а грудь и бока тѣла частью желтые—какъ у самки—частью грязно-сѣрые; всѣ перья послѣдняго цвѣта съ маленькимъ черноватымъ пятнышкомъ въ серединѣ и бѣловатой оторочкой на концѣ. Крылья и хвостъ этой птицы почти такіе же какъ у самки, за исключенiемъ того, что два предпослѣднихъ маха втораго порядка на концахъ и на конечной части наружныхъ опахалъ имѣютъ широкія свѣтло-желтыя каймы, которыхъ у взрослой самки нѣтъ.

Этотъ видъ довольно обыкновенъ лѣтомъ въ лиственныхъ лѣсахъ ю.-з. Гань-су, примѣрно съ 7000 ф. высоты. Весной и осенью птички держатся небольшими табунками въ 5—10 штукъ, которые путешествуютъ по лѣсу, перелетая по вершинамъ деревьевъ. Самка, убитая 27 мая, имѣла въ яицепроводѣ очень крупное яйцо, но еще безъ скорлупы. Самыя позднiя птицы наблюдались въ концѣ октября.

Campophaga saturata (Swinh.).

[*Valvocivora saturata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 103].

Oates, B. Brit. Burmah, I, p. 230.—Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 66.

Размѣры:

♂ Дл. 250. Разм. 375. Кр. 122. Кл. 20. Пл. 22. Хв. 117.

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, 6-го мая.

Пользуясь каталогомъ Британскаго музея (l. c.), мы опредѣлили нашу птицу за *C. intermedia*, Hume, видъ, который г. Oates считается тождественнымъ съ *C. saturata*, Swinhoe.

Единственный экземпляръ этого вида добытъ 6 мая въ саду г. Хой-сяна. Птичка съ чрезвычайно громкими криками перелетала по вершинамъ высокихъ сыдзовыхъ деревьевъ и, вѣроятно, была изъ первыхъ прилетныхъ, такъ какъ подобнаго голоса я раньше ни разу не слыхалъ.

DICRURIDAE.

Buchanga atra (Hermann).

[*Dicrurus cathoecus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 108.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 246.

Размѣры:

♂ Дл. 280—300. Разм. 450. Кр. 144. Кл. 23,5—24. Пл. 22. Хв. 148.
♀ » 275. » 430. » 135. » 24. » 20. » 143.

Экземпляры: Городъ Бао-динъ-фу (Пекинская равнина), іюнь.

Этотъ видъ встрѣченъ только на Пекинской равнинѣ, гдѣ довольно обыкновененъ.

LANIIDAE.

Otomela lucionensis (Linn.).

[*Lanius lucionensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 99.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 274.—Богдановъ, Сорокоп. Русс. Фауны, стр. 46.

Размѣры:

♀ Дл. 200. Разм. 285. Кр. 88—91. Кл. 20—21. Пл. 24—25. Хв. 86—92.

Экземпляры: Городъ Танъ-сянъ (Пекинская равнина), іюнь;—дер. Ши-дзуй-дза (близъ монаст. У-тай-шань), іюнь.

Этотъ сорокопутъ, весьма обыкновенный на Пекинской равнинѣ, встрѣчался повсюду по окаймляющимъ дороги деревьямъ.

Otomela phoenicura (Pall.).

[? *Lanius cristatus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 99.]

Богдановъ, Сорокоп. Русс. Фауны, стр. 3. — *Lanius cristatus*, Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 271 (partim).

Размѣры:

♀ Дл. 200. Разм. 280. Кр. 87. Кл. 18. Пл. 26. Хв. 85.

Экземпляръ: Дер. Лотани, сентябрь.

Единственный экземпляръ этого вида встрѣченъ и добытъ въ концѣ сентября около дер. Лотани, Миндзеускаго округа. Вѣроятно, это пролетная птица.

Otomela speculigera (Tacz.).

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 279. — *Otomela isabelina, var. orientalis*, Богдановъ, Сорокоп. Русс. Фауны, стр. 28.

Размѣры:

ad. Кр. 89. Кл. 20. Пл. 23. Хв. 80.
juv. » 91—92. » 17,5—18,5. » 23. » 81—82.

Экземпляры: Уроч. Чаганъ-бэли (на рѣкѣ Едзинъ-голъ въ южной Гоби), 17 іюля.

Мы имѣемъ три экземпляра этого вида, одну старую и двухъ молодыхъ птицъ, которыя добыты экспедиціей Г. Н. Потанина на обратномъ его пути въ Россію. Птицы

добыты въ одномъ мѣстѣ и въ одно время и несомнѣнно принадлежатъ къ одному виду. Старая имѣетъ чрезвычайно отрепанное оперенiе и начала линять, молодыя же—еще пятнистыя, но уже съ совершенно отросшими махами и хвостомъ. Онѣ отличаются отъ старой полнымъ отсутствiемъ бѣлаго зеркальца на крыльяхъ и цвѣтомъ и формой клюва. У старой птицы клювъ желто-розоваго цвѣта, съ болѣе свѣтлой основной половиной нижней челюсти и основными краями верхней и имѣетъ на концѣ очень длинный крючекъ; у молодыхъ клювъ сверху буроватый, снизу свѣтлый (вѣроятно желтый),—очень толстъ и съ очень маленькимъ крючкомъ.

Collurio tephronotus (Vigors.).

[*Lanius tephronotus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 94.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 261.

Размѣры:

♂ Дл. 230—260. Разм. 310—325. Кр. 97—104. Кл. 22. Пл. 28—28,5. Хв. 112—121.
♀ » 235—240. » 310. » 97—98. » 20—22. » 28,5. » 105—108.

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, iюль;—дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Io-дзамъ-пу, iюнь, iюль, августъ;—дер. Лотани, сентябрь;—ур. Ксерицо (въ Сычуани), августъ.

Самка этого вида, кажется, отличается отъ самца бо́льшимъ развитiемъ рыжеватаго цвѣта въ оперенiи. Она имѣетъ рыжеватые—бока, нижнюю часть спины, надхвостье, оторочки маховъ втораго порядка (бѣловатыя у самца) и не рѣзкiя, также рыжеватыя, каймы на концахъ рулей. Кромѣ того у самца клювъ черный, а у самки и молодыхъ птицъ нижняя челюсть буроватая. Молодыя птицы поперечно полосатыя. Полосатость начинаетъ исчезать къ осени, но замѣтна еще и на второй годъ. Одна изъ нашихъ самокъ, добытая въ iюлѣ и въ сильно поношенномъ оперенiи, имѣетъ еще на нѣкоторыхъ перьяхъ груди слабыя черноватыя оторочки.

C. tephronotus единственный сорокопутъ, который найденъ гнѣздящимся въ лѣсистыхъ горахъ с.-з. Гань-су; онъ не особенно многочисленъ, но и не рѣдокъ. Встрѣчается въ среднемъ поясѣ горъ, по лѣснымъ перелѣскамъ, вблизи луговъ. Выводокъ, встрѣченный въ послѣднихъ числахъ iюля, уже леталъ, но держался вмѣстѣ и старики кормили молодыхъ. Черезъ недѣлю молодежь уже вела самостоятельную жизнь и попадалась только поодиночкѣ.

Phoneus bucephalus (Temm. et Schl.).

[*Lanius bucephalus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 98.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., p. 270.—Богдановъ, Сорокоп. Русс. Фауны, стр. 86.

Размѣры:

♂ Дл. 200. Разм. 270. Кр. 84. Кл. 18. Пл 25. Хв. 94.

Экземпляръ: Дер. Сàтани, 2-го декабря.

Единственный экземпляръ этого вида встрѣченъ и добытъ въ декабрѣ близъ дер. Сàтани Сигуенскаго округа; вѣроятно, это заблудившаяся на пролетѣ птица.

Lanius sphenocercus, Cab.

[*Lanius sphenocercus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 92, pl. 76.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 242.—Богдановъ, Сорокоп. Русс. Фауны, стр. 149.

Размѣры:

♂ Дл. 290. Разм. 400. Кр. 123. Кл. 23. Пл. 31,5. Хв. 126.
♀ » 290—315. » 380—395. » 120—124. » 22—25. » 29—32. » 135—153.

Экземпляры: Р. Уланъ-Муренъ и уроч. Джасиктенъ-чайдамъ (Ордосъ), конецъ августа;—г. Линъ-джоу (с. Гань-су), октябрь;—г. Хой-сянъ, декабрь, февраль.

Этотъ сорокопутъ—довольно обыкновенный въ Ордосѣ, гдѣ иногда встрѣчается въ совершенно безлѣсныхъ мѣстностяхъ, — въ южной Гань-су найденъ только около г. Хой-сяна и рѣдокъ: за все время я встрѣтилъ всего пять штукъ.

PARIDAE.

Parus minor, Temm. et Schl.

[*Parus minor*, David et Oust., Ois. Chine, p 278].

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 15.

Размѣры:

♂ Дл. 145—150. Разм. 220—230. Кр. 67—74. Кл. 10—12. Пл. 16—18. Хв. 61—67.
♀ » 140—150. » 210—220. » 65—72. » 10,5—12. » 16—18. » 59—64.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, ноябрь, декабрь, апрѣль;—дер. Сатани, декабрь, январь;—дер. Лотани, сентябрь, октябрь;—уроч. Сань-чуань (на Желтой рѣкѣ выше г. Лань-джеу), декабрь.

Полы у этого вида различаются такъ-же, какъ у *P. major*: у самцовъ голова и горло блестяще-чернаго цвѣта съ синимъ отливомъ, у самокъ—матово-черные, иногда только съ нѣсколькими отдѣльными блестяще-черными перышками.

Эта синица встрѣчена въ Гань-су повсюду, вездѣ предпочитаетъ предгорья и мѣстности сравнительно открытыя.

Parus monticola, Vigors.

[*Parus monticola*, David et Oust., Ois. Chine, p. 280].

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 20.

Размѣры:

♂ Дл. 130—140. Разм. 215—220. Кр. 68—70. Кл. 11. Пл. 16—17. Хв. 57—58.
? » —— » —— » 65—69. » 10—11. » 16—17. » 57—62.
juv. » —— » —— » 65—66. » 10. » 16. » 51—53.

Экземпляры: Дер. Сатани, декабрь;—дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль;—дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ.

Молодыя птицы, добытыя въ началѣ іюля изъ выводковъ, уже летавшихъ отличаются отъ взрослыхъ слѣдующимъ:

Меньшимъ развитіемъ чернаго цвѣта въ оперенiи. Бѣлый цвѣтъ щекъ и ушныхъ перьевъ не окруженъ со всѣхъ сторонъ чернымъ, а соединяется съ желтымъ цвѣтомъ боковъ груди и тѣла такъ, что черный цвѣтъ верха головы отдѣленъ отъ чернаго цвѣта нижней стороны тѣла непрерывной свѣтлой полосой. Черная серединная полоса на животѣ очень узка.

Одноцвѣтностью спины и надхвостья, которыя оливково-зеленыя — безъ примѣси ярко-желтаго цвѣта — на границѣ съ затылочнымъ пятномъ и спиевато-сѣрыя на надхвостьи.

Меньшей яркостью всѣхъ цвѣтовъ въ оперенiи. Блестяще-черный съ спинимъ отливомъ цвѣтъ взрослыхъ замѣненъ матовымъ буро-чернымъ, бѣлый—желтовато-бѣлымъ, ярко-желтый—грязнымъ свѣтло-желтымъ.

Эта синичка довольно обыкновенна лѣтомъ въ лѣсныхъ ущельяхъ ю.-з. Гань-су на высотѣ 6 — 7000 футъ, зимой же сравнительно рѣдка; за двѣ зимы я наблюдалъ ее около деревни Сáтанп всего раза два или три. Въ Хойсянскомъ округѣ зимой не встрѣчена, но одинъ экземпляръ добытъ въ мартѣ на ю.-в. границѣ Гань-су съ Шенси.

Parus venustulus. Swinh.

[*Parus venustulus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 281.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 23.—Styan, Ibis 1889, p. 444.

Размѣры:

ad.	Дл. 110.	Разм. 200.	Кр. 67.	Кл. 10,3.	Пл. 15.	Хв. 40.	(a)
♂ juv.	» 110.	» 210.	» 67.	» 11.	» 14,7.	» 40.	(b)

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, (a) начало іюня, (b) начало іюля.

Наша взрослая птица (полъ не опредѣленъ) совершенно сходна съ изображенной у Gould'a (B. of As., II, pl. 48), молодой же самецъ похожъ на кратко описанную г. Styan'омъ молодую самку, за исключенiемъ того, что имѣетъ рѣзкiя желтоватыя надбровныя полосы,—о чемъ въ описанiи не упомянается. Присутствiе надбровныхъ полосъ, которыхъ у взрослыхъ птицъ нѣтъ и слѣда, настолько странно, что возбуждаетъ даже сомнѣнiе въ принадлежности нашего экземпляра къ виду *P. venustulus*. Даемъ изображенiе (Табл. II, фиг. 3.) и описанiе этой интересной птички.

Верхъ головы и уздечки сѣровато-оливково-зеленые; *лобъ* слегка свѣтлѣе. *Пространство надъ ухомъ и бока затылка* сѣровато-бурые, послѣднiя становятся къ зашейку черновато-бурыми. *Надъ глазомъ*, начиная съ середины его, рѣзкая свѣтло желтая *полоска*, протягивающаяся назадъ примѣрно на два глазныхъ діаметра. *На затылкѣ* небольшое желтовато-бѣлое *пятно*. *Спина и надхвостье* сѣровато-оливково-зеленыя. *По бокамъ головы* желтовато-бѣлая *полоса*, идущая отъ зѣвковъ по щекамъ, ушнымъ кроющимъ и бокамъ шеи; снизу она ограничена не рѣзкими зеленовато-сѣрыми *усами*. *Вся нижняя сторона*, включая подхвостье, свѣтло-зеленовато-желтая,

одноцвѣтная. *Плечевыя и верхнія малыя кроющія крыла* сѣровато оливково-зеленыя, подобно спинѣ. *Среднія и большія кроющія маховъ* буро-черныя, съ широкими оливково-зелеными оторочками по наружнымъ опахаламъ и большими желтовато-бѣлыми конечными пятнами, которыя на сложенномъ крылѣ образуютъ двѣ поперечныя полосы. *Кроющія главныхъ маховъ и крылышко* (*alula*) черныя, съ узкими оливково-зелеными оторочками по наружнымъ опахаламъ. *Махи перваго порядка* буро-черные, съ яркими оливково-зелеными оторочками по наружнымъ опахаламъ, — оторочки шире и ярче на основной половинѣ маховъ, уже и сѣроваты — на конечной. *Махи втораго порядка* подобны главнымъ махамъ, но имѣютъ на концахъ нерѣзкіе бѣловатые ободки. *Махи третьяго порядка* черные, съ оливково-зеленой оторочкой по наружнымъ опахаламъ и съ крупными зеленовато-желтыми трехугольными пятнами на концахъ. *Уголъ крыла* и *нижнія кроющія крыла* желтовато-бѣлые. *Подбой маховъ* сѣрый, съ бѣловатыми каймами по внутреннимъ опахаламъ. *Верхнія кроющія хвоста* черныя, очень длинны, заходятъ за середину длины хвоста. *Два среднихъ руля* черные, съ бѣловатыми конечными пятнышками и узкой, едва замѣтной, бѣлой оторочкой на конечной части. *Остальные средніе рули* имѣютъ основныя и конечныя части и все внутреннее опахало черныя, среднюю же часть наружнаго опахала—бѣлую; на болѣе внѣшнихъ рулях бѣлый цвѣтъ занимаетъ большее пространство и ближе подходитъ къ основанію рулей, на болѣе внутреннихъ — меньше и отъ основанія дальше. Кончики всѣхъ рулей бѣлые, а черная конечная часть наружнаго опахала съ узкой бѣлой оторочкой. *Два самыхъ внѣшнихъ руля* подобны сосѣднимъ, только черный цвѣтъ замѣненъ сѣровато-бурымъ.

Махи: 1-й немного длиннѣе половины сложеннаго крыла; 2-й равенъ 6-му; 3-й, 4-й и 5-й почти равны между собой и образуютъ вершину крыла. *Рули* почти одинаковой длины, средніе немного короче.

Эта синичка встрѣчена только въ ущельи рѣчки Іо-дзамъ-пу, старая птица—въ началѣ іюня, молодая—въ началѣ іюля, послѣдняя въ обществѣ пѣночекъ, на которыхъ она и похожа.

Periparus aemodius (Hodgs.).

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 41.

Размѣры:

♂ Дл. 100—110. Разм. 165—180. Кр. 57. Кл. 10. Пл. 14. Хв. 43.
♀ » 105. » 170. » 55. » 9. » 13,2. » 40.

Экземпляры: Дер. Сатани, декабрь;—дер. Лотани, сентябрь;—дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), мартъ.

Мы приняли было сначала южно-ганьсуйскихъ синицъ типа *P. ater* за *P. pekinensis*, но получивъ возможность, благодаря любезности г. Oustalet, сравнить наши экземпляры съ типами послѣдняго вида, хранящимися въ Музеѣ Jardin des plantes въ Парижѣ, мы убѣдились въ ихъ различіи. Наши экземпляры отличаются отъ типовъ *P. pekinensis* изъ сѣвернаго Китая меньшимъ ростомъ, болѣе длиннымъ хохолкомъ и

оливково-рыжимъ оттѣнкомъ оперенія, который особенно рѣзокъ на надхвостьи и замѣтенъ даже на бѣлыхъ пятнахъ боковъ головы. Эти особенности заставляютъ насъ отнести южно-ганьсуйскихъ синичекъ къ невиденной нами *P. aemodius*.

Эта синичка встрѣчена въ юго-западной Ганьсу всего раза два или три, небольшими табунками въ еловыхъ лѣсахъ. Въ Хой-сянскомъ округѣ не найдена, но одинъ экземпляръ добытъ въ Шенси, на границѣ этой провинціи съ Ганьсу и Сычуанью.

Periparus Beavani (Blyth.).

[*Lophophanes Beavani*, David et Oust., Ois. Chine, p. 285.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 29.

Размѣры:

♂ Дл. 120. Разм. 205. Кр. 69. Кл. 10—11. Пл. 16—16,5. Хв. 51—52.
♀ » 105. » 185. » 62—64. » 10. » 16—16,5. » 44—49.

Экземпляры: Дер. Сатани, декабрь, январь;—дер. Іо-дзамъ-пу, августъ;—дер. Джоза-паза, сентябрь;—дер. Чаго, декабрь, январь.

Два изъ нашихъ экземпляровъ представляютъ ту особенность, что имѣютъ на большихъ кроющихъ маховъ маленькія рыжевато-бѣлыя конечныя пятнышки. Эта особенность указываетъ на близость *P. Beavani* къ *P. melanolophus*, тѣмъ болѣе, что оба вида сходны также по формѣ и величинѣ клюва, на что обратили вниманіе гг. David и Oustalet и г. Biddulph [1]).

Эта синичка встрѣчена только въ ю.-з. Ганьсу и въ небольшомъ количествѣ: осенью, табунками въ 5—6 штукъ, въ лѣсахъ древовиднаго можжевельника, вблизи альпійскихъ луговъ; зимой — поодиночкѣ, въ лѣсныхъ перелѣскахъ на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ.

Lophophanes dichroides, Przew.

[*Lophophanes dichroides*, David et Oust., Ois. Chine, p. 284.]

Пржевальскій, Монг. и Стр. Танг., т. II, Птицы, стр. 54.

Размѣры:

♂ Дл. 120—130. Разм. 210—215. Кр. 69—73. Кл. 10—11. Пл. 17—18. Хв. 50—54.
♀ » —— » —— » 68. » 11. » 18,5. » 49.

Радужина оранжево-красная.

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, іюль;—дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Сатани, декабрь, январь;—дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь;—дер. Лотани, октябрь.

Пржевальскій отличилъ этотъ видъ отъ *L. dichrous* слѣдующими признаками:

Присутствіемъ на бокахъ шеи бѣлыхъ пятенъ, расположенныхъ въ видѣ полуошейника.

---

[1]) Str. Feath., IX, p. 337.

Пепельно-сѣрымъ цвѣтомъ верха головы, тогда какъ у *L. dichrous* вся верхняя сторона буро-оливковая, одноцвѣтная.

Коричнево-красными глазами.

Г. Gadow [1]), обративъ вниманіе на ошибочность перваго признака, ничего не говоритъ объ остальныхъ и соединяетъ *L. dichroides* съ *L. dichrous*. Мы не имѣли въ рукахъ послѣдняго вида и не можемъ судить насколько это отождествленіе правильно. Во всякомъ случаѣ считаемъ вопросъ еще не разъясненнымъ, тѣмъ болѣе, что просмотренныя нами описанія *L. dichrous* и сравненіе ихъ съ нашими экземплярами *L. dichroides* скорѣе говорятъ въ пользу различія, чѣмъ тождества этихъ двухъ видовъ.

Въ ю.-з. Гань-су этотъ видъ найденъ повсюду, но вездѣ сравнительно рѣдокъ. Встрѣчается какъ въ лиственныхъ, такъ и въ хвойныхъ лѣсахъ на высотѣ 7—9000 футъ, большею частью поодиночкѣ или небольшими обществами въ три или четыре штуки и очень рѣдко вмѣстѣ съ другими видами синицъ.

Poecile borealis baicalensis, Swinh.

Swinhoe, Ann. and Magaz. Nat. Hist. (4) VII, p. 257 (1871).—Seebohm, Hist. Brit. B., I, p. 477.
Poecile borealis et *Poecile macrura*, Taczanowski, Bull. Soc. Zool. Fr., 1882, p. 390 et 1883, p. 346.

Размѣры:
Кр. 68. Кл. 10,7. Пл. 15. Хв. 66.

Экземпляръ: Монголія.

Нашъ единственный экземпляръ этого вида, добытый экспедиціей Г. Н. Потанина на обратномъ пути въ Россію, происходитъ вѣроятно изъ Хангая. Эта восточная форма *P. borealis*, отличающаяся блѣдной окраской и болѣе длиннымъ (сравнительно съ крыломъ) хвостомъ, встрѣчена мною въ 1876—77 годахъ въ большомъ количествѣ въ лиственичныхъ лѣсахъ южнаго Алтая и въ Хангаѣ.

Poecile affinis, Przew.

[*Poecile affinis et Poecile cincta*, David et Oust., Ois. Chine, p. 288 et 289.]

Пржевальскій, Монг. и Стр. Танг., т. II, Птицы, стр. 52.

Размѣры:
♂ Дл. 130. Разм. 200. Кр. 66. Кл. 10,5—11. Пл. 15—16. Хв. 61—63.
♀ » — » 190. » 61. » —— » 15. » 56.

Экземпляры: Дер. Сатани, ноябрь, декабрь, январь;—дер. Лотани, сентябрь.

Г. Gadow приводитъ *P. affinis* въ синонимію и *P. cincta*, и *P. songara* [2]), но оба эти отождествленія ошибочны. По общей окраскѣ и цвѣторасположенію *P. affinis* очень похожа на *P. songara*, но отличается болѣе свѣтлымъ бурымъ цвѣтомъ верха головы и значительно болѣе короткимъ и тонкимъ клювомъ. Какъ у экземпля-

[1]) Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 33.
[2]) Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, pp. 35 et 48.

ровъ Пржевальскаго (изъ с. Гань-су), такъ и у нашихъ (всего 13 штукъ), длина клюва ото лба равна 10—11 мм., тогда какъ у бывшаго у насъ въ рукахъ экземпляра *P. songara*[1]) она равна 12,5 мм., при соотвѣтствующей толщинѣ. О крупномъ клювѣ послѣдняго вида, приближающемъ его къ *P. lugubris*, упоминаетъ и Сѣверцовъ въ своемъ описаніи[2]). Отличіе *P. affinis* отъ *P. cincta* еще рѣзче. У обѣихъ формъ послѣдняго вида — *P. obtecta* и *P. sibirica* — цвѣтъ верха головы сѣроватый, мало отличающійся отъ цвѣта спины, тогда какъ у *P. affinis* голова буро-черная, въ рѣзкомъ контрастѣ со спиной; кромѣ того есть и другія отличія — въ деталяхъ цвѣторасположенія и окраски.

Poecile cincta въ «Oiseaux de la Chine» есть вѣроятно *P. affinis*. Въ названномъ сочиненіи сказано, что *P. cincta* встрѣчена въ Китаѣ только въ горахъ Урато, которыя есть тоже самое, что земля Уратовъ и Муни-ола у Пржевальскаго; послѣдній же говоритъ: «этотъ же кажется видъ (*P. affinis*) встрѣченъ на Муни-ола и въ долинѣ Желтой рѣки, но экземпляровъ не добыто» (l. c.).

Эта синичка встрѣчена только въ ю.-з. Гань-су и въ небольшомъ количествѣ. Держится на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ, по опушкамъ лиственныхъ лѣсовъ, въ особенности березовыхъ, небольшими табунками въ 10—15 штукъ.

Poecile hypermelaena, sp. nov.

Табл. II, фиг. 2.

Размѣры:

♂ Дл. 107. Разм. 197. Кр. 61. Кл. 9,2. Пл. 14. Хв. 47.
♀ » 110. » 195. » 61. » 9. » 14. » 49.

Экземпляры: Дер. Лань-дзя-коу (въ Шенси), мартъ.

Описаніе:

Голова блестяще-черная, черный цвѣтъ протягивается клиномъ на спину. *Спина* и *надхвостье* оливково-бурыя, послѣднее съ песочнымъ оттѣнкомъ. По бокамъ головы *бѣлыя полосы*, идущія отъ зѣвковъ по щекамъ и ушнымъ перьямъ, и сливающіяся, постепенно бурѣя, со спиной. *Подбородокъ*, *горло* и *зобъ* матово-черные. *Середина груди*, *животъ* и *подхвостье* грязно-бѣлые. *Бока груди* темно оливково-бурые. *Бока тѣла* буро-песочные. *Плечевыя и всѣ верхнія кроющія крыла* оливково-бурыя—какъ спина. *Махи* черно-сѣрые; самые задніе махи третьяго порядка и оторочки остальныхъ маховъ—оливково-сѣрые. *Подбой маховъ* сѣрый съ бѣловатыми каймами по внутреннимъ опахаламъ. *Всѣ нижнія кроющія крыла и подмышечныя* свѣтло-буланыя. *Рули* темно-сѣрые; наружныя опахала съ оливковой оторочкой, которая къ концамъ рулей становится сѣрою. *Радужина* темная. *Клювъ* черный съ болѣе свѣтлыми краями. *Плюсны* свинцово-сѣрыя.

---

[1]) Этотъ экземпляръ происходитъ изъ коллекціи Сѣверцова и былъ обязательно присланъ намъ профессоромъ М. А. Мензбиромъ.

[2]) Верт. и Горизонт. Распред. Туркест. Животн., стр. 134.

4-й, 5-й и 6-й махи почти равны и образуютъ вершину крыла; 3-й равенъ 7-му или едва длиннѣе, на 2 мм. не достигаетъ до вершины крыла; 2-й равенъ 9-му на 8 мм. длиннѣе 3-го, не достигаетъ до вершины крыла на 10 мм.; 1-й махъ слегка заходитъ за середину сложеннаго крыла, на 20 мм. короче 2-го. Хвостъ короткій, много короче крыла, почти тупой: средніе рули едва длиннѣе самыхъ внутреннихъ и не болѣе 1,5 мм. длиннѣе внѣшнихъ.

Этотъ видъ наиболѣе близокъ къ *P. affinis* и *P. palustris*, отъ которыхъ отличается слѣдующими признаками.

Отъ *P. affinis*, на которую похожъ общей окраской: 1) — блестяще-чернымъ цвѣтомъ головы, вмѣсто черно-бураго; 2) — тупымъ хвостомъ, вмѣсто закругленнаго и 3) — меньшимъ ростомъ.

Отъ *P. palustris*, на которую похожъ цвѣтомъ головы и тупымъ хвостомъ: 1) — большей величиной чернаго пятна на горлѣ и зобу, которое формой и величиной сходно съ таковымъ у *P. ater*; 2) — менѣе однообразной окраской нижней стороны тѣла, представляющей рѣзкій контрастъ между почти бѣлой серединой и песочно-бурыми боками; и 3) — большимъ распространеніемъ чернаго цвѣта головы на спину.

Два экземпляра этой синички добыты въ Шенси, близъ границы ея съ Гань-су и Сычуанью; больше этотъ видъ нигдѣ не встрѣченъ.

Poecile Davidi, sp. nov.

Табл. II, фиг. 4.

Размѣры:

♂ Дл. 120—130. Разм. 200. Кр. 66—67. Кл. 9,5—11. Пл. 15. Хв. 50—54.
♀ » 115—125. » 197—202. » 64—67. » 9,5—11. » 14—15,5. » 50—51.

Экземпляры: Дер. Сатани, ноябрь; — дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль, августъ; — дер. Лотани, сентябрь, октябрь; — дер. Чаго, декабрь.

Описаніе:

Самецъ и самка цвѣтомъ оперенія не различаются.

Голова блестяще-черная, черный цвѣтъ доходитъ тупымъ клиномъ до спины. *Спина* оливково бурая, съ примѣсью рыжаго цвѣта по границѣ съ чернымъ цвѣтомъ головы. *Надхвостье и верхнія кроющія хвоста* оливково-бурыя, почти какъ спина, но со слабымъ рыжеватымъ оттѣнкомъ. *По бокамъ головы* бѣлыя *полосы*, идущія отъ зѣвковъ по щекамъ и ушнымъ перьямъ и постепенно переходящія въ рыжій цвѣтъ боковъ шеи. *Подбородокъ, горло и зобъ* матово-черные. *Грудь, бока шеи, бока туловища, животъ и подхвостье* рыжіе, почти одноцвѣтные — грудь слегка ярче, животъ свѣтлѣе. *Плечевыя, малыя верхнія кроющія крыла и кроющія маховъ втораго порядка* —

оливково-бурые, какъ спина, внутреннія опахала большихъ кроющихъ маховъ втораго порядка черноваты. *Кроющія главныхъ маховъ и крылышко* (*alula*) черныя, съ оливковыми оторочками по наружнымъ опахаламъ. *Махи перваго и втораго порядковъ* сѣрые, съ оливково-рыжей оторочкой по наружнымъ опахаламъ, которая ярче у основанія маховъ втораго порядка и сѣровата къ концамъ главныхъ маховъ. *Самые внутренніе махи третьяго порядка* оливково-бурые, съ яркой оливково-рыжей оторочкой по наружнымъ опахаламъ. *Нижняя сторона всѣхъ маховъ* съ бѣловатыми каймами по внутреннимъ опахаламъ. *Спибъ крыла* рыжевато-бѣлый. *Всѣ нижнія кроющія крыла и подмышечныя* свѣтло-рыжія. *Рули* черно-сѣрые, черньѣе въ серединѣ, сѣрѣе къ краямъ, съ оливково-рыжими оторочками по наружнымъ опахаламъ; оторочки ярче у основанія рулей и сѣроваты къ концамъ.

Радужина темно-бурая. *Клювъ* черный. *Ноги* свинцово-сѣрыя; пальцы темнѣе.

4-й, 5-й и 6-й махи образуютъ вершину крыла; обыкновенно 4-й и 5-й слегка длиннѣе 6-го, рѣже 5-й и 6-й слегка длиннѣе 4-го, иногда всѣ три маха равны; 3-й махъ примѣрно равенъ 7-му, даже доходитъ до вершины крыла на 2—4 мм.; 2-й махъ равенъ 9-му или 10-му, меньше 3-го на 8—9 мм., не доходитъ до вершины крыла на 10—13 мм.; 1-й махъ немного заходитъ за середину сложеннаго крыла, меньше 2-го на 20—21 мм., не доходитъ до вершины крыла на 30—33 мм. Хвостъ короткій, много меньше крыла, слегка выемчатый: внѣшніе рули короче внутреннихъ на 1—1,5 мм., а средніе короче внутреннихъ — на 2 мм.

Молодыя птицы, битыя осенью, отличаются отъ старыхъ только тѣмъ, что имѣютъ щеки и ушныя перья желтоватыя, а клювъ черный съ болѣе свѣтлыми краями челюстей.

Посвящаемъ этотъ видъ г. Аббату Арману Давиду, какъ дань его научнымъ заслугамъ и какъ знакъ нашего глубочайшаго уваженія къ той безкорыстной любви къ наукѣ и къ тому возвышенному взгляду на значеніе послѣдней, которые одни только давали силы этому знаменитому изслѣдователю переносить, въ продолженіи его многолѣтнихъ странствованій по Китаю, не только матеріальныя лишенія, но и глухое неодобреніе среды, къ которой онъ принадлежалъ.

Первыя свѣденія объ этомъ видѣ сообщены г. David'омъ. Въ августѣ 1869 года, переѣзжая горы, отдѣляющія Мупинъ отъ Сы-чуани, онъ встрѣтилъ табунокъ синичекъ похожихъ на *S. castaneiventris*, добыть которыхъ ему однако не удалось. Безъ сомнѣнія, это были *P. Davidi*. Этотъ видъ по окраскѣ и цвѣторасположенію дѣйствительно очень похожъ на *Sittiparus castaneiventris*, но по отсутствію бѣлой лобной полосы и затылочнаго пятна принадлежитъ къ *Poecile*.

P. Davidi найдена мною только въ горахъ юго-западной Гань-су. Въ общемъ довольно рѣдка. Встрѣчается, небольшими табунками въ 5—10 штукъ, по опушкамъ лѣсовъ горныхъ долинъ на высотѣ 7—9000 футъ. По характеру — это типичная *Poecile*: очень подвижная, любопытная и крайне довѣрчивая. Голосъ ея похожъ на голосъ *P. affinis*, но грубѣе и хриплѣе.

Poecile superciliosa Przew.

[*Poecile superciliosa*, David et Oust., Ois. Chine, p. 290.]

Пржевальскій, Монг. и Стр. Танг., т. II, Птицы, стр. 53.

Размѣры:

♂ Дл. 145. Разм. 200. Кр. 64 Кл. — Пл. 16. Хв. 68.

Внѣшніе рули короче внутреннихъ на 8 мм.

Экземпляры: Дер. Чунъ-дзя (на Желтой рѣкѣ къ югу отъ г. Синина), апрѣль.

Этотъ интересный видъ, открытый Пржевальскимъ въ горахъ с.-з. Гань-су, хотя и принадлежитъ къ роду *Poecile*, но рѣзко выдѣляется изъ всѣхъ азіатскихъ видовъ этого рода. По присутствію бѣлой надбровной полосы онъ сходенъ только съ американской *P. montana*, а сильно ступенчатымъ хвостомъ приближается къ видамъ родовъ *Acredula* и *Aegithaliscus*.

Нашъ единственный экземпляръ добытъ въ горахъ лѣваго берега Желтой рѣки, къ югу отъ г. Синина. Въ южной Гань-су этотъ видъ не наблюдался.

Acredula glaucogularis (Gould.).

[*Acredula glaucogularis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 291.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 65.

Размѣры:

♂ Дл. 135.	Разм.	—	Кр. 60.	Кл.	8.	Пл.	15.	Хв. 78.	}	(a)
♀ » 135.	»	170.	» 58.	»	7,5.	»	14,5.	» 77.	}	
? » 152.	»	—	» 61.	»	—	»	16.	» 86.		(b)
? » 152.	»	—	» 62.	»	8.	»	17.	» 86.		(c)

Радужина у экз. (a) красно-коричневая, у экз. (c) — очень темная. Верхнее вѣко свѣтло-желтое. Клювъ черный. Плюсны черно-бурыя.

Экземпляры: (b) Р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), конецъ августа;—(a) г. Хой-сянъ, февраль, мартъ;—(c) дер. Лотани, начало октября.

Въ южной Гань-су этотъ видъ встрѣченъ какъ въ восточной, такъ и въ западной ея части, но повсюду рѣдокъ. Держится въ кустарныхъ зарослях и перелѣскахъ предгорій.

Acredula vinacea (J. Verr.).

[*Acredula vinacea*, David et Oust., Ois. Chine, p. 292.]

Mecistura vinacea: J. Verr. Nouv. Arch. Mus., Bull. VI, p. 39 (1870); VII, p. 57 (1871); VIII, pl. 2, fig. 3 (1872).

Orites ouratensis: A. David, MS. — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. 1870, p. 436; 1871, p. 362.

Acredula glaucogularis: Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 65. (1883, in synon.).

Размѣры:

Дл. 140. Разм. 165. Кр. 55. Кл. — Пл. 15. Хв. 74.

Верхнее вѣко оранжево-красное.

Экземпляръ: Р. Тао-хэ вверхъ отъ города Минъ-джеу, 12 іюня.

Нашъ экземпляръ совершенно схожъ съ рисункомъ въ «Nouv. Arch. du Mus.»

и по рыхлости оперенія несомнѣнно молодая птичка, какъ и типичные экземпляры David'a. Въ общемъ птичка похожа на молодую *A. caudata*, но отличается винным цвѣтомъ груди. Весьма вѣроятно, что *A. vinacea* есть гнѣздовой нарядъ *A. glaucogularis*, но никакихъ наблюденій въ пользу этаго взгляда мы не имѣемъ.

Нашъ экземпляръ добытъ изъ небольшой стайки (выводка) въ прибрежномъ лѣсу около р. Тао-хэ, немного выше города Миндже.

Aegithaliscus fuliginosus (J. Verr.).

[*Acredula fuliginosa*, David et Oust., Ois. Chine, p. 292.]

Mecistura fuliginosa, J. Verr. Nouv. Arch. Mus., Bull. V p. 36. (1869); VI, p. 39 (1870); VII, p. 57 (1871); VIII, pl. 5, fig. 4 (1872).

Aegithaliscus fuliginosus, Swinhoe, Proc. Zool. Soc. 1871, p. 362.

Acredula glaucogularis, Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 65. (1883, in synon.).

Размѣры.

Дл. 110—122. Разм. 165—170. Кр. 54—58. Кл. 7—8,5. Пл. 15—16,5. Хв. 58—62.

Радужина желтая; клювъ черный; плюсны черно-бурыя.

Экземпляры: Г. Хой-синъ, январь;—Дер. Сатани, ноябрь, декабрь, январь;—дер. Лотани сентябрь, октябрь;—дер. Лань-дзи-коу (въ Шенси), мартъ.

Изъ всѣхъ видовъ родъ *Aegithaliscus* этотъ видъ, по скромности и сравнительной одноцвѣтности оперенія, больше всего сходенъ съ американскимъ *Psaltriparus minimus*, но по хвосту съ бѣлыми ободками рулей принадлежитъ все таки къ группѣ азіатскихъ видовъ; у американскихъ хвостъ одноцвѣтный.

A. fuliginosus встрѣченъ и въ ю.-в. и въ ю.-з. Гань-су, но въ послѣдней болѣе обыкновенекъ. Держится по опушкамъ горныхъ лѣсовъ, съ высоты примѣрно 7000 футъ, небольшими табунками въ 5—10 штукъ.

Aegithaliscus concinnus (Gould.).

[*Acredula concinna*, David et Oust., Ois. Chine, p. 293.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 57.

Размѣры:

Дл. 105—110. Разм. 140—155. Кр. 47—52. Кл. 6,8—8. Пл. 14—15,5. Хв. 46—55.

Экземпляры: Г. Хой-синъ, декабрь, январь, мартъ.

Этотъ видъ довольно обыкновенекъ въ Хой-синскомъ округѣ, встрѣченъ по кустарнымъ зарослямъ и перелѣскамъ предгорій, въ ю.-з. Гань-су не наблюдался.

Leptopoecile Sophiae. Sewertz.

[*Leptopoecile Sophiae*, David et Oust., Ois. Chine, p. 290.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 81.

Размѣры:

♂ Дл. 105. Разм 150. Кр. 50—51. Кл. 10,2—10,5. Пл. 17—18,5. Хв. 51—55.
♀ » 110—112. » 145—160. » 49—51. » 10—11. » 17—18. » 50—52.

Радужина красная; клювъ черный; плюсны черно-бурыя.

Экземпляры: Дер. Та-хей-гоу (Сигученскаго округа), начало декабря.

Существуетъ, по видимому, три довольно рѣзкія формы этого вида: типичная; болѣе блѣдно окрашенная и съ большимъ пространствомъ свѣтлаго цвѣта на животѣ, названная г. Мензбиромъ *L. Sophiae, var. major*[1]); и очень темно-окрашенная, почти безъ свѣтлаго цвѣта на животѣ, описанная Пржевальскимъ подъ именемъ *L. obscura*[2]):

Наши экземпляры принадлежатъ къ числу очень темно окрашенныхъ, но мы не называемъ ихъ *L. obscura*, такъ какъ они не удовлетворяютъ ни одному изъ діагностическихъ признаковъ данныхъ Пржевальскимъ. Послѣдній отличилъ *L. obscura* отъ *L. Sophiae* меньшимъ ростомъ и совершенно одноцвѣтнымъ брюхомъ,—наши же экземпляры ничуть не меньше типичной *L. Sophiae* и имѣютъ на животѣ, хотя не значительное, свѣтлое, грязно-желтовато-бѣлое пятно. На основаніи переходнаго характера окраски нашихъ экземпляровъ, мы склонны считать *L. obscura* не за обособленный видъ, а, какъ мы уже сказали, лишь за форму *L. Sophiae*.

Этотъ видъ встрѣченъ мною лишь однажды—въ декабрѣ мѣсяцѣ на высокомъ (не менѣе 12000 ф.) перевалѣ черезъ хребетъ, отдѣляющій Сигученскій округъ отъ Сы-чуани. Птички держались, небольшими стайками въ 3—5 штукъ, въ зарослях мелкихъ альпійскихъ кустарниковъ, въ особенности одного вида стелющагося можжевельника, называемаго Китайцами «Дзы-сянъ». Они были чрезвычайно осторожны: на верхнихъ вѣтвяхъ показывались лишь на моментъ, чтобы осмотрѣться, и тотчасъ же либо скрывались въ чащѣ, либо перелетали; въ послѣднемъ случаѣ летали низко, чуть не касаясь вѣтвей.

Lophobasileus elegans (Przew.).

Пржевальскій, Запис. Имп. Ак. Н., т. LV, стр. 77.

Размѣры:

♂ Дл. 102—111. Разм. 162—165. Кр. 55—57. Кл. 10,6—10,8. Пл. 17,5—18,3. Хв. 45—49.

Радужина ярко карминно-красная; клювъ черный; плюсны розовато-сѣрыя, пальцы темнѣе.

Экземпляры: Дер. Чунъ-дзи (близъ Желтой рѣки, къ югу отъ г. Синина), апрѣль;—дер. Джоза-наза, сентябрь.

Этотъ видъ, открытый Пржевальскимъ въ верховьяхъ Хуанъ-хэ, къ югу отъ

[1]) Menzbier, Ibis 1885, p. 353.
[2]) Зап. Имп. Ак. Н., т. LV, стр. 80.

Куку-нора, и найденный потомъ къ с.-в. отъ г. Синина, встрѣченъ мною только два раза:—къ югу отъ г. Синина, въ долинѣ рѣчки, впадающей въ Хуанъ-хэ, и въ высокихъ горахъ лѣваго берега Сигученской рѣки. Въ обоихъ случаяхъ въ еловыхъ лѣсахъ.

Regulus cristatus japonicus, Bp.

[*Regulus japonicus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 276.]

Swinhoe, Proc. Zool. Soc., 1870, p. 451.—Seebohm, Hist. Brit. B., I, p. 454.

Размѣры:

♂ Дл. 90—105. Разм. 155—160. Кр. 54—56. Кл. 10,5—11. Пл. 16,7—18. Хв. 39—41.
♀ » 85—95. » 150—160. » 52—53. » 10. » 16,7—17. » 39—41.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, февраль, мартъ;—дер. Сатани, декабрь, январь.

Всѣ наши королькн, какъ изъ восточной, такъ и изъ западной части южной Гань-су, оказались, по сравненію съ экземплярами Музея Императорской Академіи Наукъ, тождественными съ японской, а не съ гималайской расой.

Этотъ видъ въ ю. Гань-су довольно рѣдокъ.

Sitta caesia sinensis, J. Verr.

[*Sitta sinensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 90.].

Seebohm, Hist. Brit. B., I, p. 525.

Размѣры:

♂ Дл. — Разм. —— Кр. 81. Кл. 16,7. Пл. 18. Хв. 46.
♀ » 135. » 235—240. » 74—78. » 16—17. » 16,5—17. » 42—44.

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, ноябрь; — дер. Сатани, декабрь; — дер. Іо-дзамъ-пу, май, іюнь; — дер. Лотани, сентябрь; — дер. Чаго, декабрь.

Этотъ поползень весьма обыкновенъ въ лѣсныхъ долинахъ ю.-з. Гань-су, примѣрно съ 7000 Ф. высоты, но ни разу не былъ встрѣченъ мною въ Хойсянскомъ округѣ.

Sitta villosa, J. Verr.

[*Sitta villosa*, David et Oust., Ois. Chine, p. 91, pl. 13.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 355. [1])

Размѣры:

♂ Дл. 112—120. Разм. 210. Кр. 70—71. Кл. 17. Пл. 15. Хв. 41—45.
♀ » 107—115. » 197—205. » 66—68. » 16—17. » 14—15. » 37—41.

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, августъ;—дер. Лотани, октябрь.

Этотъ поползень встрѣченъ только въ ю-з. Гань-су и въ самомъ незначительномъ количествѣ. Птички держатся всегда на самыхъ верхушкахъ деревьевъ, преимущественно елей, издавая постоянно монотонный, но очень громкій крикъ.

---

[1]) Въ Key of Species (p. 342) подъ рубрикой *c.* сказано что у *S. villosa* «crown of head and nape deep black». Это совершенно вѣрно для самца, но у самки черенъ только лобъ; даже на темени черный цвѣтъ въ видѣ пятенъ, на загривкѣ же его вовсѣ нѣтъ.

Sitta Przewalskii, sp. nov.

Размѣры:

♂ Дл. 125. Разм. 225. Кр. 73. Кл. 17. Ил. 18. Хв. 43.

Экземпляръ: Дер. Іо-дзамъ-пу, іюль.

Описаніе:

Самецъ. *Лобъ, темя, затылокъ и загривокъ* блестяще-черные съ синимъ оттѣнкомъ. *Уздечки, пространство вокругъ глаза, ушныя перья* и вообще весь бокъ головы и прилежащіе бока шеи грязно-бѣлые съ рыжеватымъ оттѣнкомъ. Спина и плечевыя аспидно-синія [1]). *Надхвостье и верхнія кроющія хвоста* пепельно-сѣрыя съ синеватымъ оттѣнкомъ [2]). *Подбородокъ* грязно-бѣлый съ рыжеватымъ оттѣнкомъ. *Грудь и середина живота* свѣтло ржаво-рыжія. *Бока груди, туловища и подхвостье* ярко каштаново-рыжіе [3]). Рыжіе цвѣта нижней стороны тѣла переходятъ одинъ въ другой постепенно, безъ рѣзкихъ границъ. *Малыя кроющія крыла и верхнія кроющія маховъ 2-го порядка* буро-черныя, съ индигово-синимъ оттѣнкомъ по наружнымъ опахаламъ. *Верхнія кроющія главныхъ маховъ* и *махи* буро-черные; махи 3-го порядка съ индигово-синимъ оттѣнкомъ. *Нижнія кроющія крыла и маховъ 2-го порядка* грязно бѣлыя съ свѣтло-рыжимъ оттѣнкомъ на концахъ. *Нижнія кроющія главныхъ маховъ* свѣтло буро-черныя. *Нижняя сторона маховъ* черно-сѣрая, свѣтлѣе къ основанію и по внутреннему опахалу. *Рули:* средняя пара аспидно-синяя, какъ спина; 2-я и 3-я пары черныя, съ узкой аспидно-сѣрой конечной каймой, которая шире на наружномъ опахалѣ; 4-я пара подобна предъидущей парѣ, но сѣрая кайма шире, а на концѣ внутренняго опахала маленькое бѣлое пятнышко; 5-я пара черная въ основной части, съ сѣрымъ концомъ и широкой предконечной бѣлой полосой на внутреннемъ опахалѣ; 6-я, самая внѣшняя, пара подобна предъидущей, но сѣрый цвѣтъ занимаетъ на концѣ больше мѣста и широкая бѣлая предконечная полоса проходитъ черезъ все перо.

Клювъ: верхняя челюсть черная, нижняя синеватая съ темнымъ концомъ. *Радужина* очень темная. *Плюсны* темно-бурыя.

3-й и 4-й махи почти равны, образуютъ вершину крыла, 5-й слегка короче; 2-й $>$ 6 $<$ 5-го, не достигаетъ до вершины крыла на 3 мм.; 1-й махъ короче $^1/_2$ сложеннаго крыла, не достигаетъ до вершины крыла на 39 мм. Хвостъ тупой, слегка выемчатый: средніе рули короче внутреннихъ на 1—2 мм.

Посвящаемъ этотъ видъ памяти Н. М. Пржевальскаго.

Sitta Przewalskii близокъ къ *S. leucopsis*, отъ котораго отличается, повидимому (экз. послѣдняго вида мы не имѣли) меньшей величиной и рѣзкой рыжей окраской почти всей нижней стороны тѣла.

Единственный экземпляръ этого вида встрѣченъ и добытъ въ ущельи рѣки Іо-дзамъ-пу, Минджеускаго округа. Птичка встрѣчена на вершинѣ междолиннаго хребта,

---

[1]) Ridgway, Nomencl. of Colors, pl. II, n° 2,—slate black, но еще съ индигово-синимъ оттѣнкомъ.

[2]) Ibid., pl. VI, n° 16,—cinereous.

[3]) Ibid., pl. IV, n° 13,—orange-rufous.

на опушкѣ лѣса. Она держалась на выдавшейся вѣтви сухаго дерева, откуда бросалась въ воздухъ, ловя насѣкомыхъ на подобіе мухоловки.

ORIOLIDAE.

Oriolus diffusus. Sharpe.

[*Oriolus diffusus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 132 cf. p. 559.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 197.

Размѣры:

♂ Дл. 260. Разм. 460. Кр. 146. Кл. 32. Пл. 25. Хв. 94. (a)
♀ » 270—275. » 450—460. » 150—153 » 29,5—31. » 26. » 98—99. (b)

Экземпляры: (a) Городъ Бао-динъ-фу (Пекинская равнина), май; — дер. Лото-пинъ и дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль.

Въ ю.-з. Гань-су иволга весьма обыкновенна въ главныхъ долинахъ, преимущественно въ садахъ; въ горахъ встрѣчается только въ самомъ нижнемъ культурномъ поясѣ.

CORVIDAE.

Corvus torquatus, Less.

[*Corvus torquatus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 368.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 21.

Размѣры:

♂ Дл. 515. Разм. 985. Кр. 322. Кл. 54. Пл. 63. Хв. 196.

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, 5 мая.

Эта ворона, весьма обыкновенная на Пекинской равнинѣ, встрѣчена мною въ южной Гань-су только однажны и одиночная птица.

Corvus macrorhynchus japonensis, Temm. et Schl.

[*Corvus sinensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 367.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 41.—Stejneger, Proc. U. St. Nat. Mus. X, pp. 320, 412 (1888).

Размѣры:

♂ Дл. 510. Разм. 960. Кр. 317. Кл. 53. Пл. 52,5. Хв. 211.

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, мартъ.

Черная ворона встрѣчена въ Гань-су повсемѣстно, но въ лѣсистой ю.-з. части провинціи сравнительно рѣдка. При полномъ почти отсутствіи въ послѣдней мѣстности хищныхъ птицъ, она пользуется здѣсь репутаціею самаго злаго врага домашнихъ цыплятъ, которыхъ дѣйствительно истребляетъ.

Coleus dauricus (Pall.).

[*Lycos dauricus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 370.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 28.

Размѣры:

Дл. 330. Разм. 670. Кр. 219—232. Кл. 32—34. Пл. 43—45. Хв. 131—135.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, февраль;—Амдо.

Coleus neglectus (Schl.).

[*Lycos neglectus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 370.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 28.

Размѣры:

♂ Дл. 355. Разм. 695. Кр. 224. Кл. 32,5. Пл. 46. Хв. 133.

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, февраль.

Nucifraga hemispila, Vig.

[*Nucifraga hemispila*, David et Oust., Ois. Chine, p. 372.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 54.

Размѣры:

♂ Дл. 345—380. Разм. 610—650. Кр. 199—214. Кл. 41—45,5. Пл. 39,5—43. Хв. 131—154.
♀ » 340—370. » 600—620. » 195—203. » 41—44. » 40,5—41. » 139—141.

Экземпляры: Ур. Кванъ-дзя-коу (на границѣ Шенси), январь;—дер. Дзю-юань, іюль;—дер. Сàтани, январь, февраль; — дер. Іо-дзамъ-пу, августъ.

Въ ю.-з. Гань-су эта орѣховка водится только въ горахъ на границѣ Шенси и очень рѣдка; въ Сигученскомъ и Минджеускомъ округахъ встрѣчена повсюду, хотя тоже не многочисленна. Держится исключительно въ горныхъ еловыхъ лѣсахъ. Видъ этотъ гнѣздуетъ, повидимому, чрезвычайно рано: самецъ, добытый въ концѣ января (Сатани), имѣлъ уже сильно набухшія яички, а молодая птица, добытая 28 іюля, уже совсѣмъ почти вылиняла, но имѣла еще не вполнѣ отросшіе главные махи.

Pica pica (Linn.).

[*Pica caudata*, David et Oust., Ois. Chine, p. 373.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 62.

Размѣры:

Кр. 211. Кл. 41,5. Пл. 53. Хв. 264.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, мартъ.

Cyanopolius cyaneus (Pall.).

[*Cyanopolius cyaneus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 374, pl. 84.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 68.

Размѣры:

Дл. 370—390. Разм. 430—440. Кр. 136—145. Кл. 27—30. Пл. 36—37. Хв. 207—230.

Экземпляры: Дер. Танъ-синъ (Пекинская равнина), іюнь;—р. Уланъ-муренъ (Ордосъ), августъ;—г. Хой-синъ, мартъ.

Этотъ видъ встрѣченъ по всему пути экспедиціи, отъ Пекина до южной Гань-су включительно. На Пекинской равнинѣ онъ очень обыкновенъ въ садахъ, около кумиренъ. Въ Ордосѣ найденъ по р. Уланъ-муренъ, долина и увалы которой сплошь заросли кустарной чащей. Въ южной Гань-су встрѣчается спорадически, небольшими колоніями, въ самомъ низшемъ, культурномъ поясѣ горъ.

Urocissa erythrorhincha (Gm.).

[*Urocissa sinensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 375, pl. 83.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 71.

Размѣры:

♂ Дл. 650. Разм. 605. Кр. 188—193. Кл. 35—36,5. Пл. 44—49. Хв. 422—445.
♀ » — » — » 185. » 33. » 42. » 377.

Экземпляры: Г. Хой-синъ, декабрь.

Этотъ видъ распространенъ по всей южной Гань-су, но нигдѣ особенно не многочисленъ. На востокѣ встрѣченъ на границѣ Шенси, а на западѣ въ долинѣ рѣки Тао-хэ, выше города Минджеу и въ Сигученскомъ округѣ. Эта красивая птица повсюду предпочитаетъ мѣстности сравнительно открытыя, съ одиноко-стоящими группами деревьевъ и, хотя встрѣчается и въ лѣсахъ, но рѣдко и только въ главныхъ долинахъ.

Garrulus bispecularis, Vigors.

[*Garrulus bispecularis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 377.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 100.

Размѣры:

♂ Дл. 370—375. Разм. 565—580. Кр. 190. Кл. 32—33,5. Пл. 42—42,5. Хв. 172—175.
♀ » 340—355. » 540—580. » 180—188. » 29—33. » 41—43. » 160—170.

Экземпляры: Дер. Сѣтани, ноябрь, декабрь, февраль;—дер. Іо-дзамъ-пу, августъ;—дер. Лотани, сентябрь.

Наши экземпляры (10) замѣчательны разнообразіемъ окраски оперенія. Они располагаются въ рядъ, въ которомъ крайніе члены настолько отличны, что ихъ можно было бы счесть за различные виды. На одномъ краю экземпляры съ совершенно одноц-

вѣтнымъ, рыжеватымъ, верхомъ головы и рыжеватой спиной, на другомъ — съ рѣзкими темными наствольными полосками на перьяхъ головы и синевато сѣрымъ налетомъ на спинѣ и даже (одинъ экз.) съ синевато сѣрыми пятнами на груди. Между ними рядъ переходовъ. Эти различія не связаны, повидимому, ни съ поломъ ни съ временемъ года. Хотя большая часть темноцвѣтныхъ, съ наствольными головными полосками, птицъ бита осенью, а одноцвѣтныхъ—зимой, но есть лѣтнія и въ старомъ обношенномъ опереніи, представляющія тѣже отличія.

Въ ю.-з. Гань-су эта сойка весьма обыкновенна. Зимой птицы собираются въ большія стада, которыя держатся по опушкамъ еловыхъ и дубовыхъ лѣсовъ средняго пояса горъ. Въ Хойсянскомъ округѣ этотъ видъ не найденъ, но весьма вѣроятно, что тамъ водится.

Fregilus graculus himalayanus, Gould.

[*Fregilus graculus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 371.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 146. — Seebohm, Hist. Brit. B., I, p. 578.

Размѣры:

♂ Дл. 460. Разм. 915. Кр. 315. Кл. 61. Пл. 59. Хв. 178.

Экземпляръ: Дер. Чаго, январь.

На основаніи размѣровъ мы относимъ нашъ экземпляръ къ крупной гималайской расѣ, хотя возможно, что это исключительная птица и большинство китайскихъ клушицъ не крупнѣе европейскихъ.

Кромѣ величины, этотъ экземпляръ замѣчателенъ тѣмъ, что имѣетъ на лбу у основанія клюва большой (съ ленцинный орѣхъ) кожистый наростъ краснаго цвѣта. Мой слуга тангуты, убившій эту птицу, обратилъ вниманіе и на ея величину и на наростъ и увѣрялъ меня, что безъ сомнѣнія это не простая птица, а крупная чиновная особа между клушицами.

Въ южной Гань-су клушица сравнительно рѣдка. Въ ю.-з. части встрѣчается только въ нижнемъ, сравнительно безлѣсномъ, поясѣ горъ и зимой держится вблизи деревень.

Podoces Hendersoni, Hume.

[*Podoces Hendersoni*, David et Oust., Ois. Chine, p. 553.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 151.

Размѣры:

Кр. 133. Кл. 38. Пл. 43. Хв. 101.

Экземпляръ: Уроч. Котель-усу (сѣв. Гоби), августъ.

Нашъ единственный экземпляръ добытъ экспедиціею Г. Н. Потанина на обратномъ ея пути въ Россію.

Podoces humilis, Hume.

[*Podoces humilis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 554.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 152.

Размѣры:

Дл. 180—190. Разм. 285. Кр. 90—91. Кл. 23,5—25. Пл. 28—29. Хв. 64—66.

Экземпляры: Монаст. Гумбумъ (с. з. Гань-су), мартъ.

Этотъ видъ довольно обыкновенъ въ окрестностяхъ города Синина и по пути отъ послѣдняго въ г. Лань-джеу. Птички встрѣчаются, по одиночкѣ или небольшими табунками, по лёсовымъ буграмъ близъ дороги, которые даже травой одѣты плохо. Онѣ не пугливы и отъ преслѣдованія перелетаютъ только на вершину ближайшаго бугра; по землѣ бѣгаютъ быстро, но не далеко. Голосъ ихъ низкій и очень звучный свистъ.

STURNIDAE.

Spodiopsar cineraceus (Temm.).

[*Sturnus cineraceus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 361.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIII, p. 41.

Размѣры:

♂ Дл. 225—250. Разм. 410—420. Кр. 127—130. Кл. 28,5—31. Пл. 31—31,5. Хв. 67—70.
♀ » 220. » 400. » 130. » 29. » 30. » 66.

Экземпляры: Городъ Бао-динъ-фу (Пекинская равнина), май, іюнь; — Уроч. Сань-чуань (на Желтой рѣкѣ, выше г. Лань-джеу), апрѣль; — г. Хой-сянъ, декабрь.

Всѣ наши апрѣльскіе, майскіе и іюньскіе экземпляры имѣютъ клювъ оранжево-красный съ свѣтлымъ, желтоватымъ, концомъ, а бока нижней челюсти у основанія черноватые. У декабрьскихъ птицъ клювъ черный.

Этотъ скворецъ, весьма обыкновенный на Пекинской равнинѣ, обиленъ также и въ Гань-су. Въ Хойсянскомъ округѣ я встрѣчалъ его зимой въ садахъ города Хойсяна, табунами въ нѣсколько десятковъ штукъ. Въ Сигученскомъ и Миндженскомъ округахъ я этого вида не наблюдалъ, но это произошло, вѣроятно, лишь оттого, что большую часть времени я проводилъ въ горахъ и въ низкія долины спускался рѣдко и не надолго.

MELIPHAGIDAE.

Zosterops erythropleura, Swinh.

[*Zosterops erythropleurus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 85, pl. 12.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., IX, p. 161.—Swinhoe, Proc. Zool. Soc. 1862, p. 204; 1870, p. 488.

Размѣры:

♂ Дл. 115. Разм. 177. Кр. 60. Кл. 13,3. Пл. 16. Хв. 40. (a)
♀ » 120. » 185. » 60. » 14,5. » 16. » 38. (b)

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, (a) 24 іюня, (b) начало іюля.

При опредѣленіи этого вида, мы встрѣтили нѣкоторое затрудненіе. Оба наши экземпляра почти совершенно тождественны какъ по размѣрамъ, такъ и по общей окраскѣ, за исключеніемъ того, что самка отличается отъ самца почти полнымъ отсутствіемъ каштановаго цвѣта на бокахъ тѣла. Пользуясь таблицами Gadow'a, мы приняли ее сначала за *Z. simplex*, но она отлична отъ послѣдняго бурымъ клювомъ (у *Z. simplex* черный), отсутствіемъ желтой полоски надъ уздечками и желтаго цвѣта на лбу и, наконецъ, большей величиной. О различіи въ окраскѣ половъ *Z. erythropleura* упоминаютъ и гг. David и Oustalet, и Swinhoe, но эти авторы упоминаютъ только о блѣдности каштановаго цвѣта боковъ тѣла у самки; у нашего же экземпляра этотъ цвѣтъ почти отсутствуетъ.

Этотъ видъ встрѣченъ только въ ю.-з. Гань-су, лѣтомъ и въ небольшомъ количествѣ.

CERTHIIDAE.

Certhia familiaris nipalensis, Hodgs.

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 329.—Hume, Str. Feath., V, p. 74 et 79.—Seebohm, Hist. Brit. B., I, p. 512.

Размѣры:

♂ Дл. 145. Разм. 200—207. Кр. 67—68. Кл. 18,5—20. Пл. 14—15,6. Хв. 69—70.
? » — » —— » 65. » —— » 14. » 66.

Экземпляры: Дер. Сàтани, декабрь;—дер. Іо-дзамъ-пу, августъ;—дер. Лотани, октябрь.

Certhia himalayana, Vigors.

[*Certhia himalayana*, David et Oust., Ois. Chine, p. 88, pl. 14.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 327.—Hume, Str. Feath., V, p. 73—79.—Seebohm, Hist. Brit. B., I, p. 513.

Размѣры:

♂ Дл. 150 Разм. 217. Кр. 72. Кл. 24. Пл. 15. Хв. 72.
♀ » 145. » 205. » 69. » 19,2. » 14. » 65.

Экземпляры: Дер. Лотани, сентябрь, октябрь.

Tichodroma muraria (Linn.).

[*Tichodroma muralis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 88.]

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 331.—Seebohm, Hist. Brit. B. I, p. 518.

Размѣры:

♂ Дл. 167—170. Разм. 310—320. Кр. 102—105. Кл. 28—30. Пл. 20,5—22. Хв. 60—64.
♀ » 167. » 307. » 100. » 26. » 22. » 61.

Экземпляры: Г. Лань-джеу, октябрь; — дер. Лото-пинъ, іюль; — дер. Дзю-юань, августъ; — дер. Сàтани, февраль; — рѣка Соломà (въ Нань-шанѣ), май.

Стѣнолазъ встрѣченъ въ Гань-су повсемѣстно. Зимой попадается даже въ самыхъ глубокихъ долинахъ.

FRINGILLIDAE.

Cynchramus polaris (Midd.).

[*Schoenicola Pallasii*, David et Oust., Ois. Chine, p. 321.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 485 (E. passerina).

Размѣры:

♂ Дл. 140. Разм. 215. Кр. 69. Кл. 11,2. Пл. 15,5. Хв. 63.

Экземпляръ: Оз. Чаганъ-норъ (Ордосъ), августъ.

Нашъ единственный экземпляръ добытъ въ Ордосѣ; въ южной Гань-су этотъ видъ не встрѣченъ.

Cynchamus schoeniclus (Linn.).

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 480.

Размѣры:

♂ Дл. 170. Разм. 255. Кр. 82. Кл. 11,2. Пл. 17,2. Хв. 72.

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, конецъ февраля.

Единственный экземпляръ этого вида встрѣченъ и добытъ въ болотистыхъ лугахъ около г. Хой-сяна въ концѣ февраля.

Emberiza pusilla, Pall.

[*Emberiza pusilla*, David et Oust., Ois. Chine, p. 323.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 487.

Размѣры:

♂ Дл. 145. Разм. 215. Кр. 68. Кл. 12. Пл. 16. Хв. 60. (a)
? » 140—150. » 215—225. » 70—72. » 11—12. » 16. » 61—62. (b)

Экземпляры: (a) Уроч. Боро-балгасунъ (Ордосъ) 21 сентября;—(b) г. Хой-сянъ, февраль, начало марта.

Эта овсянка встрѣчена въ небольшомъ количествѣ зимующею по болотистымъ лугамъ около г. Хой-сяна.

Emberiza elegans, Temm.

[*Emberiza elegans*, David et Oust., Ois. Chine, p. 322.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 497.

Размѣры:

♂ Дл. 150—160. Разм. 220—225. Кр. 70—71. Кл. 12—13. Пл. 16—17,5. Хв. 68.
♀ » 145—155. » 215—220. » 66—69. » 12. » 17—17,5. » 59—64.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, начало марта;—дер. Лотани, сентябрь;—дер. Ланъ-дзя-коу (въ Шенси), середина марта.

Эта овсянка зимой въ Гань-су нигдѣ не наблюдалась. Первыя пролетныя появились около г. Хой-сяна въ небольшомъ количествѣ въ началѣ марта. Въ ю.-з. Гань-су встрѣчена лишь однажды, въ серединѣ сентября, около дер. Лотани.

Emberiza aureola, Pall.

[*Emberiza aureola*, David et Oust., Ois. Chine, p. 332.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 509.

Размѣры:

♂ Дл. 155—160. Разм. 245—250. Кр. 76—78. Кл. 13,5—14. Пл. 19. Хв. 65.
♀ » 160. » 255. » 71. » 14. » 19. » —

Экземпляры: Городъ Ша-хэ (с. Китай), іюль;—мѣст. Хэ-коу (с.-в. изгибъ Хуанъ-хэ), августъ.

Въ южной Гань-су этотъ видъ не встрѣченъ.

Emberiza cioides castaneiceps, Moore.

[*Emberiza cioides*, David et Oust., Ois. Chine, p. 328.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 544. — Seebohm, Ibis, 1889, p. 296.

Размѣры:

♂ Дл. 180. Разм. 250. Кр. 76—80. Кл. 12,5—13. Пл. 16—18. Хв. 75—81.
♀ » 170. » 240. » 75. » 13,5. » 17. » 79.

Экземпляры: Горы У-тай-шань, іюнь; — г. Лань-джеу, октябрь; — г. Хой-сянъ, декабрь.

Эта овсянка весьма обыкновенна въ ю.-в. части Гань-су, но не была наблюдаема ни въ Сигученскомъ, ни въ Минджеускомъ округахъ, гдѣ, кажется, вполнѣ замѣщена слѣдующимъ видомъ.

Emberiza Godlewskii, Tacz.

[*Emberiza Godlewskii* et *Emberiza cia*, David et Oust., Ois. Chine, p. 546 et 327.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 542, pl. XII.

Размѣры:

♂ Дл. 165—185. Разм. 255—265. Кр. 75—85. Кл. 13—13,5. Пл. 17—19. Хв. 79—85.
♀ » 160. » 255. » 69. » 13,2. » 17. » 70.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, январь, февраль; — дер. Сатани, ноябрь; — дер. Чунъ-дзя (с.-з. Гань-су, къ югу отъ г. Синина), апрѣль; — дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь; — дер. Лотани, октябрь; — дер. Чаго, іюль.

Этотъ видъ весьма обыкновенень и въ ю.-в. и въ ю.-з. Гань-су; въ послѣдней, кажется, вполнѣ замѣняетъ *E. castaneiceps*.

Emberiza leucocephala, Gmel.

[*Emberiza leucocephala*, David et Oust., Ois. Chine, p. 329.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 549.

Размѣры:

Дл. 170—190. Разм. 277—300. Кр. 88—92. Кл. 12,5—13,7. Пл. 18,5—19. Хв. 79—83.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, 15-го февраля; — дер. Чаго, конецъ декабря.

Въ Хойсянскомъ округѣ эта овсянка зимой не встрѣчалась; появилась въ началѣ февраля, табунами въ нѣсколько сотъ штукъ, которые держались по болотистымъ лугамъ около самаго города Хой-сяна. Въ ю.-з. Гань-су встрѣчена лишь одиночная птичка въ концѣ декабря, очевидно случайно зазимовавшая; лѣтомъ этотъ видъ здѣсь не наблюдался.

Fringilla montifringilla, Linn.

[*Fringilla montifringilla*, David et Oust., Ois. Chine, p. 333.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 178.

Размѣры:

♂ Дл. 160—170. Разм. 280. Кр. 92—95. Кл. 15—16. Пл. 17—19. Хв. 66—71.
♀ » 155—165. » 255—265. » 85—88. » 14—14,5. » 17. » 62—64.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, февраль, мартъ.

Въ Хойсянскомъ округѣ вьюрокъ встрѣчался, въ небольшомъ количествѣ, въ продолженіи всей зимы, въ концѣ-же февраля появился громадными, въ нѣсколько сотъ штукъ, табунами, которые держались по горнымъ пашнямъ. Встрѣченъ въ небольшомъ количествѣ также и въ ю.-з. Гань-су.

Leucosticte Brandti, Bp.

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 269. — Sewertzow, Ibis, 1883, p. 58.

Размѣры:

♂ Дл. 187. Разм. 330. Кр. 113. Кл. 14. Пл. 21. Хв. 74.
♀ » 185. » 335. » 114. » 14. » 19. » 80.
? » 185—190. » 340—350. » 114—119. » 14. » 19—21. » 75—82.

Радужина свѣтло-бурая. Клювъ у основанія грязно-желтый, къ концу постепенно чернѣетъ. Плюсны и когти черные.

Экземпляры: Дер. Та-хей-гоу, декабрь.

У всѣхъ нашихъ экземпляровъ перья надхвостья съ рѣзкой розовой оторочкой и никакихъ слѣдовъ розоваго цвѣта на малыхъ кроющихъ крыла, т. е., по Сѣверцову (l. c.) всѣ они принадлежатъ къ виду *L. haematopygia*, Gould. Г. Sharpe соединяетъ *L. haematopygia*, *L. pamirensis* Sew. и *L. Brandti*, принимая эти виды за сезонные и возрастные наряды одного и того-же вида. Вѣроятно, такой взглядъ правиленъ; отмѣтимъ только, что наши экземпляры отличаются отъ *L. pamirensis* (сбора

г. Грумъ-Гржимайло въ Памирѣ и западномъ Гинду-кушѣ, лѣтнихъ) не только присутствіемъ розовыхъ оторочекъ на перьяхъ надхвостья, но и основнымъ цвѣтомъ послѣдняго, — сѣро-бурымъ, вмѣсто пепельно-сѣраго у памирскихъ птицъ.

Этотъ видъ встрѣченъ лишь однажды — въ декабрѣ мѣсяцѣ, на высокомъ перевалѣ черезъ хребетъ, отдѣляющій Спгученскій округъ отъ Сы-чуани. Птички держались по альпійскимъ лугамъ вблизи скалъ, громадными табунами въ нѣсколько сотъ штукъ вмѣстѣ.

Fringillauda nemoricola, Hodgs.

[*Fringillauda nemoricola*, David et Oust., Ois. Chine, p. 334.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 268.

Размѣры:

♂ Дл. 165. Разм. 275. Кр. 91. Кл. 13,5. Пл. 17,5. Хв. 67. (a)
♂ » 175. » 290. » 96. » 13,5. » 18. » 73. (b)

Радужина у экз. (a) свѣтло-коричневая, у (b) свѣтло-бурая. Клювъ темно-роговаго цвѣта, основаніе нижней челюсти желтоватое. Плюсны темно-коричневыя.

Экземпляры: (a) Дер. Дзю-юань, конецъ іюля; — (b) дер. Джоза́-паза́, начало октября.

Наши два экземпляра, оба самца, различаются тѣмъ, что у одного (осенняго, въ прекрасномъ свѣжемъ опереніи) верхъ головы совершенно одноцвѣтный — желтовато-бурый, у другого-же (лѣтняго, въ сильно обношенномъ опереніи) — съ черными наствольными полосками.

Одноцвѣтность головы по г. Sharpe'у есть признакъ молодости птицы, а по гг. David и Oustalet наоборотъ — старости. Которое изъ двухъ мнѣній справедливо, — судить не беремся.

Оба наши экземпляра добыты въ ю.-з. Гань-су, въ скалахъ альпійской области.

Erythrospiza mongolica (Swinh.).

[*Erythrospiza mongolica*, David et Oust., Ois. Chine, p. 349, pl. 97.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 287.

Размѣры:

♂ Дл. 150—155. Разм. 275—280. Кр. 90—95. Кл. 11—12. Пл. 15,5—16. Хв. 60—65.
♀ » 145—150. » 265—270. » 87—89. » 10—12. » 15,5—16. » 56—61.

Экземпляры: Дер. Шао-дзя-танъ (въ с. Гань-су, близъ г. Лань-джеу), ноябрь.

Этотъ видъ встрѣченъ только на пути изъ степной части Гань-су (къ сѣверу отъ Желтой рѣки) въ г. Лань-джеу, 3-го ноября. Большіе табуны, въ нѣсколько сотенъ штукъ, прилетали на водопой на ключики и ручейки, текущіе по дну лёсовыхъ коррпдоровъ, въ которые входитъ дорога, приближаясь къ Желтой рѣкѣ.

Petronia petronia (Linn.).

[*Pyrgita petronia*, David et Oust., Ois. Chine, p. 339.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 289.

Размѣры:

Дл. 162. Разм. 290. Кр. 95. Кл. 14. Пл. 16. Хв. 63.

Экземпляръ: Г. Лань-джеу, ноябрь.

Этотъ видъ, подобно предидущему, встрѣченъ только около г. Лань-джеу.

Passer rutilans, Temm.

[*Passer rutilans*, David et Oust., Ois. Chine, p. 341.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 329.

Размѣры:

♂ Дл. 135. Разм. 215. Кр. 70. Кл. 13,5. Пл. 15,5. Хв. 51.
♀ » 130. » 210. » 65. » 12,5. » 15. » 46.

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, май, іюнь.

Этотъ воробей встрѣченъ по всей южной Гань-су, но въ небольшомъ количествѣ и только лѣтомъ. Держится въ предгорьяхъ, обыкновенно вблизи деревень.

Passer montanus (Linn.).

[*Passer montanus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 340.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 301.

Размѣры:

♂ Дл. —— Разм. —— Кр. 71. Кл. 13,5. Пл. 16. Хв. 62.
♀ » 140. » 210—220. » 68—71. » 12. » 16. » 58.

Экземпляры: Дер. Ванъ-куай (Пекинская равнина), іюнь; — уроч. Эдженъ-хоро (Ордосъ), августъ; — дер. Лото-пинъ, іюль.

Наши экземпляры съ Пекинской равнины, изъ Ордоса и изъ южной Гань-су ничѣмъ между собой не различаются.

Полевой воробей вполнѣ замѣщаетъ въ Китаѣ нашего домашняго воробья.

Procarduelis rubescens, Blanf.

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 184.

Размѣры:

♂ Дл. 145—160. Разм. 240—255. Кр. 78—84. Кл. 13—15. Пл. 16—17. Хв. 53—60.
♀ » 150—160. » 245—250. » 77—80. » 14—15. » 16—17,5. » 56—60.

У стараго (очень краснаго) самца радужина темно-бурая; клювъ: верхняя челюсть бурая, нижняя — оливково-желтая, съ темными краями и концомъ; плюсны грязно-желтыя; пальцы и когти бурые. У болѣе молодыхъ самцовъ и у самокъ нижняя челюсть темнѣе, буроватая; плюсны бурыя.

Экземпляры: Дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь, іюль, августъ; — дер. Джоза́-паза́, сентябрь.

Мы имѣемъ довольно большую серію экземпляровъ этого вида, представляющую большое разнообразіе въ окраскѣ самцовъ. Отъ буро-сѣрыхъ молодыхъ птицъ, почти совершенно похожихъ на самокъ, до ярко-красныхъ старыхъ самцовъ — рядъ промежуточныхъ нарядовъ, различающихся между собою степенями развитія краснаго цвѣта и оттѣнками послѣдняго. Это разнообразіе окраски зависитъ отъ двухъ причинъ, отъ возраста птицъ и отъ измѣненія краснаго цвѣта отъ выцвѣтанія. Красный цвѣтъ развивается въ опереніи самцовъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, захватывая все большую и большую часть оперенія и становясь болѣе и болѣе интенсивнымъ. Измѣненіе окраски совершается, кажется, главнымъ образомъ путемъ пигментаціи перьевъ въ брачные періоды и только закрѣпляется линяніемъ. Въ промежутокъ между линяніями красный цвѣтъ измѣняется отъ выцвѣтанія. Величина измѣненія зависитъ, повидимому, также отъ возраста птицъ: старые, ярко-красные, самцы выцвѣтаютъ мало, болѣе-же молодые, менѣе ярко-окрашенные, пріобрѣтаютъ болѣе или менѣе рѣзкій желтовато-рыжій оттѣнокъ.

По степенямъ развитія въ опереніи краснаго цвѣта и по предполагаемому возрасту, наши экземпляры распредѣляются въ слѣдующія группы:

I. Самцы въ буромъ нарядѣ, похожіе на самку или же только что начавшіе получать розовую окраску. Сюда относятся:

Самецъ (полъ опредѣленъ вскрытіемъ), добытый 24-го августа, отличающійся отъ самки только болѣе сѣроватымъ тономъ и отсутствіемъ оливково-рыжаго оттѣнка на зобу и груди. Это различіе зависитъ, вѣроятно, лишь оттого, что птичка имѣетъ опереніе сильно обношенное, — у всѣхъ нашихъ самокъ опереніе свѣтлѣе. Сильная обношенность оперенія заставляетъ считать этого самца за годовика.

Два самца, добытыхъ 20-го іюля. Оба рыжевато-бурые, какъ самка, но имѣютъ на груди и зобу островки ярко-розовыхъ перьевъ, а на верхнихъ малыхъ кроющихъ маховъ 2-го порядка — розовые ободки; ободки остальныхъ кроющихъ рыжеватые. Вѣроятно, это годовики въ 1-й брачный періодъ. То обстоятельство, что первый самецъ, добытый мѣсяцемъ позже, не имѣетъ въ опереніи даже слѣдовъ розоваго цвѣта, объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что это холостой, по чему либо не нашедшій себѣ пары, два-же послѣдніе — гнѣздующіе.

II. Самцы розоватые, рѣзко отличающіеся отъ самки, но имѣющіе, подобно предыдущимъ, только малыя кроющія маховъ 2-го порядка съ розоватыми ободками,— всѣ-же остальныя кроющія съ рыжеватыми. Сюда относятся:

Нѣсколько экземпляровъ, добытыхъ съ 20-го іюня по 20-го августа, имѣющіе опереніе болѣе или менѣе выцвѣтшее, съ рыжеватымъ оттѣнкомъ; у нѣкоторыхъ на груди и зобу пятна яркаго розоваго цвѣта. Вѣроятно, это самцы ко второму брачному періоду и во время его.

Одинъ экземпляръ, добытый 28-го сентября, болѣе ярко-розовый, чѣмъ предыдущіе, безъ желтаго оттѣнка. Опереніе очень свѣжее. Это самецъ послѣ втораго брачнаго періода и линянія.

III. Самцы, болѣе густо окрашенные, чѣмъ предыдущіе и имѣющіе розовые ободки, кромѣ малыхъ кроющихъ маховъ 2-го порядка, также на среднихъ. Ободки большихъ кроющихъ и кроющихъ главныхъ маховъ еще рыжеватые. Сюда относятся:

Нѣсколько экземпляровъ, добытыхъ съ 28-го іюля по 30-го августа, изъ которыхъ одни ярко-красные, другіе съ рыжеватымъ оттѣнкомъ. У нѣкоторыхъ ближайшія къ плечевымъ большія кроющія маховъ 2-го порядка имѣютъ уже розовые ободки. Вѣроятно, это птицы къ третьему брачному періоду и во время его.

IV. Самцы въ полномъ нарядѣ, очень густо окрашенные и имѣющіе розовые ободки на всѣхъ верхнихъ кроющихъ маховъ и розоватыя каймы на перьяхъ подхвостья (у всѣхъ предыдущихъ послѣднія бѣловатыя). Сюда относятся:

Нѣсколько экземпляровъ, добытыхъ съ 31-го іюня по 6-го августа, не имѣющихъ въ опереніи и слѣдовъ рыжеватаго оттѣнка. Это самцы послѣ третьяго брачнаго періода, т. е. трехлѣтки и старше.

Самки болѣе однообразны, представляя только незначительныя различія въ большемъ или меньшемъ развитіи красноватыхъ ободковъ перьевъ головы, груди и надхвостья.

P. rubescens гнѣздится въ порядочномъ количествѣ въ лѣсныхъ ущельяхъ ю.-з. Гань-су. Особенно обильнымъ я нашелъ этотъ видъ лѣтомъ 1886 года въ ущельи р. Іо-дзамъ-пу, что, вѣроятно, объясняется тѣмъ, что въ этомъ году здѣсь цвѣлъ бамбукъ [1]), — въ зобахъ птицъ въ продолженіи всего лѣта я находилъ исключительно только бамбуковыя зерна въ различныхъ степеняхъ зрѣлости. Первый разъ птички встрѣчены 20-го іюня и, вѣроятно, либо только что, либо недавно прилетѣли. Они дер-

---

[1]) Цвѣтеніе бамбука явленіе чрезвычайно рѣдкое, случающееся чуть-ли не во сто лѣтъ разъ. Старожилы дер. Іо-дзамъ-пу не помнятъ чтобы въ ихъ мѣстности когда либо цвѣлъ бамбукъ, а слыхали объ этомъ только отъ отцовъ. Цвѣтеніе поражаетъ данную мѣстность какъ болѣзнь, такъ какъ одновременно зацвѣтаютъ обширныя площади (нѣсколько ущелій) и растенія отцвѣтши засыхаютъ. Молодой бамбукъ выходитъ ростками такой-же толщины какъ старый, быстро достигаетъ полнаго роста, но надолго остается мягкимъ, негоднымъ для подѣлокъ. Молодыя заросли появляются по опушкамъ и для того, чтобы мѣстность приняла прежній видъ надо, вѣроятно, нѣсколько лѣтъ. Бѣдняки дѣлаютъ запасы бамбуковыхъ зеренъ. Послѣдніе похожи видомъ на голый китайскій овесъ, а цвѣтомъ — на рожь. Ихъ перемалываютъ на муку или варятъ въ водѣ съ саломъ. Это блюдо довольно пріятнаго вкуса.

жались табунками въ 5—10 штукъ, прилетавшими на кормежку въ бамбуковыя заросли. Недѣлей позже табунки разбились уже на пары. Интересно, что пары встрѣчались не въ разбросъ, а всегда въ большомъ количествѣ въ опредѣленныхъ, узко ограниченныхъ, участкахъ, большею частью въ горныхъ еловыхъ лѣсахъ, поросшихъ бамбукомъ, — какъ будто птички соединялись въ большія общества для совмѣстнаго гнѣздованія. Подобныя колоніи попадались съ высоты 8000 футъ и до альпійскихъ луговъ. Періодъ гнѣздованія длится, вѣроятно, до сентября, такъ какъ одна самка, добытая 24-го августа, судя по состоянію кожи живота либо сидѣла на яйцахъ, либо только что вывела. Въ серіи нашихъ экземпляровъ съ 20-го іюня по 24-го августа совсѣмъ нѣтъ линяющихъ; птица же, добытая 28-го сентября, имѣла совершенно свѣжее опереніе, — очевидно, только что вылиняла.

P. rubescens очень осторожная и недовѣрчивая птичка, обладающая чрезвычайно быстрымъ и сильнымъ полетомъ. Призывный крикъ самца, издаваемый на лету, можетъ быть переданъ словами «питъ-тэ... питъ-тэ...»; пѣніе очень громкое, но однообразное и немелодичное. Птица поетъ вечеромъ на закатѣ солнца, усѣвшись, обыкновенно, на самую верхушку дерева. Въ брачный періодъ самцы чрезвычайно привязаны къ самкамъ. Если убита самка, самецъ съ отчаянными призывными криками носится кругомъ, улетаетъ, снова возвращается и, только изслѣдовавъ всю окружающую мѣстность и возвратившись раза четыре или пять, рѣшаетъ окончательно покинуть мѣсто своего несчастія.

Procarduelis nipalensis (Hodgs.).

[*Procarduelis nipalensis*, David et Oust., Ois. Chine, p. 351.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 182.

Размѣры:

♂ Дл. 165. Разм. 280. Кр. 89. Кл. 13,5. Пл. 19,5. Хв. 68.

Экземпляръ: Дер. Дзю-юань, августъ.

Одна особь этого вида встрѣчена однажды, 15-го августа, въ горахъ лѣваго берега Сигученской рѣки. Эта птичка совершенно тождественна съ экземплярами Музея Императорской Академіи Наукъ, изъ Даржелинга.

Carpodacus erythrinus Grebnitskii, Stejneger.

[*Carpodacus erythrinus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 350.]

Stejneger, Bull. Un. St. Nat. Mus., № 29, p. 265 (1885).

Размѣры:

♂ ad. Дл. 150—160. Разм. 255—260. Кр. 81—85. Кл. 13—15. Пл. 16—17,5. Хв. 60—64.

♂ imm. » 140—160. » 245—255. » 76—83. » 12,5—14. » 16,5—17. » 56—61.

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, іюль; — г. Сумъ-панъ (Сы-чуань), 28-го іюля; — дер. Іодзамъ-пу, 20-го іюня; — дер. Лотани, сентябрь, середина октября.

Всѣ наши красные самцы отличаются отъ чечевицы, гнѣздующей въ Европейской

Россіи бо́льшимъ развитіемъ въ оперенін краснаго цвѣта и бо́льшею яркостью послѣдняго. Этой-же особенностью отличается чечевица, гнѣздующая въ восточной Сибири и Камчаткѣ и, на основаніи экземпляровъ изъ послѣдней мѣстности выдѣленая г. Stejneger'омъ въ особую расу подъ названіемъ *C. Grebnitskii*. Кромѣ Сибири и Камчатки эта ярко окрашенная раса гнѣздуетъ, повидимому, въ Китаѣ и, вѣроятно, также въ Гималайяхъ. Относительно индійскихъ птицъ г. Sharpe[1]) приводитъ мнѣніе полковника Butler'a, что яркая и блѣдная окраска чечевицы есть ни что иное, какъ брачный и зимній ея наряды, но такому взгляду противорѣчитъ блѣдная окраска чечевицы, гнѣздующей въ Европѣ. Не объясняется-ли мнѣніе полковника Butler'a тѣмъ, что блѣдно окрашенная чечевица наблюдается въ Индіи преимущественно зимой?

Этотъ видъ встрѣченъ мною въ большомъ количествѣ въ іюлѣ 1875 г. близъ дер. Лото-пинъ, Сигученскаго округа, а экспедиціею Г. Н. Потанина на всемъ пути отъ г. Сигу до г. Сумъ-пана въ Сы-чуани (съ 6-го по 28-ое іюля). Слѣдующее лѣто, проведенное мною въ горахъ лѣваго берега Сигученской рѣки, чечевица встрѣчена всего раза три, во всѣхъ случаяхъ одиночные самцы въ нарядѣ самокъ. Рѣдкость чечевицы въ горахъ лѣваго берега Сигученской рѣки объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что высокія и сильно лѣсистыя горныя ущелья не представляютъ здѣсь станцій, удобныхъ для гнѣздованія этого вида, предпочитающаго перелѣски, чередующіеся съ лугами.

Carpodacus Stoliczkae (Hume).

Табл. III, фиг. 3 и 4.

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 403. — Hume, Str. Feath., II, p. 523 (1874).

Размѣры:

♂ Дл. 180. Разм. 290. Кр. 88—90. Кл. 12—12,5. Пл. 17,5. Хв. 72—74.
♀ » 160—170. » 280. » 82—86. » 11,7—12,5. » 17—18. » 66—74.

Экземпляры: Городъ Гуй-дэ-тинъ (Гуйдуй), май.

Цвѣтъ оперенія верхней стороны тѣла этого вида названъ г. Sharpe'омъ пепельно-бурымъ, а г. Hume'омъ — бѣловато-бурымъ; у нашихъ-же экземпляровъ верхняя сторона съ желтоватымъ оттѣнкомъ, т. е. песочно-бурая. Кромѣ того самка описана обоими авторами какъ совершенно одноцвѣтная сверху; наши-же самки имѣютъ довольно рѣзкую куркумово-желтую лобную полоску и слѣды того-же цвѣта на надхвостьи. Можетъ быть, эти различія объяснимы бо́льшею свѣжестью оперенія нашихъ птицъ, добытыхъ въ маѣ (6-го), тогда какъ экземпляры Британскаго Музея іюньскіе.

Всѣ экземпляры нашей коллекціи добыты В. И. Скасси, членомъ экспедиціи Г. Н. Потанина, около города Гуй-дэ въ с.-з. Гань-су. Птички держались, по его словамъ, небольшими табунками по лесовымъ береговымъ обрывамъ Желтой рѣки. Въ южной Гань-су этотъ видъ не наблюдался.

---

[1]) Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 391.

Carpodacus pulcherrimus (Moore).

[*Propasser davidianus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 354, pl. 95.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 429.

Размѣры

♂ Дл. 140—160. Разм. 245—260. Кр. 76—85. Кл. 11,5—12,3. Пл. 17—18. Хв. 66—74.
♀ » 145—150. » 235—240. » 75—79. » 12. » 16,5—18. » 65—69.

Экземпляры: Горы У-тай-шань, іюнь; — дер. Сàтани, ноябрь, декабрь, январь; — дер. Чунъ-дзя (къ югу отъ г. Синина), апрѣль; — дер. Джозá-пазá, октябрь; — дер. Чаго, декабрь, январь; — рѣки Рдонсукъ и Ташиту (въ Нань-шанѣ), май.

Этотъ видъ принадлежитъ къ числу наболѣе широко распространенныхъ видовъ рода *Carpodacus*. Онъ встрѣчается почти во всѣхъ гористыхъ мѣстностяхъ сѣвернаго и средняго Китая, въ Тибетѣ, также въ Гималайяхъ и, повидимому, совершенно не варьируетъ. Наши экземпляры изъ Утайскихъ горъ, Нань-шаня и западной Гань-су ничѣмъ между собой не различаются. *C. pulcherrimus* повсюду держится въ открытыхъ мѣстностяхъ, по опушкамъ лѣсовъ вблизи горныхъ луговъ и сплошныхъ лѣсовъ избѣгаетъ. Въ ю.-з. Гань-су даже зимой встрѣчается не ниже 8—9000 футъ, въ лугахъ на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ, всегда болѣе или менѣе многочисленными табунками, въ которыхъ преобладаютъ самки и молодые (сѣрые) самцы. Птички держатся, обыкновенно, на землѣ и голосомъ и полетомъ сильно напоминаютъ чечетокъ.

Carpodacus rubicilloides, Przew.

[*Carpodacus rubicilloïdes*, David et Oust., Ois. Chine, p. 551.]

Пржевальскій, Монг. и стр. Танг., т. II, птицы, стр. 90. — Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 402.

Размѣры:

♂ Дл. 205. Разм. 325. Кр. 108. Кл. 16. Пл. 22. Хв. 96.

Экземпляръ: Дер. Чунъ-дзя (къ югу отъ г. Синина), 15-го апрѣля.

Этотъ видъ очень близокъ къ *C. rubicillus* и *C. Sewertzowi*, но отличается отъ обоихъ, повидимому, совершенно постоянными признаками: отъ *C. Sewertzowi* — карминно-краснымъ цвѣтомъ груди (блѣдно-розовой у послѣдняго вида); отъ *C. rubicillus*, съ которымъ сходенъ яркостью краснаго цвѣта, — рѣзкими, широкими, темными наствольными пятнами на перьяхъ спины. У *C. rubicillus* этихъ пятенъ совсѣмъ нѣтъ, а у *C. Sewertzowi* лишь слабо замѣтныя темныя полоски вдоль стержней перьевъ.

Единственный экземпляръ этого вида добытъ 14-го апрѣля въ кустарныхъ зарослях долины рѣчки Чунъ-дзя, въ 50 верстахъ къ югу отъ г. Синина. Въ южной Гань-су не наблюдался.

Carpodacus roseus (Pall.).

[*Propasser roseus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 352.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 407.

Размѣры:

Дл. 175. Разм. 265. Кр. 91. Кл. 15,5. Пл. 19. Хв. 70.

Экземпляръ: Дер. Сàтани, январь.

Небольшой табунокъ этихъ птичекъ, штукъ въ 10, встрѣченъ 23-го января на вершинѣ междолиннаго хребта около дер. Сàтани. Птички держались на лугу, на опушкѣ лѣса. Кромѣ этого случая *C. roseus* нигдѣ въ Гань-су не наблюдался.

Carpodacus dubius, Przew.

[*Propasser dubius*, David et Oust., Ois. Chine, p. 552.]

Пржевальскій, Монг. и стр. Танг., II, птицы, стр. 92.—Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 427.

Размѣры:

♂ Дл. 165—185. Разм. 240—265. Кр. 80—87. Кл. 13—15. Пл. 20—22. Хв. 76—85.
♀ » 165—185. » 245—270. » 80—84. » 13,5—15. » 20—22. » 74—84.

Радужина буро-сѣрая. Плюсны розовато-бурыя. Клювъ: верхняя челюсть черная, нижняя — розовато-бурая.

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, августа; — дер. Сàтани, декабрь, январь, октября; — дер. Чунъ-дзя (къ югу отъ г. Синина), апрѣль; — дер. Іо-дзамъ-пу, сентябрь, октябрь; — дер. Лотани, сентябрь, октябрь.

Мы просмотрѣли болѣе сорока экземпляровъ *C. dubius* и имѣли возможность сравнить ихъ съ двумя экземплярами *C. thura* изъ Сикким, полученными Музеемъ Императорской Академіи Наукъ отъ г. Seebohm'a. Эти два вида въ общемъ чрезвычайно схожи, но различаются слѣдующими, повидимому постоянными, признаками:

Взрослый (красный) самецъ *C. thura* имѣетъ по бокамъ головы черно-бурую полоску, идущую отъ задняго края глаза назадъ. Эта полоска примыкаетъ къ глазу и совершенно раздѣляетъ розовый цвѣтъ брови и щеки. Въ передней части она шириной въ діаметръ глаза, къ задн же вѣерообразно расширяется. У *C. dubius* полоски нѣтъ [1]) и только на нѣкоторомъ разстояніи отъ глаза темное пятно, такой-же формы какъ расширенная часть полоски у *C. thura*, но свѣтлѣе и менѣе рѣзко ограниченное. Такимъ образомъ розовый цвѣтъ брови и щеки у *C. dubius* не раздѣленъ, а окружаетъ глазъ. Кромѣ того есть различіе въ цвѣтѣ спины. У *C. thura* спина бурая съ рыжеватымъ оттѣнкомъ, у *C. dubius* — землисто-бурая, безъ рыжеватаго оттѣнка. Послѣднее различіе, впрочемъ, не рѣзко и выступаетъ только въ серіи экземпляровъ.

[1]) На нѣкоторыхъ шкуркахъ кажется, будто полоска существуетъ и начинается отъ угла глаза, но это происходитъ отъ неправильнаго положенія нѣкоторыхъ перьевъ, у которыхъ видны ихъ темныя основанія; — концы перьевъ всегда розовые.

Различіе между самками, повидимому, гораздо рѣзче. У самки *C. thura* нижняя сторона двухцвѣтная, отъ подбородка до нижней части груди — ржавая, остальная-же часть грязно-бѣлая. У *C. dubius* нижняя сторона почти одноцвѣтная, грязно-бѣлая, и только на нижней части груди незначительная примѣсь ржаваго цвѣта. Кромѣ того самки различаются цвѣтомъ брови. У *C. thura* бровь одноцвѣтная рыжая; у *C. dubius* — двухцвѣтная, въ передней части рыжая, въ задней бѣловатая.

Всѣ наши довольно многочисленныя самки *C. dubius* весьма однообразны, очень мало разнясь между собою по окраскѣ, и рѣзко отличаются, вышеупомянутой одноцвѣтностью нижней стороны тѣла, отъ единственной бывшей у насъ въ рукахъ самки *C. thura*. Обращаемъ на это особое вниманіе въ виду того, что г. Sharpe принимаетъ за *C. dubius* птицъ изъ Сиккима, Нипала и Джильжита, названныхъ г. Biddulph'омъ *Propasser Blythi* (= *Propasser frontalis* apud Blyth (nec Say); между тѣмъ послѣдній авторъ говоритъ о трудности отличить самку этого вида отъ самки *C. thura*.

Молодые самцы *C. dubius* совершенно похожи на самокъ и только появленіе на груди желтизны, иногда съ розоватымъ оттѣнкомъ, даетъ возможность ихъ различить. Полный нарядъ они получаютъ, вѣроятно, на второй годъ, такъ какъ самцы въ нарядѣ самки встрѣчаются въ продолженіи всей зимы. Красныя птицы, добытыя въ различныя времена года, очень однообразны по окраскѣ, что не даетъ повода полагать, чтобы они пріобрѣтали полный нарядъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ. Взрослые самцы въ свѣжемъ опереніи (осенью, вѣроятно только что вылинявшіе) отличаются отъ птицъ, опереніе которыхъ болѣе или менѣе обношено (битыхъ зимой и весной) только тѣмъ, что имѣютъ свѣтлыя каймы большихъ кроющихъ крыла не съ розовымъ, а съ киноварно-краснымъ оттѣнкомъ; оттѣнокъ-же краснаго цвѣта остальнаго опереніа у тѣхъ и другихъ совершенно одинаковъ.

Западную часть Гань-су и прилежащую часть Тибета надо признать за настоящее отечество *C. dubius*, такъ какъ только здѣсь онъ довольно обиленъ и совершенно осѣдлый [1]). Кромѣ Гань-су онъ встрѣченъ Пржевальскимъ въ Алашаньскомъ хребтѣ. Въ горахъ западной Сы-чуани и въ Муппинѣ этотъ видъ не найденъ David'омъ, хотя его единственная парочка *C. thura*, добытая въ этихъ мѣстностяхъ, можетъ быть есть ни что иное, какъ *C. dubius*, что заставляетъ предполагать описаніе самки въ «Oiseaux de la Chine» (стр. 357). Что же касается Гималайевъ (если только *C. Blythi* окажется тождественнымъ съ *C. dubius*), то этотъ видъ тамъ рѣдокъ.

Въ с.-з. Гань-су *C. dubius* встрѣчается, по словамъ Пржевальскаго, въ горныхъ долинахъ по густымъ береговымъ зарослямъ рѣкъ. Въ подобной-же мѣстности я встрѣтилъ этотъ видъ въ апрѣлѣ 1886 года къ югу отъ города Синина, близъ Желтой рѣки. Въ ю.-з. Гань-су, гдѣ долины рѣкъ врѣзаны глубоко, *C. dubius* даже зимой не спускается до дна второстепенныхъ долинъ, а держится на вершинахъ междолинныхъ хребтовъ, на высотѣ не менѣе 8—9000 футъ; лѣтомъ же подымается въ

[1]) Ср. Пржевальскій, Четвертое Путешествіе, стр. 113.

альпійскую область. Зимой встрѣчается, обыкновенно, парочками, при чемъ часто самецъ и самка не различаются по окраскѣ. Красныхъ взрослыхъ самцовъ я встрѣчалъ большею частью по одиночкѣ. Птички держатся по кустарнымъ и бамбуковымъ зарослямъ и по опушкамъ лиственныхъ лѣсовъ, перелетаютъ не высоко надъ землей и никогда не садятся на вершины деревьевъ. Ихъ трескучій призывный крикъ напоминаетъ голосъ синицы.

Carpodacus trifasciatus, J. Verr.

[*Propasser trifasciatus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 353, pl. 93.]

Табл. III, фиг. 1 и 2.

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 404.

Размѣры:

♂ Дл. 180—190. Разм. 265—270. Кр. 83—87. Кл. 15. Пл. 18,5—21. Хв. 75—82.
♀ » 180—190. » 260—270. » 81—85. » 13,5—15. » 18—20. » 75—82.

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, іюль; — дер. Джоза-паза, сентябрь, октябрь; — дер. Чаго, декабрь, январь.

Самка этого вида еще не была извѣстна. Даемъ ее описаніе.

Самка. *Лобъ* пепельно-сѣрый съ черноватыми узкими продольными полосками. *Верхъ головы, затылокъ и спина* сѣрые, темнѣе лба и съ болѣе широкими темными продольными полосками; всѣ перья съ куркумово-желтыми оторочками, которыя слабо выражены на верху головы и болѣе рѣзки на затылкѣ и спинѣ. *Надхвостье* темнаго куркумово-желтаго цвѣта. *Верхнія кроющія хвоста* сѣрыя, иногда концы перьевъ съ бѣловатой каймой и желтыми неправильными пятнами. *Уздечки* и *щеки* грязно-желтоватыя, — всѣ перышки съ узкой темной конечной каемкой, что придаетъ этимъ частямъ чешуйчатый видъ. *Ушныя перья* грязно-куркумово-желтыя, концы нѣкоторыхъ перьевъ черно-бурые. *Полосы по бокамъ затылка* отъ *глазъ* и *бока шеи* куркумово-желтые. *Виски* черновато-бурые, послѣдній цвѣтъ образуетъ на желтомъ фонѣ боковъ шеи и затылка довольно рѣзкое темное пятно. Подбородокъ грязно-желтовато-бѣлый. *По бокамъ горла, на границѣ щекъ* нерѣзкія темныя полосы въ формѣ усовъ. *Зобъ и грудь* куркумово-желтые съ узкими темными наствольными полосками. *Бока тѣла*, въ верхней части пепельно-сѣрые, въ нижней — желтовато-сѣрые; всѣ перья съ темными наствольными полосками. *Животъ* грязно-бѣлый. *Подхвостье* — бурое, всѣ перья съ широкими грязно-бѣлыми каймами. *Плечевыя* сѣрыя, съ широкими желтовато-бѣлыми каймами по наружному опахалу. *Малыя кроющія крыла* буро-черныя съ куркумово-желтой оторочкой. *Большія и среднія кроющія маховъ 2-го порядка* буро-черныя съ широкими ярко-куркумово-желтыми каймами; каймы эти на среднихъ кроющихъ занимаютъ весь конецъ пера, а на большихъ — только конецъ наружнаго опахала и, притомъ, съ примѣсью бѣлаго цвѣта по направленію къ концу и къ стержню пера. *Кроющія главныхъ маховъ* буро-черныя, одноцвѣтныя. *Нижнія кроющія крыла*

и *подмышечныя* бѣлыя. *Махи* сверху буро-черные, снизу — сѣроватые; махи 1-го и 2-го порядковъ съ желтоватой оторочкой по наружному опахалу, которая къ концу пера становится сѣрою; махи 3-го порядка съ широкой желтовато-бѣлой каймой по наружному опахалу. *Рули* сверху сѣро-черные, снизу свѣтлѣе; крайніе рули съ болѣе свѣтлой оторочкой по наружнымъ опахаламъ.

Радужина темно-сѣрая. *Клювъ* буро-роговаго цвѣта, нижняя челюсть свѣтлѣе. *Ноги* розовато-сѣрыя.

1-й махъ меньше 5-го и больше 6-го, не достигаетъ до вершины крыла на 6 мм.; 2-й махъ = 5-му, не доходитъ до вершины крыла на 3 мм.; 3-й и 4-й махи равны и образуютъ вершину крыла. 2-й, 3-й, 4-й и 5-й махи по наружнымъ опахаламъ съ середины длины съужены. Помимо этого на нѣкоторыхъ нашихъ шкуркахъ замѣтенъ дѣйствительный первый махъ, о которомъ упоминаетъ г. Stejneger у молодаго *Plectrophenax nivalis* (въ Kingsley, Standard Natural History, vol. IV, pag. 484, fig. 235, 10 p.). Онъ однако крайне малъ и едва замѣтенъ.

Наши экземпляры представляютъ довольно значительныя различія въ оттѣнкахъ краснаго цвѣта оперенія самцовъ. Птицы въ свѣжемъ опереніи, битыя осенью, всѣ розовыя, такого-же почти цвѣта какъ *C. dubius;* лѣтнія-же, въ обношенномъ оперенiи, всѣ съ болѣе или менѣе рѣзкимъ рыжеватымъ оттѣнкомъ. Послѣдній зависитъ, вѣроятно, отъ выцвѣтанія краснаго пигмента.

C. trifasciatus встрѣченъ только въ ю.-з. Гань-су, гдѣ осѣлъ, но сравнительно рѣдокъ. Обитаетъ въ среднемъ поясѣ горъ и держится по опушкамъ еловыхъ лѣсовъ. Лѣтомъ подымается до альпійскихъ луговъ, зимой встрѣчается на высотѣ не ниже 8000 футъ. Попадается постоянно по одиночкѣ, но иногда (зимой) и небольшими табунками, въ 5—6 штукъ.

Carpodacus Edwardsi, J. Verr.

[*Propasser Edwardsii*, David et Oust., Ois. Chine, p. 355, pl. 94.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 418.

Размѣры:

♂ Дл. 165—175. Разм. 245—250. Кр. 79. Кл. 14—16. Пл. 20—21. Хв. 70.
♀ » 170. » 240—245. » 77—79. » 14—15,3. » 20—21. » 70—73.

Экземпляры: Дер. Сатани, ноябрь, январь; — дер. Чаго, декабрь, январь.

Самка *C. Edwardsi* очень похожа на самку *C. vinaceus*, но отличается отъ послѣдней немного болѣе блѣднымъ цвѣтомъ оперенія, а главное большей величиной и большимъ развитіемъ свѣтлой надбровной полосы. Эта полоса у *C. Edwardsi* особенно рѣзка надъ ухомъ, у *C. vinaceus* только слѣды ея за глазомъ. Въ «Oiseaux de la Chine» г. David говоритъ, что ему попадались взрослые самцы этого вида въ нарядѣ самокъ, настолько различающіеся между собой по величинѣ, что онъ сомнѣвается въ принадлежности ихъ къ одному виду. Не были-ли нѣкоторые изъ нихъ *C. vinaceus?*

C. Edwardsi встрѣченъ только въ Сигученскомъ округѣ зимой и всего лишь нѣсколько разъ. Птички держались по одиночкѣ въ кустарныхъ зарослякъ, на днѣ долинъ и по увалам̀ъ.

Carpodacus vinaceus, J. Verr.

[*Propasser vinaceus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 356, pl. 96.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 416.

Размѣры:

♂ Дл. 145—165. Разм. 215—230. Кр. 68—75. Кл. 12,5—14. Пл. 18—19. Хв. 58—65.
♀ » 155. » 210—220. » 66—69. » 13. » 18—18,5. » 61—63.

Экземпляры: Дер. Лото-пинъ, іюль; — дер. Іо-дзамъ-пу, май, іюль; — дер. Джоза̀-паза̀, октябрь; — дер. Са̀тани, октябрь.

Самка *C. vinaceus* весьма похожа, какъ мы уже сказали выше, на самку *C. Edwardsi*. Она отличается отъ послѣдней меньшей величиной, слабымъ развитіемъ надбровной полосы и немного болѣе яркимъ, рыжевато-бурымъ, цвѣтомъ оперенія.

Этотъ видъ встрѣченъ только въ ю.-з. Гань-су, лѣтомъ. Въ общемъ довольно рѣдокъ, въ особенности взрослые красные самцы. Держится въ горахъ средней высоты по кустарнымъ зарослямъ и на опушкахъ лѣсовъ. Въ началѣ іюля добыта пара, очевидно гнѣздовавшая, въ которой самецъ не отличался цвѣтомъ оперенія отъ самки. Осенью птички встрѣчались еще въ октябрѣ.

Pyrrhospiza punicea Humei, Sharpe.

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 433.

Размѣры:

♂ Дл. 210—230. Разм. 350—365. Кр. 112—117. Кл. 19—22. Пл. 21—23,5. Хв. 94—104.
♀ » 210—220. » 330—360. » 109—114. » 20—21,5. » 22—24. » 92—96.

Радужина темно-коричневая. Клювъ темно-роговаго цвѣта, нижняя челюсть свѣтлѣе. Плюсны и когти черные.

Экземпляры: Дер. Та-хей-гоу, декабрь; — дер. Джоза̀-паза̀, сентябрь.

Мы относимъ южно-ганьсуйскихъ птицъ къ формѣ *P. Humei*, основываясь на блѣдности ихъ окраски и на значительной ширинѣ розовой лобной полосы, причемъ мы сравнивали наши экземпляры только съ рисункомъ *P. punicea* въ «Monographie des Loxiens» Bonaparte, экземпляровъ-же послѣдняго вида не имѣли. Всѣ наши самцы, (зимніе, битые въ ноябрѣ и декабрѣ) имѣютъ верхнюю сторону тѣла свѣтло-сѣровато-бурую, со слабымъ розовымъ оттѣнкомъ на спинѣ, а красные участки оперенія — нѣжнаго розоваго цвѣта; розовыя перья всѣ съ темно-бурыми конечными пятнышками, особенно рѣзкими на бокахъ горла, гдѣ они, на границѣ щеки, образуютъ прерывистыя полосы въ формѣ усовъ. Наши самки отличаются отъ самки *P. punicea* (судя по рисунку) грязно-куркумово-желтымъ цвѣтомъ надхвостья и отсутствіемъ охристаго

оттѣнка на головѣ, бровяхъ и щекахъ и свѣтлаго пятна на ушныхъ перьяхъ,— охристый оттѣнокъ замѣненъ у нихъ бѣловатымъ, а ушныя перья такого-же цвѣта какъ шея.

Хотя мы и отнесли южно-ганьсуйскихъ птицъ къ формѣ *P. Humei*, но сильно подозрѣваемъ, что эта форма тождественна съ *P. longirostris*, Przew. Дѣло въ томъ, что типичные экземпляры *P. longirostris* (изъ перваго путешествія Пржевальскаго) и наши, хотя и различаются довольно значительно деталями окраски, но тѣ и другіе добыты въ разныя времена года и возможно, что это различіе есть различіе сезонныхъ нарядовъ. Экземпляры *P. longirostris* (добытые въ апрѣлѣ и іюлѣ) отличаются отъ нашихъ (зимнихъ): большею яркостью краснаго цвѣта на лбу, бровяхъ, щекахъ, шеѣ и верхней части груди и немного болѣе блѣдной окраской спины (которая, какъ и у нашихъ, съ розовымъ оттѣнкомъ); розовый же цвѣтъ нижней части груди и надхвостья у тѣхъ и другихъ совершенно одинаковъ. По размѣрамъ птицы почти одинаковы, за исключеніемъ длины клюва, который у *P. longirostris*, повидимому, немного длиннѣе[1]). Единственный экземпляръ самки *P. longirostris*, который мы имѣли въ рукахъ, добытая въ августѣ и вѣроятно молодая птица, въ общемъ похожа на нашихъ самокъ и имѣетъ уже довольно рѣзко выраженное куркумово-желтое надхвостье.

P. Humei встрѣчена только на самыхъ высокихъ горныхъ хребтахъ ю.-з. Ганьсу, гдѣ осѣдла, но довольно рѣдка. Держится по скаламъ и розсыпямъ альпійской области и даже зимой не спускается ниже. Птички встрѣчаются парами и иногда небольшими обществами.

Pyrrhula erithacus, Blyth.

[*Pyrrhula erythaca*, David et Oust., Ois. Chine, p. 349.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 455.

Размѣры:

♂ Дл. 165—170. Разм. 250. Кр. 77—83. Кл. 12—14. Пл. 14,5—16. Хв. 71—75.
♀ » 155—175. » 240—255. » 77—81. » 11,5—13,5. » 15—17. » 69—74.

Экземпляры: Уроч. Кванъ-дзя-коу (на границѣ Шенси), декабрь, мартъ; — дер. Лото-пинъ, іюль; — дер. Дзю-юань, іюнь; — дер. Сатани, ноябрь, декабрь; — дер. Іо-дзамъ-пу, іюнь.

Одинъ изъ нашихъ самцовъ, добытый въ концѣ ноября и въ очень свѣжемъ опереніи, имѣетъ грудь яркаго киноварно-краснаго цвѣта, съ узкими пепельно-сѣрыми оторочками перьевъ. У другихъ экземпляровъ, добытыхъ зимой, весной и лѣтомъ, сѣрыхъ оторочекъ нѣтъ, а красный цвѣтъ груди съ большей или меньшей примѣсью желтаго и варіируетъ отъ кирпично-краснаго до оранжеваго. Мы думаемъ, что желтоватый тонъ зависитъ главнымъ образомъ отъ выцвѣтанія, а разнообразіе оттѣнковъ—

[1]) Вѣрно сравнить длину клюва ото лба трудно, такъ какъ пологій лобъ не даетъ постоянной точки. Длина клюва отъ ноздрей, по прямой линіи до конца клюва, у нашихъ самцовъ 13—14 мм.; у *P. longirostris* 14,7—15.

отъ возраста птицъ. Вѣроятно, подобно тому какъ у *Procarduelis rubescens*, болѣе густой красный цвѣтъ старыхъ птицъ болѣе стоекъ и меньше измѣняется отъ выцвѣтанія, чѣмъ у сравнительно молодыхъ.

Этотъ видъ встрѣченъ и въ юго-восточной и въ юго-западной Ганьсу, но въ первой рѣдокъ, во второй же довольно обыкновенень, какъ лѣтомъ, такъ и зимой. Держится въ кустарныхъ зарослях и въ мелколѣсьи средняго пояса горъ, зимой обыкновенно табунками въ 10—15 штукъ. Подобно нашему снигирю, очень довѣрчивъ и не пуглив. Пѣніе самца (лѣтомъ) замѣчательно мелодично, но такъ тихо, что его можно разслышать только не далѣе какъ въ 15—20 шагахъ.

Uragus lepidus, David et Oust.

[*Uragus lepidus*, David et Oust., Ois. Chine, p. 359, pl. 98.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 467.

Размѣры:

♂ Дл. 145—160. Разм. 205—215. Кр. 63—70. Кл. 10—11. Пл. 14—16. Хв. 68—78.
♀ » 145—160. » 200—210. » 62—67. » 10—11. » 14—16. » 70—73.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, декабрь, февраль, мартъ; — дер. Сàтанн, январь; — дер. Чаго, декабрь.

Этотъ видъ найденъ какъ въ восточной, такъ и въ западной части южной Ганьсу, но повсюду довольно рѣдокъ. Встрѣчается въ предгорьяхъ, по кустарнымъ зарослямъ увалов горныхъ рѣкъ, обыкновенно небольшими табунками; высоко въ горы и въ лѣса не проникаетъ.

Pycnorhamphus carneipes (Hodgs.).

[*Mycerobas carneipes*, David et Oust., Ois. Chine, p. 550.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 47.

Размѣры:

♂ ad. Дл. 235—240. Разм. 350—365. Кр. 115—122. Кл. 22,5—25. Пл. 17. Хв. 102—107. Шир. верхн. чел. 12,5—14. Шир. нижн. чел. 14—15.
♀ ad. Дл. 225. Разм. 335. Кр. 112—118. Кл. 21—22. Пл. 15—18. Хв. 98—103. Шир. верхн. чел. 12,5—14. Шир. нижн. чел. 13,5—15.
? Дл. 240. Разм. 360. Кр. 117—120. Кл. 24—25. Пл. 17—18. Хв. 98—109. Шир. верхн. чел. 14,2—16. Шир. нижн. чел. 16—18. (a)

Экземпляры: Дер. Дзю-юань, іюль, августъ; — дер. Сàтанн, февраль; — дер. Чунъ-дзя (къ югу отъ г. Синина), апрѣль; — дер. Іо-дзамъ-пу, августъ; — дер. Джозà-пазà, октябрь; — дер. Чаго, декабрь; — Амдо (a), май.

Гнѣздовое оперенiе этого вида, кажется, еще не извѣстно. Вотъ краткое описаніе молодой птицы, добытой 27-го іюля въ Сигученскомъ округѣ, которая величиной только въ половину взрослой и имѣетъ еще не вполнѣ отросшіе махи и хвостъ; птичка однако уже порядочно летала.

Общій цвѣтъ оперенія верхней стороны бурый съ оливковымъ оттѣнкомъ, кото-

рый рѣзче всего на лбу. Перья верха головы, затылка и шеи имѣютъ темно-бурыя конечныя каймы, которыя придаютъ этимъ частямъ поперечно-полосатый рисунокъ. Спина одноцвѣтно-бурая съ оливковымъ оттѣнкомъ. Надхвостье свѣтло-куркумово-желтое. Зобъ и грудь такого-же цвѣта какъ верхъ головы, но темно-бурыя каймы перьевъ шире и менѣе рѣзки. По бокамъ горла двѣ неясныя темно-бурыя полосы, которыя окружаютъ болѣе свѣтлый подбородокъ и соединяются на зобу. Бока тѣла желтовато-бурые. Животъ почти такого-же цвѣта, слегка свѣтлѣе. Подхвостье свѣтло-куркумово-желтое съ узкими темно-бурыми конечными каймами на всѣхъ перьяхъ. Крылья и хвостъ такого-же цвѣта какъ у взрослой птицы. Клювъ тупой и безъ зубца у основанія верхней челюсти, какъ бываетъ у взрослыхъ птицъ, на концѣ его еще сохранилось основаніе чехлика для разламыванія яйца.

Другая молодая птица, добытая 12-го августа, величиной (дл. кр. 108 мм.) и цвѣтомъ уже похожа на взрослую самку, но имѣетъ еще остатки гнѣздоваго оперенія на бокахъ шеи и затылкѣ.

Одинъ изъ нашихъ самцовъ, добытый въ концѣ августа и въ сильно обношенномъ опереніи, въ общемъ похожъ на самку, но имѣетъ на нижней части груди, зобу и темени нѣсколько черныхъ перышекъ. О подобномъ экземплярѣ упоминаетъ также Пржевальскій. Подобныя птицы, во всякомъ случаѣ, не моложе года, такъ какъ молодыя птицы въ серединѣ августа только сбрасываютъ гнѣздовое опереніе. Мнѣніе г. Biddulph'a, приведенное въ Каталогѣ Британскаго Музея (l. c.), что самцы *P. carneipes* получаютъ полный нарядъ только послѣ перваго брачнаго періода, — вѣроятно совершенно справедливо.

Наши экземпляры изъ ю.-з. Гань-су отличаются отъ экземпляровъ съ Амдоскаго нагорья величиной клюва. У послѣднихъ клювъ длиннѣе и значительно шире, несмотря на то, что всѣ они въ нарядѣ самки, т. е. самки или молодые самцы.

Въ ю.-з. Гань-су *P. carneipes* не рѣдокъ и встрѣчается какъ лѣтомъ, такъ и зимой. Лѣтомъ — на высотѣ съ 8000 футъ, по опушкамъ горныхъ еловыхъ лѣсовъ, гдѣ, вѣроятно, гнѣздится; зимой — ниже, въ кустарныхъ зарослях и перелѣскахъ нижняго пояса горъ и даже въ долинахъ второстепенныхъ рѣкъ. Этотъ видъ встрѣченъ въ большомъ количествѣ экспедиціею Г. Н. Потанина въ маѣ 1885 года, по пути отъ г. Синина, черезъ г. Гуй-дэ, въ г. Минджеу. Въ ю.-з. Гань-су не наблюдался.

Coccothraustes vulgaris japonicus, Temm. et Schl.

[*Coccothraustes vulgaris*, David et Oust., Ois. Chine, p. 348.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 39. — Seebohm, Hist. Brit. B., II, p. 57.

Размѣры:

♂ Дл. 195—200. Разм. 320. Кр. 100—103. Кл. 20—22,5. Пл. 21. Хв. 58—59.
♀ » 190—195. » 310—325. » 100—103. » 21—21,5. » 21. » 56—58.

Экземпляры: Г. Хой-сянъ, февраль, мартъ; — дер. Сатани, февраль.

Наши ганьсуйскіе экземпляры почти не различаются цвѣтомъ отъ европейскихъ

(изъ Волынской губерніи); какъ будто они слегка свѣтлѣе, коричневатые, волынскіе же болѣе бурые, но между птицами изъ послѣдней мѣстности есть почти тождественныя съ ганьсуйскими. Эта ничтожная разница въ цвѣтѣ можетъ быть объясняется только временемъ года: волынскія птицы—лѣтнія, ганьсуйскія—зимнія. Съ другой стороны клювъ представляетъ большое различіе: у ганьсуйскихъ птицъ (старыхъ) клювъ замѣтно меньше и уже, такой-же почти величины, какъ у волынскихъ молодыхъ, въ пятнистомъ перѣ.

Дубоносъ встрѣченъ всего два раза. Разъ въ февралѣ мѣсяцѣ около г. Хой-сяна, въ туйевомъ лѣсу одной кумирни, табунокъ въ нѣсколько десятковъ птицъ; другой разъ около дер. Сатани, Сигученскаго округа, одиночная птица.

Chloris sinica (Linn.).

[*Chlorospiza sinica*, David et Oust., Ois. Chine, p. 338.]

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 26.

Размѣры:

♂ Дл. 140—150. Разм. 245—250. Кр. 77—80. Кл. 11—11,5. Пл. 13—14. Хв. 49—51.
♀ » 135—137. » 240. » 75—77. » 10,7. » 13—14. » 46—49.

Экземпляръ: Г. Хой-сянъ, декабрь, февраль, апрѣль.

Въ Хойсянскомъ округѣ зеленушка встрѣчалась изрѣдка въ продолженіи всей зимы, въ апрѣлѣ же появилась въ большомъ количествѣ. Въ ю.-з. Ганьсу сравнительно рѣдка. Держится въ предгорьяхъ, по одиночнымъ группамъ деревьевъ и по кустамъ, высоко въ горы и лѣса не заходитъ.

ДОБАВЛЕНІЕ
къ
Nipponia nippon (Temm.).

На стр. 11 мы сказали, что «....о линькѣ ибисовъ ничего не извѣстно». Эти строки были уже напечатаны, когда мы, просматривая детально интересный дневникъ третьяго путешествія David'a (Journal de mon troisième voyage d'exploration dans l'Emire Chinois, Paris, 1875), встрѣтили (vol. I, 265) повидимому несомнѣнныя данныя о линькѣ ибисовъ. Авторъ заявляетъ о трудности препаровки, вслѣдствіе линянія, двухъ ибисовъ, добытыхъ въ послѣдней трети января 1873 г. на рисовыхъ поляхъ долины рѣки Вэй-хо (Yé-ho), близъ городка Tchou-dze-chien, верстахъ въ 110—130 къ западу отъ Синъ-ань-фу (Шеньси). Новыя перья были розовыя.

Кромѣ того на стр. 237 и 291 находятся данныя, подтверждающія наше мнѣніе, что сѣрый цвѣтъ есть принадлежность весенняго и лѣтняго нарядовъ ибиса.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Курсивомъ набраны семейства и роды; цифры **жирнымъ** шрифтомъ относятся къ именамъ въ заглавіяхъ, а простымъ — къ именамъ въ текстѣ и въ цитатахъ.

A*canthoptila* 61. n
Accentor erythropygius **87**, 87, 87 n, XXIV, XXXVIII.
» multistriatus 87.
» nepalensis 87 n.
» rubeculoides **88**, 88, XXIV, XXXVIII.
» strophiatus **87**, XXXVIII.
Accipiter nisus **30**, 30, XXXVI.
Acredula 115.
Acredula caudata 116.
» concinna 116.
» fuliginosa 116.
» glaucogularis **115**, 115, 116, XXXIX.
» vinacea **115**, 115, 116, XXXIX.
Acrocephalus orientalis **85**, XXXVII.
Actitis hypoleucus **5**, XXXV.
Aegialitis cantianus **3**, 3, XXXV.
» » dealbatus 3.
» » minutus 3.
» dubius 2.
» hiaticula 2.
» minor **2**, 2, 3, XXXV.
» » Jerdoni 2.
» placidus **2**, 2, 3, III, XXXV.
Aegithaliscus 115, 116.
Aegithaliscus concinnus **116**, XIII, XXXIX.
» fuliginosus **116**, 116, XXXIX.
aemodius, Periparus **109**, 110, II, XXXVIII.
aemodium, Conostoma **66**, 66, XXIV, XXXVII.
aesalon, Falco 42.
Aesalon regulus **42**, XXXVI.
affinis, Cryptolopha 74, 74 n, 76 n.
» Poecile **111**, 111, 112, 113, 114, II, XXXVIII.
» Sylvia 81 n.
agilis, Anthus 52.
Alauda coelivox, 50, XXXVI.
» gulgula 50.
» » coelivox 50.
Alaudidae 50.
alba, Herodias 112.
» modesta, Herodias **12**.
albicilla, Erythrosterna **71**, 71, XXXVII.
albidus, Astur palumbarius 30.
alboides, Motacilla 54.
Alcedinidae 46.
Alseonax latirostris **71**, 71, XXXVII.
Alsocomus Hodgsoni **26**, III, XXXVI.
aluco nivicola, Syrnium **43**, XXXVI.
amurensis, Erythropus **42**, XXXVI.
» Falco 42.
Anas boschas **6**, 6, XIII, XXXV.
» zonorhyncha **7**, 7, XXXV.
Anatidae 6.
Anthus agilis 52.
» japonicus **52**, III, XXXVI.
» maculatus **52**, XXXVI.
» Richardi **53**, 53, 53 n, XXXVI.
» rosaceus **52**, 52, XXXVI.
» striolatus **53**, 53, 53 n, XXXVI.
aquaticus indicus, Rallus **6**.
Aquila chrysaëtus **31**, 31, XXXVI.
» daphanea 31.
» fulva 31.
» minuta 30, 31, 31 n.
» nobilis 31.
» pennata 31, 31 n.
Archibuteo cryptogenys 34, 36, 39.
» hemitilopus 32, 33, **34**, 34, 34 n, 36, 37, 38, 39, 40, II, III, XXXVI.
» leucoptera 34, 36, 38, 39.
» strophiatus **32**, 32, 33, 34, 34 n, 36, 37, 38, 39, 40, III, XXXVI.
Ardeidae 11.
armandi, Lusciniola **84**, XXXVII.
» Oreopneuste 84.
arquatus lineatus, Numenius **4**.
Arundinax 86.
Arundinax davidianus 85, 85 n.
Astur palumbarius **30**, 30, III, XXXVI.
» » buteoides 30.
» » Schvedowi 30.
» » typicus 30.
ater, Periparus 109, 113.

Athene Brodici 43.
» plumipes 44.
atra, Buchanga **105**, XXXVIII.
» Fulica **6**, 6, XXXV.
atrigularis, Merula 101.
aureola, Emberiza **127**, 127, XXXIX.
auritus, Turdus **99**, 99, XXXVIII.
auritum, Crossoptilon **24**, 24, 25, XXIV, XXVII, XXXVI.
aurorea, Ruticilla **92**, 92, XII, XXXVIII.
Babax lanceolatus **56**, 56, XXXVII.
bactriana, Carine **44**, XXXVI.
baicalensis, Poecile XXXVIII.
» Poecile borealis **111**.
barbata, Perdix **12**, 12, 13, XXXV.
beavani, Lophophanes 110.
» Periparus **110**, XXXVIII.
bella, Muscicapa, 78 n.
beloni, Tadorna, **6**.
bengalensis, Bubo **44**, 44, II, XXXVI.
birmanica, Cryptolopha (74 n) 76, III.
bispecularis, Garrulus, **122**, III, XXXIX.
blythi, Propasser 137.
borealis, Poecile 111.
» baicalensis, Poecile **111**.
boschas, Anas **6**, 6, XIII, XXXV.
Botaurus stellaris **11**, 11, XXXV.
brachydactyla, Calandrella **51**, 51, XXXVI.
brandti, Leucosticte **128**, 128, XXIV, XXXIX.
» Otocorys **50**, 50, XXXVI.
brevipes, Limosa 5.
brevirostris, Pericrocotus **104**, 104, III, XXIII, XXXVIII.
brodici, Athene 43.
» Glaucidium **43**, XXXVI.
brunnea, Larvivora **96**, 97, III, XXIII, XXXVIII.
Bubo bengalensis **44**, 44, II, XXXVI.
bucephalus, Lanius 106.
» Phoneus **106**, XXXVIII.
Buchanga artra **105**, XXXVIII.
Budytes cinereicapilla **54**, 54, XXXVII.
» citreola **53**, 53, XXXVII.
» taivana **53**, 53, XXXVII.
burkii, Cryptolopha 74, 74 n, 75, 75 n, 76 n.
» Culicipeta 74.
burmanica, Cryptolopha 74 n, (76, III).
Butalis ferruginea 70.
» latirostris 71.
» sibirica 70.
Butaquila 40.
Buteo ferox 37, 39.
» hemilasius 39.
» japonicus 40.
» leucocephalus 37, 39, 40.
» plumipes **40**, 41, XXXVI.
buteoides, Astur palumbarius 30.
Cabanisi, Picus 48.
» Picus mandarinus **49**, III, XIII, XXXVI.
caccabis chukar 13, III, XXIII, XXXV.
» saxatilis chucar **13**.
caesia sinensis, Sitta **118**.
Calamodyta orientalis 85.
Calandrella brachydactyla **51**, 51, XXXVI.
» cheleensis 51.
» pispoletta 57, XXXVI.
calidris, Totanus **4**, 4, XXXV.
Calliope kamtschatkensis **96**, 96, XXXVIII.
Calobates melanope **53**, 53, XXXVII.
Campephagidae 104.
Campophaga saturata **104**, XXXVIII.
candidus, Himantopus 4.
canorus, Cuculus **44**, 44, 45, XXXVI.
cantianus, Aegialitis **3**, 3, XXXV.
» dealbatus, Aegialitis 3.
» minutus, Aegialitis 3.
canturians, Cettia **86**, XXXVII.
canturiens, Homochlamys 86.
Carine bactriana 44, XXXVI.
carnipes, Mycerobas 142.
» Pyenorhamphus **142**, 143, II, III, XL.
Carpodacus dubius **136**, 136, 137, III, XXXIX.
» Edwardsi **139**, 139, III, XXXIX.
» erythrinus 133.
» » Grebnitskii **133**.
» Grebnitskii 134, XXXIX.
» pulcherrimus **135**, 135, XXXIX.
» roseus **136**, 136, XXXIX.
» rubicilloides **135**, 135, XXXIX.
» rubicillus 135.
» Sewertzowi 135.
» Stoliczkae **134**, III, XXXIX; таб. III, ф. 3, 4.
» thura 136, 137, III.
» trifasciatus **138**, 139, III, XXIII n, XXIV, XXXIX; таб. III, ф. 1, 2.
» vinaceus 139, **140**, III, XXXIX.
Casarca rutila **6**, 6, XXXV.
cashmeriensis, Cinclus **102**, 102, XXXVIII.
» Hydrobata 102.
castaneiceps, Emberiza 127, XXXIX.
» » cioides **127**.
castaneiventris, Sittiparus 114.
cathoecus, Dicrurus 105.
caudata, Acredula 116.
» Pica 121.
Ceriornis Temminckii **20**, 20, 21, XV, XXIII, XXVII, XXXVI.
Certhia familiaris nipalensis **125**.
» himalayana **125**, 125, XXXIX.
» nipalensis III, XXXIX.
Certhiidae 125.
certhiola, Locustella **85**, 85, XXXVII.

cerviniventris, Digenea **77**, II, III, XXXVII.
Ceryle guttata 46.
» lugubris **46**, 46, XIII, XXXVI.
Cettia 86.
Cettia canturians 86, XXXVII.
» davidiana **85**, 85, III, XXXVII.
» fortipes 85, 85 n, III.
Chaemarrhornis leucocephala 91.
Charadriidae 2.
cheleensis, Calandrella 51.
Chettusia cinerea 3.
Chimarrhornis leucocephala **91**, XIII, XXXVIII.
chinensis, Turtur **27**, 27, 29, XII (XIII) (XXIII), XXXVI.
» Vivia **47**, XIII, XXXVI.
Chloris sinica **144**, XL.
Chlorospiza sinica 144.
chloropus, Gallinula, **6**, 6, XXXV.
Cholornis paradoxa **68**, 68, XXIV, XXXVII,
chrysaëtus, Aquila **31**, XXXVI.
chukar, Caccabis 13, III, XXIII, XXXV.
» Caccabis saxatilis **13**.
cia, Emberiza 127.
Ciconia nigra **7**, 7, XXXV.
Ciconiidae 4.
Cinclidae 102.
Cinclosoma lunulatum 63.
» maximum 62.
Cinclus cashmeriensis **102**, 102, XXXVIII.
» Pallasii, **103**, XIII, XXXVIII.
» sordidus **102**, 102, III, XXXVIII.
cincta, Poecile 111, 112.
cineraceum, Trochalopteron 58.
cineraceus, Spodiopsar **124**, XXXIX.
» Sturnus 124.
cinerea, Chettusia 3.
cinereicapilla, Budytes **54**, 54, XXXVII.
cinereiceps, Trochalopteron **57**, 57, 58, 59, 61, 61 n, III, XV, XXXVII.
» Fulvetta **69**, 69, XV, XXXVII.
cinereus, Lobivanellus **3**, XXXV.
cioides castaneiceps, Emberiza **127**.
cioides, Emberiza 127.
Circus cyaneus **29**, 29, XXXVI.
citreola, Budytes **53**, 53, XXXVII.
Coccothraustes vulgaris 143.
» » japonicus **143**.
coelicolor, Grandala **95**, 95, III, XXIV, XXXIV, XXXVIII.
coelivox, Alauda 50, XXXVI.
» Alauda gulgula **50**.
coeruleus, Myiophoneus **98**, 98, XXXVIII.
Coleus dauricus **121**, XXXIX.
» neglectus **121**, XXXIX.
Collurio tephronotus **106**, XXXVIII.
Columba rupestris **26**, 26, XXXVI.
Columbidae 21.
concinnus, Acredula 116.
» Aegithaliscus **116**, XIII, XXXIX.
Conostoma aemodium **66**, 66, XXIV, XXXVII.
conspicillata, Suthora **66**, 66, XXXVII.
cornuta, Tadorna **6**.
Corvidae 120.
Corvus macrorhynchus japonensis **120**, XXXIX.
» sinensis 120.
» torquatus **120**, 120, XII, XXXIX.
Corydalla Richardi 53.
crecca, Querquedula **7**, 7, XXXV.
crinigera, Suya, **70**, XXXVII.
cristata, Fuligula **7**, XXXV.
» Fulix 7.
» Galerita 51.
cristatus, Lanius 105.
» japonicus, Regulus **118**.
» Vanellus **3**, 3, XXXV.
Crossoptilon auritum **24**, 24, 25, XV, XXIII, XXVII, XXXVI.
cryptogenys, Archibuteo 34, 36, 39.
Cryptolopha affinis 74, 74 n, 76 n.
» birmanica 76, III.
» Burkii 74, 74 n, 75, 75 n, 76 n.
» burmanica 74 n.
» tephrocephala **74**, 74, 74 n, 75, 76, 76 n, XXXVII.
Cuculidae 44.
Cuculus canorus **44**, 44, 45, XXXVI.
» poliocephalus **45**, 45, XXXII, XXXVI.
» striatus **45**, 45, XXIII, XXXVI.
Culicipeta Burkii 74.
» tephrocephala 76 n.
curruca, Sylvia 81, 81 n.
» minuscula, Sylvia **81**.
cyaneus, Circus **29**, 29, XXXVI.
» Cyanopolius **122**, 122, XXXIX.
» Monticola **98**, 98, XXIII, XXXVIII.
cyanomelaena, Cyanoptila 78.
» Xanthopygia **78**, 78, 79, III, XXIII, XXXVII.
cyanomelanura, Cyanoptila 78 n.
Cyanopolius cyaneus **122**, 122, XXXIX.
Cyanoptila cyanomelaena 78.
» cyanomelanura 78 n.
» cyanothorax 78 n.
cyanothorax, Cyanoptila 78 n.
cyanura, Janthia 80.
cyanurus, Tarsiger **80**, 80, III, XXXVII.
Cynchramus polaris **126**, XXXIX.
» schoeniclus **126**, XXXIX.
daphanea, Aquila 31.
dauricus, Coleus **121**, XXXIX.
» Lycos 121.
» Troglodytes 103.

davidi, Poecile **113**, 114, II, XXXVIII.
» Pterorhinus **55**, 56, XXXVII.
davidiana, Cettia, **85**, 85, III, XXXVII.
davidianus, Arundinax 85, 85 n.
dealbatus, Aegialitis cantianus 3.
decollatus, Phasianus 18.
Dendrotreron Hodgsonii 26.
deserti, Saxicola **89**, 89, XXXVIII.
diademata, Yuhina **69**, 69, XIII, XXXVII.
dichroides, Lophophanes **110**, 110, 111, III, XXXVIII.
dichrous, Lophophanes 110, 111, III.
Dicruridae 105.
Dicrurus cathoecus 105.
diffusus, Oriolus **120**, 120, XXIII, XXXIX.
Digenea cerviniventris **77**, II, III, XXXVII.
douraca, Turtur **27**, 27, 28, 29, III, XII, XXIII, XXXVI.
» torquatus, Turtur 27 n.
Dryocopus martius **48**, 48, XXXVI.
Dryonastes sannio **65**, XII, XXXVII.
dubius, Aegialitis, 2.
» Carpodacus **136**, 136, 137, III, XXXIX.
» Propasser 136.
Dumeticola 86.
edwardsi, Carpodacus **139**, 139, III, XXXIX.
» Propasser 139.
elegans, Emberiza **127**, 127, XXXIX.
» Lophobasileus **117**, XXXIX.
» Phasianus 18.
ellioti, Trochalopteron **57**, 57, 57 n, 61 n, III, XV, XXXVII.
Emberiza aureola **127**, 127, XXXIX.
» castaneiceps 127, XXXIX.
» cia 127.
» cioides 127.
» » castaneiceps **127**.
» elegans **127**, 127, XXXIX.
» Godlewskii **127**, 127, XXXIX.
» leucocephala **128**, 128, XXXIX.
» pusilla **126**, 126, XXXIX.
epops, Upupa, **46**, 46, XXXVI.
erithaca, Pyrrhula 141.
erithacus, Pyrrhula **141**, III, LX.
erythrinus, Carpodacus 133.
» Grebnitskii, Carpodacus **133**.
erythrogastra, Ruticilla 92.
» Sewertzovi, Ruticilla **92**,
erythropleura, Zosterops **125**, 125, III, XXIII, XXXIX.
Erythropus amurensis **42**, XXXVI.
erythropygius, Accentor **87**, 87, 87 n, XXIV, XXXVIII.
erythrorhincha, Urocissa **122**, III, XXXIX.
Erythrospiza mongolica **129**, 129, XXXIX.
Erythrosterna albicilla **71**, 71, XXXVII.
Erythrosterna parva 71.
Falco aesalon 42.
» amurensis 42.
» Hendersoni 42.
» saker 42.
» tinnunculus 41.
Falconidae 29.
familiaris nepalensis, Certhia **125**.
ferox, Buteo 37, 39.
ferruginea, Butalis 70.
» Hemichelidon **70**, 70, XXIII, XXXVII.
fluviatilis, Sterna 1.
» longipennis, Sterna **1**.
» tibetana, Sterna **1**.
fortipes, Cettia, 85, 85 n, III.
Fregilus graculus 123.
» » himalayanus **123**, XXXIX.
Fringilla montifringilla **128**, 128, XXXIX.
Fringillauda nemoricola **129**, 129, XXIV, XXXIX.
Fringillidae 126.
frontalis, Motacilla 54.
» Propasser 137.
» Ruticilla **94**, 94, III, XXXVIII.
Fulica atra **6**, 6, XXXV.
fuliginosa, Acredula, 116.
» Hemichelidon **70**, 70, III, XXIII, XXXVII.
» Mecistura 116.
» Rhyacornis **79**, 79, 80, XIII, XXXVII.
fuliginosus, Aegithaliscus **116**, 116, XXXIX.
Fuligula cristata **7**, XXXV.
Fulix cristata 7.
fulva, Aquila 31.
Fulvetta cinereiceps **69**, 69, XV, XXXVII.
» ruficapilla **69**, 69, XXXVII.
fumigatus, Troglodytes 103.
fuscata, Merula 101, **102**, III, XIII, XXXVIII.
Galerita cristata 51.
» leautungensis **51**, XXXVI.
Gallinago gallinago **5**, XXXV.
» megala **5**, 5, XXXV.
» scolopacina 5.
gallinago, Gallinago **5**, XXXV.
Gallinula chloropus **6**, 6, XXXV.
Gampsorhynchus 61 n.
Garrulax 59.
Garrulax sannio 65.
Garrulus bispecularis **122**, III, XXXIX.
Gecinus Guerini **47**, 47, XIII, XXXVI.
geoffroyi, Ithaginis 15, 16.
Geronticus nippon 8.
glareola, Totanus **4**, 4, XXXV.
Glaucidium Brodiei **43**, XXXVI.
glaucogularis, Acredula **115**, 115, 116, XXXIX.
godlewskii, Emberiza **127**, 127, XXXIX.
gouldi, Merula **100**, 100, XXXVIII.

graculus, Fregilus 123.
» himalayanus **123**, XXXIX.
Grandala coelicolor **95**, 95, III, XXIV, XXXIV, XXXVIII.
gravivox, Pomatorhinus **64**, 64, 64 n, 65, III, XXXVII.
grebnitskii, Carpodacus 134, XXXIX.
» » erythrinus **133**.
guerini, Gecinus **47**, 47, XIII, XXXVI.
gularis, Monticola **99**, 99, XXXVIII.
» Muscicapa 79.
gulgula, Alauda 50.
» coelivox, Alauda **50**.
guttata, Ceryle 46.
guttaticollis, Paradoxornis **68**, 68, XV, XXXVII.
haematopygia, Leucosticte 128.
halsueti, Spelaeornis **103**, 103, XV, XXXVIII.
Hemichelidon 71.
Hemichelidon ferruginea **70**, 70, XXIII, XXXVII.
» fuliginosa **70**, 70, III, XXIII, XXXVII.
» sibirica 70, III.
hemilasius, Buteo 39.
hemiptilopus, Archibuteo 32, 33, **34**, 34, 34 n, 36, 37, 38, 39, 40, II, III, XXXVI.
hemispila, Nucifraga **121**, 121, XV, XXXIX.
hendersoni, Falco 42.
» Podoces **123**, 123, XXXIX.
Henicuridae 54.
Henicurus Leschenaulti 54.
» Scouleri 55.
» sinensis **54**, XIII, XXXVII.
Herbivocula 86.
Herodias alba 12.
» » modesta **12**.
» modesta XXXV.
hiaticula, Aegialites 2.
Hierofalco saker **42**, XXXVI.
himalayana, Certhia **125**, 125, XXXIX.
himalayanus, Fregilus **123**, XXXIX.
Himantopus candidus 4.
» melanopterus **4**, XXXV.
Himarrhornis (*lapsu pro* Ch) leucocephala XIII.
hodgsoni, Alsocomus **26**, III, XXXVI.
» Perdix 13, III.
» Poliomyas **72**, 73, III, XXXVII.
» Ruticilla **92**, 92, XXXVIII.
» Siphia 72.
Hodgsonius phoenicuroides **89**, 89, 90, III, XXXVIII.
Homochlamys canturiens 86.
humei, Pyrrhospiza 140, 141.
» Pyrrhospiza punicea **140**, II, III, XXIV, XXXIX.
humilis, Podoces **124**, 124, XXXIX.
» Turtur, **29**, 29, XXXIV.
Hydrobata cashmeriensis 102.
» Pallasii 102.
» sordida 102.
hypermelaena, Poecile **112**, II, XV, XXXVIII.
hypoleucus, Actitis **5**, XXXV.
« Tringoides 5.
Ibididae 7.
Ibidorhynchus Struthersii **4**, 4, XIII, XXXV.
Ibis (Geronticus) nippon 8.
» nippon 7.
» » var. sinensis 7, 8.
» sinensis 8.
» Temminckii 8.
incei, Terpsiphone **73**, 73, XXXVII.
» Thitrea 73.
indica, Janthia 96.
» Pratincola 81.
iudicus, Rallus 6, XXXV.
» Rallus aquaticus **6**.
innominata, Vivia, 47.
isabellina, Saxicola **88**, 88, XXXVIII.
» var. orientalis, Otomela 105.
Ithaginis Geoffroyi 15, 16.
» sinensis **15**, 15, 16, 17, II, III, XXIV, XXXV.
Ixus xanthorrhous 55.
Janthia 61, 61 n.
janthia cyanura 80.
» indica 96.
Janthocincla lunulata 61 n, **63**, 63, XV, XXVII.
» maxima 59, 61 n, **62**, 62, XXXVII.
japonensis, Corvus macrorhynchus **120**, XXXIX.
japonica, Motacilla, 54.
japonicus, Anthus **52**, III, XXXVI.
» Buteo, 40.
» Coccothraustes XL.
» » vulgaris **143**.
» Regulus 118, XXXIX.
» » cristatus **118**.
» Tinnunculus **41**, XXXVI.
jerdoni, Aegialitis minor 2.
Jyngipicus kaleensis 48, XXXVI.
» pygmaeus kaleensis **48**.
» scintilliceps 48.
Jynx torquilla **50**, 50, XXXVI.
kaleensis, Jyngipicus 48, XXXVI.
» » pygmaeus **48**.
kamtschatkensis, Calliope **96**, 96, XXXVIII.
kessleri, Merula **100**, 100, XXXVIII.
lanceolatus, Babax, **56**, 56, XXXVII.
Laniidae 105.
Lanius bucephalus 106.
» cristatus 105.
» lucionensis 105.
» sphenocercus **107**, 107, XII, XXXVIII.
» tephronotus 106.

Laridae 1.
Larvivora brunnea **96**, 97, III, XXIII, XXXVIII.
» obscura **97**, II, XXIV, XXXVIII; таб. I, ф. 2.
latirostris, Alseonax **71**, 71, XXXVII.
» Butalis, 71.
leautungensis, Galerita **51**, XXXVI.
lepidus, Uragus **142**, 142, XIII, XL.
Leptopoecile obscura 117.
» Sophiae **117**, 117, XXXIX.
» » var. major 117.
Lerva nivicola **14**, 14, 15, XXXV.
leschenaulti, Henicurus 54.
leucocephala, Chaemarrhornis 91.
» Chimarrhornis **91**, XII, XXXVIII.
» Emberiza **128**, 128, XXXIX.
» Himarrhonis (lapsu pro Ch) XIII.
leucocephalus, Buteo 37, 39, 40.
leucomelanura, Siphia 77 n.
leucopsis, Motacilla **54**, XXXVII.
» Sitta 119.
leucoptera, Archibuteo 34, 36, 38, 39.
Leucosticte Brandti **128**, 128, XXIV, XXXIX.
» haematopygia 128.
» pamirensis 128.
lhuysii, Lophophorus **22**, 22, 23, 24, III, VIII, XXIV, XXXVI.
Limosa brevipes 5.
» melanura melanuroides 5.
» melanuroides XXXV.
lineatus, Numenius 4, XXXV.
» » arquatus, **4**.
Lobivanellus cinereus **3**, XXXV.
Locustella certhiola **85**, 85, XXXVII.
longipennis, Sterna, 1, XXXV.
» Sterna fluviatilis **1**.
longirostris, Otocorys 50.
Lophobasileus elegans **117**, XXXIX.
Lophophanes Beavani 110.
» dichroides **110**, 110, 111, III, XXXVIII.
» dichrous 110, 111, III.
Lophophorus Lhuysii **22**, 22, 23, 24, III, VIII, XXIV, XXXVI.
Luciani, Picus 48, 49, III, XXXVI.
» Picus mandarinus **48**.
lucionensis, Lanius 105.
» Otomela **105**, XXXVIII.
lugens, Motacilla **54**, XXXVII.
lugubris, Ceryle, **46**, 46, XIII, XXXVI.
» Poecile **112**.
lunulata, Janthocincla, 61 n, **63**, 63, XV, XXXVII.
lunulatum, Cinclosoma, 63.
Lusciniola 86
Liseiniola Armandi **84**, XXXVII.
Lycos daurieus 121.
Lycos neglectus 121.
macclellandi, Pomatorhinus, 64, 64 n, III.
macrorhynchus japonensis, Corvus **120**, XXXIX.
macrura, Poecile 111.
maculatus, Anthus **52**, XXXVI.
magnirostris, Phylloscopus 82, XXIII, XXXVII.
major, Leptopoecile Sophiae var. 117.
» Parus 107.
mandarina, Merula XXIII, XXXVIII.
» Merula merula **100**.
mandarinus, Picus 48, 49.
» Luciani, Picus **48**.
mandellii, Phylloscopus **84**, II, XXXVII.
martius, Dryocopus **48**, 48, XXXVI.
maura, Pratincola **81**, XXXVII.
maxima, Janthocincla 59, 61 n, **62**, 62, XXXVII.
maximum, Cinclosoma 62.
maximus, Bubo 44.
Mecistura fuliginosa 116.
» vinacea 115.
megala, Gallinago **5**, 53, XXXV.
Megaloperdix tibetanus XXIV.
Melanocorypha mongolica **51**, 51, XXXVI.
melanope, Colobates **53**, 53, XXXVII.
melanopterus, Himantopus **4**, XXXV.
melanotis, Milvus **41**, 41, XII, XXXVI.
melanura melanuroides, Limosa 5.
melanuroides, Limosa XXXV.
» Limosa melanura 5.
Meliphagidae 125.
Merula atrigularis 101.
» fuscata 101, **102**, III, XIII, XXVIII.
» Gouldi **100**, 100, XXXVIII.
» mandarina XXIII, XXXVIII.
» merula mandarina **100**.
» Kessleri **100**, 100, XXXVIII.
» Naumanni **101**, 101, XIII, XXXVIII.
» obscura **102**, 102, XXXVIII.
» ruficolis **101**, 101, III, XIII, XXXVIII.
» sibirica **99**, XXXVIII.
» sinensis 100.
Microcichla Scouleri **55**, XXXVII.
Milvus melanotis **41**, 41, XII, XXXVI.
minor, Aegialitis **2**, 2, 3, XXXV.
» Jerdoni, Aegialitis 2.
» Parus **107**, 107, XXXVIII.
minuscula, Sylvia 81, 82, XXXVII.
» Sylvia curruca **81**.
minuta, Aquila 30, 31, 31 n.
minutus, Aegialitis cantianus 3.
» Psaltriparus 116.
modesta, Herodias XXXV.
mongolica, Erythrospiza **129**, 129, XXXIX.
» Melanocorypha **51**, 51, XXXVI.
montana, Poecile 115.
» Saxicola 89.

montanus, Passer **130**, 130, XXXIX.
Monticola cyaneus **98**, 98, XXIII, XXXVIII.
» gularis **99**, 99, XXXVIII.
monticola, Parus **107**, 107, III, XXXVIII.
montifringilla, Fringilla **128**, 128, XXXIX.
morio, Saxicola, **88**, 88, XXXVIII.
Motacilla alboides 54.
» frontalis 54.
» japonica 54.
» leucopsis **54**, XXXVII.
» lugens **54**, XXXVII.
» paradoxa 54.
Motacillidae 52.
multistriatus, Accentor 87.
muralis, Tichodroma 126.
muraria, Tichodroma **126**, XXXIX.
Muscicapa bella 78 n.
» gularis 79.
Muscicapidae 70.
musicus, Turdus 99.
Mycerobas carneipes 142.
Myiophoneus coeruleus **98**, 98, XXXVIII.
naumanni, Merula **101**, 101, XIII, XXXVIII.
neglectus, Coleus **121**, XXXIX.
neglectus, Lycos 121.
nemoricola, Fringillauda **129**, 129, XXIV, XXXIX.
neornis strigiceps 74.
newtoni, Phylloscopus 83, 84, III.
nigra, Ciconia **7**, 7, XXXV.
nigrogularis, Ruticilla 93.
nipalensis, Accentor 87 n.
» Certhia III, XXXIX.
» » familiaris **125**.
» Procarduelis **133**, 133, XXXIX.
» Troglodytes **103**, 103, XXXVIII.
nippon, Geronticus 8
» Ibis (Geronticus) 8.
» var. sinensis, Ibis 8.
» Nipponia **7**, 8, 9, **144**, III, XII, XXXV.
Nipponia nippon **7**, 8, 9, **144**, III, XII, XXXV.
» Temminckii 8.
Nisaetus pennatus **30**.
nisus, Accipiter **30**, 30, XXXVI.
nivalis, Plectrophenax 139.
nivicola, Lerva **14**, 14, 15, XXXV.
» Syrnium 43, XXXVI.
» » aluco **43**.
nobilis, Aquila 31.
Nucifraga hemispila **121**, 121, XV, XXXIX.
Numenius arquatus lineatus **4**.
» lineatus 4, XXXV.
Obscura, Larvivora **97**, II, XXIV, XXXVIII.
» Leptopoecile 117.
» Merula **102**, 102, XXXVIII.
obscurus, Tetraophasis **21**, 21, 22, 25, XXIV, XXVII, XXXVI.
obtecta, Poecile 112.
ochropus, Totanus **5**, 5, XXXV.
Oreopneuste Armandi 84.
orientalis, Acrocephalus **85**, XXXVII.
» Calamodyta 85.
» Otomela isabellina var. 105.
» Turtur **27**, XXXVI.
Oriolidae 120.
Oriolus diffusus **120**, 120, XXIII, XXXIX.
Orites ouratensis 115.
Otocorys Brandti **50**, 50, XXXVI.
» longirostris 50.
» sibirica 50.
Otomela isabellina var. orientalis 105.
» lucionensis **105**, XXXVIII.
» phoenicura **105**, XXXVIII.
» speculigera **105**, III, XXXVIII.
Otus vulgaris **43**, 43, XXXVI.
ouratensis, Orites 115.
pallasii, Cinclus **103**, XIII, XXXVIII.
» Hydrobata 102.
» Schoeniclus 126.
palumbarius, Astur **30**, 30, III, XXXVI.
» albidus, Astur 30.
» buteoides, Astur 30.
« Schvedowi, Astur 30.
» typicus, Astur 30.
palustris, Poecile 113.
pamirensis, Leucosticte 128.
paradoxa, Cholornis **68**, 68, XXIV, XXXVII.
» Motacilla 54.
Paradoxornis guttaticollis **68**, 68, XV, XXXVII.
paradoxus, Syrrhaptes **26**, 26, XXXVI.
Paridae 107.
Parus major 107
» minor **107**, 107, XXXVIII.
» monticola **107**, 107, III, XXXVIII.
» venustulus **108**, 108, III, XXXVIII; таб. II, ф. 3.
parva, Erythrosterna, 71.
Passer montanus **130**, 130, XXXIX.
» rutilans **130**, 130, XXXIX.
pekinensis, Periparus 109.
» Rhopophilus **86**, 86, XXXVIII.
pennata, Aquila 31, 31 n.
pennatus, Nisaetus **30**, XXXVI.
Perdix barbata **12**, 12, 13, XXXV.
» Hodgsoni 13, III.
» sifanica **13**, III, XXXV.
Pericrocotus brevirostris **104**, 104, III, XXIII, XXXVIII.
Periparus aemodius **109**, 110, II, XXXVIII.
» ater 109, 113.
» Beavani **110**, XXXVIII.
» pekinensis 109.
pernyi, Picus **49**, 49, XXXVI.

Petronia petronia **130**, XXXIX.
petronia, Petronia **130**, XXXIX.
» Pyrgita 130.
Phasianidae 15.
Phasianus decollatus 18.
» elegans 18.
» Strauchi **18**, 18, 19, III, XII, XIII, XXXVI.
» tarimensis 18.
» torquatus **18**, 18, III, XXXVI.
» Vlangali 18.
phoenicura, Otomela **105**, XXXVIII.
phoenicuroides, Hodgsonius **89**, 89, 90, III, XXXVIII.
Phoneus buccphalus **106**, XXXVIII.
Phyllopneuste plumbeitarsa 82.
» trinotaria 82.
» xanthodryas 82.
Phylloscopus 86.
Phylloscopus magnirostris **82**, XXIII, XXXVII.
» Mandellii **84**, II, XXXVII.
» Newtoni 83, 84, III.
» plumbeitarsus **82**, XXXVII.
» proregulus **83**, 83, 84, XXXVII.
» reguloides **83**, 83 n, II, XXXVII.
» superciliosus **84**, XXXVII.
» viridipennis 83 n.
» xanthodryas 82.
Pica pica **121**, XXXIX.
» caudata 121.
pica, Pica **121**, XXXIX.
Picidae 47.
picta, Thaumalea **17**, 17, XXIII, XXXV.
Picus Cabanisi 48, III, XIII, XXXVI.
» Luciani 48, 49, III, XXXVI.
» mandarinus 48, 49.
» » Cabanisi **49**.
» » Luciani **48**.
» Pernyi **49**, 49, XXXVI.
pispoletta, Calandrella **51**, XXXVI.
placidus, Aegialites **2**, 2, 3, III, XXXV.
Plectrophenax nivalis 139.
plumbeitarsa, Phyllopneuste 82.
plumbeitarsus, Phylloscopus **82**, XXXVII.
plumipes, Athene 44.
» Buteo **40**, 41, XXXVI.
Podoces Hendersoni **123**, 123, XXXIX.
» humilis **124**, 124, XXXIX.
Poecile 114, 115.
Poecile affinis **111**, 111, 112, 113, 114, II, XXXVIII.
» borealis 111.
» borealis baicalensis **111**.
» cincta 111, 112.
» Davidi **113**, 114, II, XXXVIII; таб. II, ф. 4.
Poecile hypermelaena **112**, II, XV, XXXVIII; таб. II, ф. 2.
» lugubris 112.
» macrura 111.
» montana 115.
» obtecta 112.
» palustris 113.
» sibirica 112.
» songara 111, 112, III, IV.
» superciliosa **115**, 115, XXXIX.
polaris, Chynchramus **126**, XXXIX.
poliocephalus, Cuculus **45**, 45, XXXII, XXXVI.
Poliomyas Hodgsoni **72**, 73, III, XXXVII.
Pomatorhinus gravivox **64**, 64, 64 n, 65, III, XXXII.
» Macclellandi 64, 64 n, III.
» ruficollis 63, 64.
» stridulus 63.
» Styani **63**, 63, 64, XXXVII.
Pratincola indica 81.
» maura **81**, XXXVII.
» Przewalskii 81.
Procarduelis nipalensis **133**, 133, XXXIX.
» rubescens **131**, 133, II, III, XXIII n, XXIV, XXXIX.
Propasser Blythi 137.
» dubius 136.
» Edwardsi 139.
» frontalis 137.
» roseus 136.
» trifasciatus 138.
» vinaceus 140.
proregulus, Phylloscopus **83**, 83, 84, XXXVII.
» Reguloides 83, 83 n.
przewalskii, Pratincola 81.
» Sitta **119**, 119, II, XXXIX.
» Suthora **67**, 67, II, XXXVII.
» Trochalopteron 57, III.
Psaltriparus minutus 116.
Pteroclidae 26.
Pterorhinus Davidi **55**, 56, XXXVII.
Pucrasia ruficollis 19, 20, III, XXXV.
» xanthospila 19, 21.
» » ruficollis 19.
» » var. ruficollis 29.
pulcherrimus, Carpodacus **135**, 135, XXXIX.
punicea, Pyrrhospiza 140.
» Humei, Pyrrhospiza 140, II, III, XXIV, XXXIX.
pusilla, Emberiza **126**, 126, XXXIX.
Pycnonotus xanthorrhous **55**, 69 (XIII), XXXVII.
Pycnorhamphus carneipes **142**, 143, II, III, XL.
pygmaeus kaleensis, Jyngipicus 48.
Pyrgita petronia 130.
Pyrrhospiza Humei 140, 141.
» longirostris 141, 141 n.

Pyrrhospiza punicea 140.
» punicea Humei **140**, II, III, XXIV, XXXIX.
Pyrrhula erithacus **141**, III, LX.
» erythaca 141.
Querquedula crecca **7**, 7, XXXV.
Rallidae 6.
Rallus aquaticus indicus **6**.
» indicus 6, XXXV.
Reguloides proregulus 83, 83 n.
» superciliosus 84.
» viridipennis 83 n.
reguloides, Phylloscopus **83**, 83 n, II, XXXVII.
Regulus cristatus japonicus **118**.
» japonicus 118, XXXIX.
regulus, Aesalon **72**, XXXVI.
Rhopophilus pekinensis **86**, 86, XXXVIII.
Rhyacornis fuliginosa **79**, 79, 80, XIII, XXXVII.
richardi, Anthus **53**, 53, 53 n, XXXVI.
» Corydalla 53.
risorius, Turtur 27, 29 n.
rosaceus, Anthus **52**, 52, XXXVI.
roseus, Carpodacus **136**, 136, XXXIX.
» Propasser 136.
rubeculoides, Accentor **88**, 88, XXIV, XXXVIII.
rubescens, Procarduelis **131**, 133, II, III, XXIII n, XXIV, XXXIX.
rubicilloides, Carpodacus **135**, 135, XXXIX.
rubicillus, Carpodacus 135.
ruficapilla, Fulvetta **69**, 69, XXXVII.
ruficollis Merula **101**, 101, III, XIII, XXXVIII.
» Pomatorhinus 63, 64.
» Pucrasia 19, 20, III, XXXV.
» » xanthospila **19**.
» » » var. 19.
rufilatus, Tarsiger **80**, 80, II, III, XXXVII.
rufiventris, Ruticilla **93**, 93, XXXVIII.
rupestris, Columba **26**, 26, XXXVI.
rupicola, Turtur 27.
Ruticilla aurorea **92**, 92, XII, XXXVIII.
» erythrogastra 92.
» » Sewertzowi **92**.
» frontalis **94**, 94, III, XXXVIII.
» Hodgsoni **92**, 92, XXXVIII.
« nigrogularis 93.
» rufiventris **93**, 93, XXXVIII.
» schisticeps **93**, 93, 94, III, XXXVIII.
» Sewertzowi XXXVIII.
rutila, Casarca **6**, 6, XXXV.
rutilans, Passer **130**, 130, XXXIX.
Saker, Falco 42.
» Hierofalco **42**, XXXVI.
sannio, Dryonastes **65**, XII, XXXVII.
» Garrulax 65.
saturata, Campophaga **104**, XXXVIII.
» Volvocivora 104.
saxatilis chukar, Caccabis **13**.
Saxicola deserti **89**, 89, XXXVIII.
» isabellina **88**, 88, XXXVIII.
» montana 89.
» morio **88**, 88, XXXVIII.
» vittata **88**, II, XXXVIII.
schisticeps, Ruticilla **93**, 93, 94, III, XXXVIII.
Schoeniclus Pallasii 126.
schoeniclus, Cynchramus **126**, XXXIX.
schvedowi, Astur palumbarius 30.
scintilliceps, Jyngipicus 48.
Scolopacidae 4.
scolopacina, Gallinago **5**, XXXV.
scouleri, Henicurus 55.
» Microcichla **55**, XXXVII.
semitorques, Spizixus **55**, 55, XIII, XXXVII.
sewertzowi, Carpodacus 135
» erythrogastra **92**.
» Ruticilla XXXVIII.
» Tetrastes **12**, 25, II, XXXV.
sibirica, Butalis 70.
» Hemichelidon 70, III.
» Merula **99**, XXXVIII.
» Otocorys 50.
» Poecile 112.
sibiricus, Turdus 89.
sifanica, Perdix **13**, III, XXXV.
simplex, Zosterops 125.
sinensis, Corvus 120.
» Henicurus **54**, XIII, XXXVII.
» Ibis 8.
» Ibis nippon, var. 7, 8.
» Merula 100.
» Sitta 118, XXXIX.
» » caesia **118**.
» Turtur XIII, XXXIII.
» Urocissa 122.
sinica, Chloris **144**.
» Chlorospiza 144, XL.
Siphia Hodgsoni 72.
» leucomelanura 77 n.
» strophiata **77**, 77, XXXVII.
Sitta caesia sinensis **118**.
» leucopsis 119.
» Przewalskii **119**, 119, II, XXXIX.
» sinensis **118**, XXXIX.
» villosa **118**, 118, 118 n, XXXIX.
songara, Poecile 111, 112, III, IV.
sophiae, Leptopoecile **117**, 117, XXXIX.
» var. major, Leptopoecile 117.
sordida, Hydrobata 102.
sordidus, Cinclus **102**, 102, III, XXXVIII.
speculigera, Otomela **105**, III, XXVIII.
Spelaeornis Halsueti **103**, 103, XV, XXXVIII.
sphenocercus, Lanius **107**, 107, XII, XXXVIII.
Spizixus semitorques **55**, 55, XIII, XXVII.

Spodiopsar cineraceus **124**, XXXIX.
stellaris, Botaurus **11**, 11, XXXV.
Sterna fluviatilis 1.
» » longipennis **1**.
» » tibetana **1**.
» longipennis 1, XXXV.
» tibetana 1, XXXV.
st oliczkae, Carpodacus, **134**, III, XXXIX.
» Turtur 28, 29 n.
strauchi, Phasianus **18**, 18, 19, III, XII, XIII, XXXVI.
striat a, Suya 70,
striatus, Cuculus **45**, 45, XXIII, XXXVI.
stridulus, Pomatorhinus 63.
strigiceps, Neornis 74.
Strigidae 43.
striolatus, Anthus **53**, 53, 53 n, XXXVI.
strophiata, Siphia **77**, 77, XXXVII.
strophiatus, Accentor **87**, XXXVIII.
» Archibuteo **32**, 32, 33, 34, 34 n, 36, 37, 38, 39, 40, II, XXXVI.
struthersii, Ibidorhynchus **4**, 4, XIII, XXXV.
Sturnidae 124.
Sturnus cineraceus 124.
styani, Pomatorhinus **63**, 63, 64, XXXVII.
sukatschewi, Trochalopteron **59**, 60, 61, 61, n, 62, II, XXIII, XXIV, XXXVII.
superciliosa, Poecile **115**, 115, XXXIX.
superciliosus, Phylloscopus **84**, XXXVII.
» Reguloides 84.
Suthora conspicillata **66**, 66, XXXVII.
» Przewalskii **67**, 67, II, XXXVII; таб. II, ф. 1.
» webbiana **66**, 66, XXXVII.
Suya crinigera **70**, XXXVII.
» striata 70.
Sylvia affinis 81 n.
» curruca 81, 81 n.
» » minuscula **81**.
» minuscula 81, 82, XXXVII.
Syrnium aluco nivicola **43**, XXXVI.
» nivicola 43.
Syrrhaptes paradoxus **26**, 26, XXXVI.
Tadorna Belonii 6.
» cornuta **6**.
taivana, Budytes **53**, 53, XXXVII.
tarimensis, Phasianus 18.
Tarsiger cyanurus **80**, 80, III, XXXVII.
» rufilatus **80**, 80, II, III, XXXVII.
temmincki, Ceriornis **20**, 20, 21, XV, XXVII, XXXVI.
» Ibis 8.
» Nipponia 8.
tephrocephala, Cryptolopha **74**, 74, 74 n, 75, 76, 76 n, XXXVII.
tephrocephala, Culicipeta 76 n.
tephronotus, Collurio **106**, XXXVIII.
» Lanius 106.
Terpsiphone Incei **73**, 73, XXXVII.
Tetraogallus tibetanus **14**, 14, 15, III, XXIV, XXXV.
Tetraonidae 12.
Tetraophasis obscurus **21**, 21, 22, 25, XXIV, XXVII, XXXVI.
Tetrastes Sewertzowi **12**, 25, II, XXXV.
Thaumalea picta **17**, 17, XXIII, XXXV.
Tchitrea Incei 73.
thura, Carpodacus 136, 137, III.
tibetana, Sterna 1, XXXV.
» » fluviatilis **1**.
tibetanus, Megaloperdix XXIV.
» Tetraogallus **14**, 14, 15, III (XXIV), XXXV.
Tichodroma muralis 126.
» muraria **126**, XXXIX.
Timeliidae 55.
Tinnunculus japonicus **41**, XXXVI.
tinnunculus, Falco 41.
torquatus, Corvus **120**, 120, XII, XXXIX.
» Phasianus **18**, 18, III, XXXVI.
» Turtur 27, 28.
» » douraca 27 n.
torquilla, Jynx **50**, 50, XXXVI.
Totanus calidris **4**, 4, XXXV.
» glareola **4**, 4, XXXV.
» ochropus **5**, 5, XXXV.
tranquebarica, Turtur 29.
trifasciatus, Corpodacus **138**, 139, III, XXIII n, XXIV, XXXIX.
» Propasser, 138.
Tringoides hypoleucus 5.
trinotaria, Phyllopneuste 82.
Trochalopteron 61, 61 n.
Trochalopteron cineraceum 58.
» cinereiceps **57**, 57, 58, 59, 61, 61 n, III, XV, XXXVII.
» Ellioti **57**, 57, 57 n, 61 n, III, XV, XXXVII.
» Przewalskii 57, III.
» Sukatschewi **59**, 60, 61, 61 n, 62, II, XXIII, XXIV, XXXVII; таб. I, ф. 1.
Troglodytes dauricus 103.
» fumigatus 103.
» nipalensis **103**, 103, XXXVIII.
Troglodytidae 103.
Turdidae 81.
Turdus auritus **99**, 99, XXXVIII.
» musicus 99.
» sibiricus 99.

Turtur chinensis **27**, 27, 29, XII, (XIII), (XXIII), XXXVI.
» douraca **27**, 27, 28, 29, III, XII, XXIII, XXXVI.
» » torquatus 27 n.
» humilis **29**, XXXVI.
» orientalis **27**, XXXVI.
» risorius 27, 29 n.
» rupicola 27.
» sinensis XIII, XXIII, (lapsu pro chinensis).
» Stoliczkae 28, 29 n.
» torquatus 27, 28.
» tranquebarica 29
typicus, Astur palumbarius 30.
Upupa epops **46**, 46, XXXVI.
Upupidae 46.
Uragus lepidus **142**, 142, XIII, XL.
Urocissa erythrorhyncha **122**, III, XXXIX.
» sinensis 122.
Vanellus cristatus **3**, 3, XXXV.
venustulus, Parus **108**, 108, III, XXXVIII.
villosa, Sitta **118**, 118 n. XXXIX.
vinacea, Acredula **115**, 115, 116, XXXIX.
» Mecistura, 115.
vinaceus, Carpodacus 139, 140, III, XXXIX.
» Propasser 140.
viridipennis, Phylloscopus 83 n.
» Reguloides 83 n.
vittata, Saxicola **88**, II, XXXVIII
Vivia chinensis **47**, XIII, XXXVI.
» innominata 47.
vlangali, Phasianus 18.
Volvocivora saturata 104.
vulgaris, Coccothraustes 143.
» japonicus, Coccothraustes **143**.
» Otus **43**, 43, XXXVI.
Webbiana, Suthora **66**, 66. XXXVII.
Xanthodryas, Phyllopneuste 82.
» Phylloscopus 82.
Xanthopygia cyanomelaena **78**, 78, 79, III, XXIII, XXXVII.
xanthorrhous, Ixus 55, XIII.
» Pycnonotus **55**, 69, XXXVII.
xanthospila, Pucrasia 19, 21.
» ruficollis, Pucrasia **19**.
» var. ruficollis, Pucrasia 19.
Yuhina diademata **69**, 69 XIII, XXXVII.
Zonorhyncha, Anas **7**, 7, XXXV.
Zosterops erythropleura **125**, 125, III, XXIII, XXXIX.
» simplex 125.

ВАЖНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ.

Стр.	III	строка	6	сверху	вмѣсто	Corpodacus	должно быть			Carpodacus
»	III	»	4	снизу	»	Steineger	»	»		Stejneger
»	III	»	9	»	»	Steineger	»	»		Stejneger
»	XIII	»	12	»	»	Himarrhornis	»	»		Chimarrhornis
»	53	»	19	сверху	»	Colobates	»	»		Calobates
»	53	»	20	»	»	Colobates	»	»		Calobates
»	53	»	2	снизу	»	Padde	»	»		Radde
»	61	»	8	»	»	aanthocincla	»	»		Janthocincla
»	73	»	23	сверху	»	Thitrea	»	»		Tchitrea
»	95	»	12	снизу	»	альпійскихъ горахъ	»	»		альпійскихъ лугахъ
»	100	»	5	»	»	гора Кунчала	»	»		гора Кунгала
»	126	»	20	сверху	»	Cynchamus	»	»		Cynchramus

Табл. I.

Птицы путешествія Г. Н. Потанина.

Таблица I.

Trochalopteron Sukatschewi, Sp. nov.

Фиг. 1. ♂, съ экземпляра, добытаго въ концѣ ноября близъ дер. Са́тани, Сигученскаго округа.

Larvivora obscura, Sp. nov.

Фиг. 2. ♂, съ экземпляра, добытаго въ концѣ мая близъ дер. Іо-дзамъ-пу, Мпнджеускаго округа.

Gez u. lith. v G. Mützel.

Птицы путешествія Г. Н. Потанина.

Таблица II.

Suthora Przewalskii, Sp. nov.

Фиг. 1. съ экземпляра, добытаго въ декабрѣ близъ дер. Та-хей-гоу, Сигученскаго округа.

Poecile hypermelaena, Sp. nov.

Фиг. 2. ♂, съ экземпляра, добытаго въ мартѣ близъ дер. Ланъ-дзя-коу, въ провинціи Шень-си, на границѣ съ Гань-су.

? Parus venustulus, Swinh.

Фиг. 3. juv., съ экземпляра, добытаго въ началѣ іюля близъ дер. Іо-дзамъ-пу, Минджеускаго округа.

Poecile Davidi, Sp. nov.

Фиг. 4. ♂ ad., съ экземпляра, добытаго въ сентябрѣ близъ дер. Джоза́-паза́, Минджеускаго округа.

Gez. u. lith. v. G. Mützel.

Druck v. C. Böhm, Berlin

Птицы путешествія Г. Н. Потанина.

Таблица III.

Carpodacus trifasciatus, J. Verr.

Фиг. 1. ♂ ad. } съ экземпляровъ, добытыхъ въ серединѣ октября близъ дер. Джоза-
Фиг. 2. ♀ ad. } паза́, Минджеускаго округа.

Carpodacus Stoliczkae, Hume.

Фиг. 3. ♂ ad. } съ экземпляровъ, добытыхъ въ началѣ мая близъ города Гуй-дэ-
Фиг. 4. ♂ ad. } тинъ, въ с.-з. Гань-су.

gez.u.lith v G Mützel

Druck v. J. Bohm Berlin

1521

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00698 8638